

Materia Medica Keynotes

Henry C. Allen

Част 1

Съдържание

Materia Medica Keynotes	1
Abrotanum	4
Aceticum acidum	4
Aconitum napellus	5
Actaea racemosa.....	6
Aesculus hippocastanum.....	7
Aethusa cynapium	8
Agaricus muscarius	8
Agnus castus.....	9
Aloe socotrina	10
Alumina	11
Ambra grisea	12
Ammonium carbonicum	12
Ammonium muriaticum	13
Amylenum nitrosum	14
Anacardium orientale.....	14
Anthracinum	15
Antimonium crudum.....	16
Antimonium tartaricum.....	17
Apis mellifica	18
Apocynum cannabinum.....	19
Argentum metallicum.....	19

Argentum nitricum.....	20
Arnica montana.....	21
Arsenicum album.....	23
Arum triphyllum.....	24
Asarum europaeum	25
Asterias rubens	26
Aurum metallicum	26
Baptisia tinctoria	28
Baryta carbonica	29
Belladonna	30
Benzoic acid.....	31
Berberis vulgaris.....	32
Bismuth	32
Borax.....	33
Bovista.....	34
Bromium.....	34
Bryonia alba	35
Cactus grandiflorus	37
Calcarea ostrearum.....	38
Calcarea phosphorica	39
Calendula.....	40
Camphora.....	41
Cannabis indica	42
Cannabis sativa	42
Cantharis	43
Capsicum annuum	43
Carbo animalis.....	44
Carbo vegetabilis.....	45
Carbolic acid.....	46
Caulophyllum	47
Causticum.....	48

Chamomilla	49
Chelidonium majus	51
China.....	52
Coca	53
Cocculus	54
Coffea cruda	55
Colchicum autumnale.....	55
Collinsonia canadensis.....	56
Colocynthis.....	57
Conium maculatum.....	57
Crocus sativus	59
Crotalus horridus	60
Croton tiglium	61
Cuprum metallicum	61
Cyclamen europaeum.....	62
Digitalis purpurea.....	63
Dioscorea villosa	64
Diphtherinum.....	64
Drosera rotundifolia	66
Dulcamara	66
Eupatorium perfoliatum	67
Euphrasia.....	68
Ferrum metallicum	69
Fluoric acid	70
Gelsemium	70
Glonoine	72
Graphites.....	73
Hamamelis virginica.....	74
Helleborus niger.....	75
Hypericum perforatum.....	76
Ignatia.....	77

Iodum	79
Ipecacuanha	80
Kali bichromicum	81
Kali bromatum	83
Kali carbonicum.....	84
Kalmia latifolia.....	85
Kreosotum.....	85
Lac caninum	86
Lac defloratum	88
Lac defloratum	89
Lachesis	90
Ledum palustre	92
Lilium tigrinum	93
Lobelia inflata.....	94
Lycopodium clavatum.....	95

Abrotanum

Изтръпнал, слаб, треперлив и паретичен. Не може да държи главата изправена. Ексудации — в плевра, стави, от пъпа и др. Истински метастази; отстъпваща подагра и др. Редувания; хемороиди с ревматизъм (**Coll., Sabi.**). Ревматизъм след диария. Изтощаване; възходящо; на краката.

Сварливи, раздразнителни деца. Бледи, с хлътнали очи, старо лице. Разширени вени; на челото. Кръвотечение от носа; при младежи. Повръща много зловонна течност. Стомахът плава във вода (**Buf.**). Подут корем. Болки в левия яйчник. Нощни болки в гърба. Слаби стави; не може да държи главата изправена. Лицето студено, сухо и набръчкано. Студени, боцкащи, изтръпнали пръсти на ръцете и краката. Отпусната кожа. Изпъкнали хемороиди; парят при допир.

Aceticum acidum

Подходящо за бледи, слаби хора с отпуснати, меки мускули; лицето бледо, въсърчно (**Fer.**). Кръвоизлив; от всеки лигавичен отвор — нос, гърло, бели дробове, стомах, черва, матка (**Fer., Mill.**); метророгия; заместителни кръвоизливи; травматичен

епистаксис (**Arn.**). Маразм и други изтощителни болести на деца (**Abrot.**, **Iod.**, **Sanic.**, **Tub.**). Голямо изтощение; след наранявания (**Sulph. ac.**); след хирургичен шок; след анестетици. Жажда; силна, пареща, ненаситна, дори за големи количества — при воднянка, диабет, хронична диария; но без жажда при треска. Кисели оригвания и повръщане при бременност, пареща водна регургитация и обилно слюноотделяне, ден и нощ (**Lac. ac.**, слюноотделяне < нощем, **Mer. s.**). Диария; обилна, изтощителна, голяма жажда; при воднянка, тиф, фтиза; с нощни изпотявания. Истински круп, съскащо дишане, кашлица при вдишване (**Spong.**); последни стадии. Вдишване на изпарения от ябълков оцет е използвано успешно при круп и злокачествена дифтерия. Не може да спи легнал по гръб (спи по-добре по гръб — **Ars.**); усещане за потъване в корема, причиняващо диспнея; почива по-добре легнал по корем (**Am. c.**). Хектична треска, кожата суха и гореща; червено петно на лявата буза и обилни нощни изпотявания.

Aconitum napellus

Обикновено е показан в остри или скорошни случаи, появяващи се при млади хора, особено момичета, с пълнокръвна, плеторична конституция, които водят заседнал живот; хора, лесно засегнати от атмосферни промени; тъмна коса и очи, твърди мускулни влакна. Оплаквания, причинени от излагане на сух студен въздух, сух северен или западен вятър, или излагане на течение от студен въздух, докато са в пот; лоши ефекти от спряна пот.

Голям страх и тревога на ума, с голяма нервна възбудимост; страх да излиза, да влиза в тълпа, където има вълнение или много хора; да пресича улицата. Лицето е изразително за страх; животът е направен нещастен от страх; сигурен е, че болестта му ще се окаже фатална; предсказва деня, в който ще умре; страх от смърт по време на бременност. Неспокоен, тревожен, прави всичко с голяма бързина; трябва често да сменя положението; всичко го стряска.

Болките са непоносими, подлудяват го; става много неспокоен; през нощта. Ханеман казва: „Когато **Aconite** е избран хомеопатично, трябва преди всичко да наблюдавате моралните симптоми и да внимавате да ги наподобява точно; мъкната на ума и тялото; неспокойствието; безпокойството, което не може да бъде успокоено.“ Тази умствена тревога, безпокойство, страх съпътстват най-незначителното заболяване.

Музиката е непоносима, прави я тъжна (**Sab.**, по време на мензис, **Nat. c.**). При изправяне от легнало положение червеното лице става смъртно бледо, или той припада или му се завива свят и пада, и се страхува да се изправи отново; често придружено от изчезване на зрението и безсъзнание.

Аменорея при плеторични млади момичета; след уплаха, за предотвратяване на потискане на мензиса. За конгестивния стадий на възпаление, преди да настъпи локализация.

Треска; кожата суха и гореща; лицето червено, или бледо и червено на смени; пареща жажда за големи количества студена вода; интензивно нервно неспокойствие, мятане в агония; става непоносимо към вечерта и при заспиване.

Конвулсии; при никнещи зъби на деца; топлина, тикове и потрепвания на отделни мускули; детето гризе юмрука си, нервници и крещи; кожата гореща и суха; висока температура.

Кашлица, круп; суха, дрезгава, задушаваща, силна, груба, грачеща; твърда, звънлива, свиреща; при издишване (**Caust.** — при вдишване, **Spong.**); от сухи, студени ветрове или течения въздух.

Aconite никога не трябва да се дава просто за контролиране на треската, никога да не се редува с други лекарства за тази цел. Ако случаят изисква **Aconite**, не е нужно друго лекарство; **Aconite** ще излекува случая. Освен ако не е показан от причината, почти винаги е вреден в първите стадии на тифозна треска.

< Вечер и нощ, болките са непоносими; в топла стая; при изправяне от леглото; лежане на засегнатата страна (**Her.**, **Nux m.**).

На открит въздух (**Alum.**, **Mag. c.**, **Puls.**, **Sab.**).

Actaea racemosa

Пуерпериална мания; мисли, че полудява (сравни **Syph.**); опитва да нарани себе си. Мания, след изчезване на невралгия. Усещане, сякаш тежък, черен облак се е спуснал върху нея и е обгърнал главата ѝ, така че всичко е тъмнина и объркване. Илюзия за мишка, която тича под стола ѝ (**Lac. c.**, **Aeth.**). Цилиарна невралгия; тъпа или остра, стрелкаща, пронизваща болка в очните ябълки, разпространяваща се към слепоочия, теменна област, тил, орбита; < при качване по стълби, > при лежане.

Сърдечни проблеми от рефлексни симптоми на матка или яйчници. Сърдечната дейност внезапно спира; предстоящо задушаване; палпитации от най-малко движение (**Dig.**). Мензис: нередовен; изтощителен (**Alum.**, **Coc.**); забавен или потиснат от умствено вълнение, от студ, от треска; с хорея, истерия или мания; увеличаване на умствените симптоми по време на мензиса.

Спазми: истерични или епилептични; рефлексни от маточна болест; по-лоши по време на мензис; хорея < лява страна. Силни левостранни инфрамамарни болки (**Ust.**).

Остри, пробощащи, електрически подобни болки в различни части, симпатични с овариално или маточно раздразнение; в маточната област стрелят от страна към страна.

Бременност: гадене; безсъние; фалшиви родилни болки; остри болки през корема; аборт в третия месец (**Sab.**). По време на раждане: „треперене“ в първия стадий; конвулсии от нервно вълнение; ригиден цервикс; болките силни, спазматични, продължителни, < от най-малък шум. Следродилни болки, по-лоши в слабините. Когато се дава през последния месец на бременността, скъсява раждането, ако симптомите съответстват (**Caul., Puls.**).

Прекомерна мускулна болезненост след танци, пързаяне или друго силно мускулно усилие. Ревматични болки в мускулите на шията и гърба; чувстват се сковани, схванати, стегнати; гръбнакът чувствителен — от използване на ръцете при шиене, машинопис, свирене на пиано (**Agar., Ran. b.**). Ревматизъм, засягащ коремите на мускулите; болки бодящи, схващащи. Ревматична дисменорея.

< По време на менструация; колкото по-обилен е потокът, толкова по-голямо страданието.

Aesculus hippocastanum

За хора с хемороидални тенденции, и които страдат от стомашни, билиозни или катарални проблеми. Пълнота в различни части, сякаш от прекомерно количество кръв; сърце, бели дробове, стомах, мозък, таз, кожа. Венозна конгестия, особено портална и хемороидална. Отчаян, мрачен; много раздразнителен; губи самообладание лесно и го възвръща бавно; ужасно сварлив (**Cham.**).

Лигавиците на устата, гърлото, ректума са подути, парят, чувстват се сухи и сурови. Кориза; тънка, водниста, пареща; суровост и чувствителност към вдишван студен въздух. Фоликуларен фарингит; силно парене, сурово усещане в гърлото; сухота и грапавост на гърлото. Често желание за преглъщане, с парене, боцкане, жилене и сухо, стегнато гърло (**Apis, Bell.**).

Ректум: сухота и топлина; усеща се сякаш пълен с малки пръчки; ножоподобни болки стрелят нагоре по ректума (**Ign., Sulph.**); хемороиди — слепи, болезнени, парещи, пурпурни; рядко кървящи. Ректумът е болезнен, с пълнота, парене и сърбеж (**Sulph.**).

Запек: твърд, сух изпражнения, труден за изхвърляне; със сухота и топлина в ректума; силна лумбосакрална болка. Изпражнението е последвано от пълнота в ректума и силна болка в ануса за часове (**Aloe, Ign., Mur. ac., Sulph.**).

Пролапс на матката и разяждаща, тъмна левкорей, с лумбосакрална болка и голяма умора от ходене. Силна тъпа болка в лумбосакралната става; повече или по-малко постоянна; засяга сакрума и хълбоците. Гърбът „се предава“ по време на бременност, пролапс, левкорей; при ходене или навеждане; трябва да седне или легне. Усещане за тежест и схванатост в гърба. Паралитично усещане в ръце, крака и гръбначен стълб.

< **Движение; болки в гърба и болезненост — при ходене и навеждане; вдишване на студен въздух.**

Aethusa cynapium

Особено за деца по време на никнене на зъби в горещо лятно време; деца, които не могат да понасят мляко. Голяма слабост; децата не могат да стоят; неспособни да държат главата изправена (**Abrot.**); прострация със сънливост. Идиотия при деца; неспособност да мислят; объркани. Израз на голяма тревога и болка, с изпънато изражение и ясно очертана *linea nasalis*. Черти, изразяващи болка и тревога. Херпетичен обрив на върха на носа.

Пълна липса на жажда (**Apis, Puls.** — обратното на **Ars.**). Непоносимост към мляко: не може да понася мляко в каквато и да е форма; то се повръща на големи извара веднага след прием; след това слабостта причинява сънливост (сравни **Mag. c.**). Лошо храносмилане при деца, които никнат зъби; силно, внезапно повръщане на пенеста, млечно-бяла субстанция; или жълта течност, последвана от пресечено мляко и сиренеста материя.

Регургитация на храна час или повече след ядене; обилно зеленикаво повръщане. Епилептични спазми, със стиснати палци, червено лице, очи обърнати надолу, зеници фиксирани и разширени; пяна на устата, заключени челюсти; пулс малък, твърд, бърз. Слабост и прострация със сънливост; след повръщане, след изхождане, след спазъм.

< **След ядене или пиене; след повръщане; след изхождане; след спазъм.**

Agaricus muscarius

Хора със светла коса; кожа и мускули отпуснати. Възрастни хора със слаба, ленива циркулация. Пияници, особено за техните главоболия; лоши ефекти след запой (**Lob., Nux, Ran.**). Делириум: с постоянно бълнуване; опитва да излезе от леглото; при тиф или тифус.

Главоболия: при тези, които лесно изпадат в делириум при треска или болка (**Bell.**); при хора, склонни към хорей, потрепвания или гримаси; от гръбначни заболявания.

Измръзвания, които сърбят и парят непоносимо; измръзване и всички последици от излагане на студ, особено по лицето.

Неволни движения, докато е буден, изчезват по време на сън; хорея — от прости движения и потрепвания на отделни мускули до танцуване на цялото тяло; треперене на цялото тяло (потрепване на мускулите на лицето — **Myg.**). Усещане сякаш лед докосва или ледено-студени игли пробождат кожата; или сякаш горещи игли.

Парене, сърбеж, зачервяване на различни части; уши, нос, лице, ръце и крака; частите червени, подути, горещи. Несигурност при ходене, спъва се във всичко по пътя; петите болят сякаш бити, когато стои.

Гръбнакът чувствителен на допир (**Ther.**); по-лошо сутрин. Болка: болезнена, тъпа, в лумбалната и сакралната област; по време на усилие през деня; докато седи (**Zinc.**). Гръбначно раздразнение поради сексуални излишества (**Kali p.**). Нервна прострация след сексуални ексцесии.

Епилепсия от потиснати обриви (**Psor., Sulph.**). Всяко движение, всеки завой на тялото причинява болка в гръбнака. Единичен прешлен чувствителен на допир.

Пролапс, постклимактеричен; натискаща надолу болка почти непоносима (сравни **Lilium, Murex, Sepia**). Изключително чувствителен към студен въздух (**Cal., Kali c., Psor.**). Оплакванията се появяват диагонално; горе ляво и долу дясно (**Ant. t., Stram.** — горе дясно, долу ляво — **Ambr., Brom., Med., Phos., Sul. ac.**).

< След ядене; след коитус; студен въздух; умствено усилие; преди гръмотевична буря (**Phos., Psor.**).

Agnus castus

За лимфатична конституция. Разсеян, намалена способност за вникване; не може да си спомни; трябва да прочете изречение два пъти, преди да го разбере (**Lyc., Phos. ac., Sep.**). „Стари грешници“, с импотентност и гонореен секрет; неженени хора, страдащи от нервна слабост.

Преждевременна старост: меланхолия, апатия, умствено разсейване, самопрезрение; възникваща при млади хора от злоупотреба със сексуалните сили; от семенни загуби. Пълна импотентност: релаксация, отпуснатост, студенина на гениталиите. Липса на сексуална сила или желание (**Cald., Sel.**). Импотентност след чести пристъпи на гонорея. Лоши ефекти от потиснатата гонорея (**Med.**). Гонореен секрет, с липса на сексуално желание или ерекции.

Левкорей: прозрачна, но оцветява бельото в жълто; преминава незабелязано от много отпуснатите части. Недостатъчна секреция или потискане на млякото при кърмещи жени (**Asaf.**, **Lac. c.**, **Lac. d.**); често с голяма тъга; казва, че ще умре.

Оплаквания от въображаема миризма пред носа, като на херинга или мускус. Предпазва от разраняване при ходене.

< След ядене; след пиене; след умствено усилие; при сексуални излишества.

Aloe socotrina

Подходящ за лениви, „уморени“ хора; с отвращение към умствен или физически труд; умственият труд ги изморява. Възрастни хора; особено жени с отпусната, флегматична конституция. Крайна прострация, с изпотяване. Сърбеж (краста) се появява всяка година, когато приближава зимата (**Psor.**).

Недоволен и ядосан на себе си или на своите оплаквания, особено когато е запечен. Заболявания на лигавиците; причинява образуване на слуз на желеподобни късове от гърлото или ректума; засяга лигавицата на ректума.

Главоболие през челото < при всяка стъпка (**Bell.**, **Bry.**); с тежест в очите и гадене. Главоболия: по-лоши от топлина, по-добри от студени апликации (**Ars.**); редуват се с лумбаго; след недостатъчно изхождане.

Диария: трябва да бърза към тоалетната веднага след ядене и пиене (**Crot. t.**); с липса на увереност в сфинктера; изгонва го от леглото рано сутрин (**Psor.**, **Rum.**, **Sulph.**). При изпускане на газове — усещане сякаш изпражнение ще излезе заедно с тях (**Olean.**, **Mur. ac.**, **Nat. m.**).

Колики: режеща, стискаща болка в долната дясна част на корема; мъчителна — преди и по време на изхождане; всички болки спират след изхождане, оставяйки обилно изпотяване и крайна слабост; пристъпите са предшествани от упорит запек.

Газове — зловонни, парещи, обилни; много газове с малко изпражнение (**Agar.**); парене в ануса след преминаване на газове. Твърди изпражнения и маси слуз излизат неволно; глад по време на диария.

Преди изхождане: къркорене, силно внезапно напъване; тежест в ректума. По време на изхождане — тenezми и много газове. След изхождане — прималяване.

Хемороиди: сини, като грозд (**Mur. ac.**); постоянно натискане надолу в ректума; кървящи, болезнени, чувствителни, горещи, облекчават се от студена вода; силен сърбеж. Сърбеж и парене в ануса, пречеши на съня (**Ind.**).

< Рано сутрин; заседнал живот; горещо сухо време; след ядене или пиене; стоене или ходене.

> Студена вода; студено време; изпускане на газове и изпражнения.

Alumina

Подходящ за хора, които страдат от хронични заболявания; „**Aconite** на хроничните заболявания“. Конституции с недостиг на животинска топлина (**Cal.**, **Sil.**). Слаби, сухи, тънки индивиди; тъмна кожа; мек, весел характер; хипохондрици; сух, тетерен, сърбящ обрив, по-лош през зимата (**Petr.**); непоносим сърбеж на цялото тяло, когато се стопли в леглото (**Sulph.**); се чеше до кръв, след което става болезнено.

Времето минава твърде бавно; един час изглежда като половин ден (**Can. Ind.**). Неспособност да ходи, освен с отворени очи и през деня; залита и пада, когато затвори очи (**Arg. n.**, **Gels.**).

Абнормен апетит; желание за нишесте, тебешир, въглен, карамфил, утайка от кафе или чай, киселини и неусвоими неща (**Cic.**, **Psor.**); картофите не понасят. Хронични оригвания с години; по-лоши вечер. Всички дразнещи неща — сол, вино, оцет, пипер — веднага предизвикват кашлица.

Запек: няма желание и няма способност да изкара изпражнение, докато не се натрупа голямо количество (**Melil.**); силно напъване, трябва да стиска здраво седалката на тоалетната; изпражнението твърдо, на възли, като лаврови зърна, покрито със слуз; или меко, глинесто, залепващо по частите (**Plat.**). Неактивност на ректума — дори меко изпражнение изисква силно напъване (**Anac.**, **Plat.**, **Sil.**, **Ver.**).

Запек: при кърмачета, от изкуствена храна; при бебета на шише; при възрастни хора (**Lyc.**, **Op.**); при бременност — от неактивен ректум (**Sep.**). Диария, когато уринира. Трябва да се напъва за изпражнение, за да може да уринира.

Левкорей: разяждаща и обилна, стичаща се чак до петите (**Syph.**); по-лоша през деня; > от студено къпане. След мензис: физически и умствено изтощена, едва може да говори (**Carbo an.**, **Coc.**). Говоренето изморява; отпада и се уморява, трябва да седне.

< В студен въздух; през зимата; докато седи; от ядене на картофи; след ядене на супи; през ден; при новолуние и пълнолуние.

> Меко лятно време; от топли напитки; докато яде (**Psor.**); при влажно време (**Caust.**).

Alumina е едно от главните антидоти при оловно отравяне; колика на бояджиите; заболявания от олово.

Ambra grisea

За деца, особено млади момичета, които са възбудими, нервни и слаби; нервни заболявания на възрастни хора, чиито нерви са „износени“. Слаби, тънки, изтощени хора, които лесно настиват. Голяма тъга, седи с дни, плачейки. След делови неприятности — неспособна да спи, трябва да стане (**Act., Sep.**).

Ранула с зловонен дъх (**Thuja**). Усещане за студенина в корема (**Cal.**). Присъствието на други, дори на сестрата, е непоносимо по време на изхождане; често, безрезултатно желание, което я прави тревожна.

Кървене между мензисите, при всеки малък повод — дълга разходка, след много твърдо изхождане и др. Левкорей: гъста, синкаво-бяла слуз, особено или само през нощта (**Caust., Mer., Nit. ac.**).

Силна кашлица на спазматични пристъпи, с оригвания и дрезгавост; по-лоша при говорене или четене на глас (**Dros., Phos.**); вечер — без експекторация, сутрин — с експекторация (**Hyos.**); коклюш, но без „кресливото“ вдишване.

< **Топли напитки; топла стая; музика; лягане; четене или говорене на глас; присъствие на много хора; след събуждане.**

> **След ядене; студен въздух; студена храна и напитки; изправяне от леглото.**

Ammonium carbonicum

Хеморагична диатеза, течно кръвотечение и дегенерация на червените кръвни клетки; язви, склонни към гангрена. Пълни, плътни жени с различни проблеми в резултат на заседнал живот; деликатни жени, които трябва постоянно да имат „шишенцето за мирисане“ под ръка; лесно настиват през зимата. Децата не обичат да се мият (**Ant. c., Sulph.**).

Губи дъх, когато заспива, трябва да се събуди, за да си поеме въздух (**Grind., Lach.**). Лошо настроение по време на влажно, бурно време. Главоболие; усещане за пълнота, сякаш челото ще се пръсне (**Bell., Glon.**).

Кръвотечение от носа: при миене на лицето (**Arn., Mag. c.**) и ръцете сутрин; от лявата ноздра; след ядене. Озена, често издухване на кървава слуз от носа; кръв нахлува към върха на носа при навеждане.

Запушване на носа, главно нощем; трябва да диша през устата — ключов симптом дори при дифтерия; дълготрайна кориза; „хъркане“ на кърмачета (**Hep., Nux, Samb., Sticta**).

Гнилостно възпалено гърло; склонност към гангренозна улцерация на сливиците; жлезите подути. При дифтерия или скарлатина, когато носът е запушен; детето не може да спи, защото не може да диша.

Холероподобни симптоми в началото на менструацията (**Bov., Ver.**). Мензис: твърде ранен, обилен, предшестван от коликообразни болки; разяждащ, прави бедрата болезнени; обилен нощем и при седене (**Zinc.**); с зъбобол, колики, тъга; умора, особено на бедрата; прозяване и втрисане.

Левкорей: водниста, пареща — от матката; разяждаща, обилна — от влагалището; разраняване на вулвата.

Диспнея с палпитации, по-лоша при усилие или при изкачване дори на няколко стъпала; по-лоша в топла стая. Едно от най-добрите лекарства при емфизем.

Кашлица: суха, от гъделичкане в гърлото като от прах, всяка сутрин между 3 и 4 ч. (**Kali c.**). Панарициум: дълбока периостална болка (**Dios., Sil.**).

Тялото червено, сякаш от скарлатина (сравни **Ailan.**). Злокачествена скарлатина с дълбок сън; стридорозно дишане. Милиарен обрив или слабо развит обрив от недостатъчна жизненост; заплашваща парализа на мозъка (**Tub., Zinc.**).

< **Студено, влажно време; влажни лапи; от миене; по време на мензис.**

> **Лежане по корем (Acet. ac.); на болезнената страна (Puls.); в сухо време.**

Ammonium muriaticum

Особено подходящ за хора, които са пълни и мудни; или тяло голямо и тлъсто, но краката твърде тънки. Водниста, разяждаща кориза, разяждаща устната (**All. c.**).

По време на мензис: диария и повръщане; кърваво отделяне от червата (**Phos.**); невралгични болки в краката; потокът по-обилен нощем (**Bov.** — при лягане, **Kreos.**).

Упорит запек, придружен от много газове. Твърди, ронливи изпражнения, изискващи голямо усилие за изхвърляне; се ронят от ръба на ануса (**Mag. m.**); варират по цвят, няма две изхождания еднакви (**Puls.**).

Хемороиди: болезнени и парещи; с парене и жилене в ректума с часове след изхождане (**Aesc., Sulph.**); особено след потисната левкорей.

Левкорей: като белтък на яйце, предшествана от стискаща болка около пъпа; кафява, слuzеста, безболезнена, след всяко уриниране.

Усещане за студенина в гърба, между лопатките (**Lach.**). Задните бедрени мускули се усещат болезнено скъсени при ходене; напрежение в ставите, сякаш от скъсяване на мускулите (**Caust.**, **Cimex**).

Зловонна пот на краката (**Alum.**, **Graph.**, **Psor.**, **Sanic.**, **Sil.**).

< **Студено, влажно време; влажни лапи; от миене; по време на мензис.**

Amylenum nitrosum

За нервни, чувствителни, плеторични жени, по време или след менопауза. Често палиативно в неизлечими случаи; много важно по отношение на евтаназията. Бързо разширява артериите и ускорява, но по-късно отслабва и забавя пулса.

Интензивно нахлуване на кръв към лицето и главата (**Bell.**, **Glon.**). Жадува за свеж въздух; разкопчава дрехите, маха завивките и отваря прозорците дори в най-студено време (**Arg. n.**, **Lach.**, **Sulph.**).

Топли вълни: започват от лицето, стомаха, различни части на тялото, последвани от изпотяване — често горещо, обилно; рязко ограничено, частите под това са ледено студени; последвано от голяма прострация.

Лицето се зачервява при най-малката емоция (**Coca**, **Fer.**). Зачервяване: хронично или остро; морска болест. Хемикрания, особено когато засегнатата страна е бледа.

Яката изглежда твърде стегната, трябва да я разхлаби (**Lach.**). Ангина пекторис; бурна сърдечна дейност; интензивно пулсиране на сърцето и каротидите (**Glon.**).

Постоянно разтягане с часове; невъзможно да задоволи желанието; хваща леглото и вика за помощ, за да се разтегне. Дълбоко и повтарящо се прозяване (**Kali c.**).

Пуерпериални конвулсии веднага след раждане.

< **Умствено или физическо усилие.**

Действа бързо чрез инхалация; съживява хора, които колабират под анестетици. Суровата субстанция е главно палиативна; трябва да се повтаря, тъй като пациентът привиква към нея; е лечебна в по-силните високи потенции. Лечението по-често зависи от силата на потенцията, отколкото си представят тези, които не са я подложили на лечебен тест.

Anacardium orientale

Внезапна загуба на памет; всичко изглежда като в сън; пациентът е силно обезпокоен от своята забравливост; объркан, негоден за работа. Склонен да бъде злобен, сякаш е

решен да върши зло. Неустойимо желание да псува и ругае (**Lac. c., Lil., Nit. ac.** — иска да се моли непрекъснато, **Stram.**). Липса на увереност в себе си и в другите.

Чувства сякаш има две воли — едната му заповядва да прави това, което другата забранява. Когато ходи, е тревожен, сякаш някой го преследва; подозира всичко около себе си. Слабост на всички сетива.

Хипохондрик, с хемороиди и запек. Странен характер — смее се на сериозни неща и е сериозен за смешни неща. Мисли, че е демон; псува и ругае.

Усещане като от обръч или лента около някоя част (**Cac., Carb. ac., Sulph.**). Главоболие: напълно облекчено при ядене (**Psor.**); когато лежи в леглото нощем и когато заспива; по-лошо при движение и работа.

Стомашни и нервни главоболия на заседнали хора (**Arg. n., Bry., Nux**). Склонност да се задавя при ядене и пиене (**Can. s., Kava kava, Nit. ac.**). Поглъща храна и напитки прибързано; симптомите изчезват, докато яде (**Kali p., Psor.**).

Стомах: усещане на глад, „всичко е изчезнало“, идва само когато стомахът е празен и е > при ядене (**Chel., Iod.**); > по време на процеса на храносмилане (обратното на **Bry., Nux**).

Брадавиците по дланите (**Nat. m.**). Голямо желание за изхождане, но при усилието желанието изчезва без евакуация; ректумът изглежда безсилен, парализиран, с усещане сякаш е запушен (нередовна перисталтика или свръхдействие — **Nux**).

Anthracinum

При карбункул, злокачествена язва и оплаквания с улцерация, некроза и непоносимо парене. Когато **Arsenicum** или най-добре избраното лекарство не успява да облекчи парещата болка на карбункул или злокачествена улцерация.

Кръвоизливи: кръв просмуква от устата, носа, ануса или половите органи; черна, гъста, катраноподобна, бързо разлагаща се (**Crot.**). Септична треска, бърза загуба на сили, падащ пулс, делириум и припадък (**Pyr.**).

Гангренозни язви; фелон, карбункул, еризипел от злокачествен тип. Фелон: най-лошите случаи, с некроза и ужасно пареща болка (**Ars., Carb. ac., Lach.**).

Злокачествен пустул; черни или сини мехури; често фатален за двадесет и четири или четиридесет и осем часа (**Lach., Pyr.**). Карбункул; с ужасни парещи болки; отделяне на ихорозна, зловонна гной.

Раните от дисекция, особено ако има склонност да станат гангренозни; септична треска, изразена прострация (**Ars., Pyr.**). Съмнителни ухапвания от насекоми. Ако

подуването променя цвета си и червени ивици от раната очертават хода на лимфните съдове (**Lach.**, **Pyr.**).

Септично възпаление от абсорбция на гной или други вредни вещества, с пареща болка и голяма прострация (**Ars.**, **Pyr.**). Епидемични заболявания на далака при говеда, коне и овце.

Лоши ефекти от вдишване на зловонни миризми при гнилосна треска или в дисекционна зала; отравяне от зловонен дъх (**Pyr.**).

Херинг казва: „Да се нарече карбункул хирургическо заболяване е най-голямата нелепост. Разрезът винаги е вреден и често фатален. Никога не е загубен случай при правилно лечение, и той трябва винаги да се лекува само с вътрешни лекарства.“

Antimonium crudum

За деца и млади хора, склонни да напълняват (**Cal.**); за крайните възрасти на живота. Възрастни хора с сутрешна диария, внезапно стават запечени, или редуване на диария и запек; пулс твърд и бърз. Чувствителен към студ. < след настиване.

Детето е раздразнително, кисело, не може да търпи да бъде докосвано или гледано; намусено, не желае да говори или да му се говори (**Ant. t.**, **Iod.**, **Sil.**); ядосва се от всяко малко внимание. Голяма тъга, с плач. Отвращение към живота. Тревожно, плачливо настроение, най-малкото нещо я засяга (**Puls.**); пълно отчаяние, самоубийство чрез удавяне.

Неустоимо желание да говори в рими или да повтаря стихове. Сантиментално настроение на лунна светлина, особено екстатична любов; лоши ефекти от разочарована привързаност (**Cal. p.**).

Ноздрите и устните ъгли — болезнени, напукани и с корички. Главоболие: след къпане в река; от настиване; алкохолни напитки; разстроено храносмилане, киселини, мазнини, плодове; потиснат обрив.

Стомашни оплаквания от преяждане; стомахът слаб, храносмилането лесно се разстройва; дебело млечно-бяло покритие на езика — червеният знак на лекарството; много склонен към афти в устата (**Arg. n.**, **Sulph.**). Желание за кисели неща и туршии.

Стомашни и чревни заболявания: от хляб и сладкиши; киселини, особено оцет; кисело или лошо вино; след студено къпане; прегряване; горещо време. Постоянно изпускане на газове, нагоре и надолу, с години; оригване с вкус на приетата храна.

Слуз: в големи количества от задните носни ходове чрез изкашляне; от ануса — ихорозна, просмукваща се, оцветяваща в жълто; лигави хемороиди.

Склонност към абнормни кожни израстъци; ноктите на ръцете не растат бързо; счупени нокти израстват на цепнатини като брадавици и с рогови петна. Големи рогови мазоли по стъпалата (**Ran. b.**); много чувствителни при ходене, особено по каменни настилки.

Загуба на глас от прегряване. Не може да понася слънчевата топлина; по-лошо от пренапрягане на слънце (**Lach., Nat. m.**); < от прегряване до огъня; изтощен в топло време; оплаквания от слънчево изгаряне.

Коклюш: < от прегряване на слънце или в топла стая; от студено миене. Когато симптомите се появят отново, те сменят мястото си или преминават от едната страна на тялото към другата.

Отвращение към студено къпане; детето плаче, когато го мият или къпят със студена вода; студено къпане причинява силно главоболие; причинява потиснат мензис; настинки от плуване или падане във вода (**Rhus**).

< След ядене; студени бани, киселини или кисело вино; след слънчева или огнена топлина; крайности на студ или топлина.

> На открит въздух; по време на покой; след топла баня.

Antimonium tartaricum

Подходящ за тромави, флегматични хора; хидрогенната конституция (на Grauvogl). Заболявания, произхождащи от излагане в влажни мазета или изби (**Ars., Aran., Tereb.**).

Чрез вагусния нерв потиска дишането и циркулацията, като така произвежда ключовия симптом на лекарството, а именно: когато пациентът кашля, изглежда, че има голямо количество слюз в бронхите; сякаш много ще бъде експекторано, но нищо не излиза.

Детето се вкопчва в околните; иска да бъде носено; плаче и хленчи, ако някой го докосне; не позволява да му се пипа пулса (**Ant. c., Sanic.**). Лицето — студено, синьо, бледо, покрито със студена пот (**Tab.**).

Езикът — покрит с пастообразен, дебел, бял налеп, с зачервени папили и червени ръбове; червен на ивици; много червен, сух в средата; необикновено желание за ябълки (**Aloe** — за киселини, туршии, **Ant. c.**).

Повръщане: във всяка позиция, освен легнал на дясната страна; докато припадне; последвано от сънливост и прострация; при холера морбус с диария и студена пот — доза след всеки пристъп (**Ver.**).

Асфиксия: механична, като привидна смърт от удавяне; от слюз в бронхите; от настъпваща парализа на белите дробове; от чужди тела в ларинкса или трахеята; със сънливост и кома.

Голяма сънливост или неустойчиво желание за сън, с почти всички оплаквания (**Nux m., Op.**). Дете при раждане — бледо, без дъх, задъхващо се; *asphyxia neonatorum*. Облекчава „смъртното хриптене“ (**Taran.**).

Иктер с пневмония, особено на десния бял дроб.

< Във влажно, студено време; при лягане нощем; топлина на стаята; промяна на времето през пролетта (**Kali s., Nat. s.**).

> Студен открит въздух; седене изправен; експекторация; лежане на дясната страна (**Tab.**).

Apis mellifica

Подходящ за стумозна конституция; жлезите уголемени, втвърдени; скир или открит рак. Жени, особено вдовици; деца и момичета, които, макар обикновено внимателни, стават несръчни и изпускат предмети, докато ги държат (**Bov.**).

Лоши ефекти от остри екзантеми, непълно развити или потиснати (**Zinc.**); морбили, скарлатина, уртикария. Оплаквания от ревност, уплаха, ярост, раздразнение, лоши новини.

Раздразнителна; нервна; неспокойна; трудно удовлетворима. Плачлива натура; не може да се въздържа от плач; обезкуражена, отчаяна (**Puls.**). Внезапни, пронизващи, пискливи писъци от деца при будност или сън (**Hellebore**).

Отоци; торбовидно, подпухнало подуване под очите (над очите — **Kali c.**); на ръцете и краката; воднянка без жажда (с жажда — **Acet. ac., Apoc.**).

Крайна чувствителност към допир (**Bell., Lach.**). Болка: пареща, жилеща, болезнена; внезапно мигрираща от една част към друга (**Kali bi., Lac c., Puls.**).

Без жажда: при анасарка; асцит (**Acetic acid**, но лицето е по-восъчно и има голяма жажда).

Инконтиненция на урина, с голямо раздразнение на частите; едва може да задържи урината миг, а когато я изпусне — силно парене; честа, болезнена, оскъдна, кървава.

Запек: усещане в корема сякаш нещо стегнато би се скъсало, ако се напъва много.

Диария: при пияници; при екзантемни болести, особено ако обривът е потиснат; неволна при всяко движение, сякаш анусът е широко отворен (**Phos.**).

Засяга дясната страна; уголемяване или воднянка на десния яйчник; десния тестис.

Интермитентна треска; студ в 3 ч. следобед, винаги с жажда (**Ign.**); < топла стая и от външна топлина (**Thuja**, 3 ч. сутрин и 3 ч. следобед).

< След сън (**Lach.**); затворени, особено топли и нагрети стаи са непоносими; от намокряне (**Rhus**), но по-добре от измиване или навлажняване на мястото със студена вода.

> Открит въздух; студена вода или студено къпане; разкриване; болките — при кашляне, ходене или смяна на положението; когато седи изправена.

Аросунум cannabinum

Отделянията намалени, особено урината и потта. Воднянка на серозните мембрани; остра, възпалителна. Воднянка: с жажда (**Acet. ac.**), водата не понася или се повръща (**Ars.**); повечето случаи — неусложнени с органични заболявания; след тифус, коремен тиф, скарлатина, цироза; след злоупотреба с хинин.

Остър хидроцефал, с отворени шевове; ступор, загубено зрение на едното око; постоянни и волеви движения на едната ръка и единия крак (лява ръка и крак — **Bry.**); изпъкнало чело.

Аменорея при млади момичета, с подуване или воднянка на корема и крайниците.

Метрорагия: продължително или пристъпно кървене; точно или със съсиреци; гадене, повръщане, палпитации; пулс бърз, слаб при движение; жизнена депресия, припадане при повдигане на главата от възглавницата.

Кашлица, къса и суха, или дълбока и влажна, по време на бременност (**Con.**).

Argentum metallicum

Високи, слаби, раздразнителни хора. Оплаквания от злоупотреба с живак.

Конституционни ефекти от онанизъм. Засяга хрущялите — тарзални, на ушите, носа, Евстахиевата тръба; структурите, влизащи в състава на ставите.

Семенни емисии: след онанизъм; почти всяка нощ; без ерекция; с атрофия на пениса. Смаккваща болка в тестисите (**Rhod.**).

Пролапс; с болка в левия яйчник и гърба, разпространяваща се напред и надолу (десен яйчник — **Pal.**); климактеричен кръвоизлив.

Изтощителна, течаща кориза с кихане. Дрезгавост; при професионални певци, оратори (**Alum.**, **Arum. t.**). Пълна загуба на глас при професионални певци.

Гърлото и ларинксът се усещат сурови или болезнени при преглъщане или кашляне. Смахът възбужда кашлица (**Dros., Phos., Stan.**) и произвежда обилна слюз в ларинкса.

Когато чете на глас, трябва да се прочиства и изхравва; кашлица с лесна експекторация на желатиозна, вискозна слюз, изглеждаща като сварено нишесте.

Голяма слабост на гръдния кош (**Stan.**); по-лошо отляво. Променливост в тембъра на гласа при певци и оратори (**Arum t.**). Сурово място над бифуркацията на трахеята. По-лошо при използване на гласа, говорене или пеене.

< При возене в карета (**Coc.**); при докосване или натиск; при говорене, пеене, четене на глас.

Argentum nitricum

Остри или хронични заболявания от необичайно или продължително умствено усилие. Винаги мисли за **Argentum nit.**, когато видиш изсъхнали, изтощени, старо-изглеждащи пациенти (тънки, кльощави — **Sec.**). Изтощаване, напредващо всяка година; най-изразено в долните крайници (**Am. m.**); маразм.

Безпокойство, когато е готов за църква или опера — появява се диария (**Gels.**). Времето минава бавно (**Can. I.**); импулсивен, иска да върши нещата набързо; трябва да ходи бързо; винаги е забързан; тревожен, раздразнителен, нервен (**Aur. lit.**).

Главоболие: конгестивно, с пълнота и тежест; с усещане за разширяване; обичайно гастрично — при литературни хора; от танцуване; хемикрания, притискаща, завиваща — във фронталната издатина или слепоочието; завършваща с жлъчно повръщане; < от всяко изтощително умствено усилие; > от натиск или стегнато превързване (**Apis, Puls.**).

Остра грануларна конюнктивит; алено-червена, като сурово месо; обилно, мукопурулентно отделяне. *Ophthalmia neonatorum*: обилно, гнойно отделяне; роговицата — мътна, улцерации; клепачите — болезнени, дебели, подути; слепени сутрин (**Apis, Mer. s., Rhus**).

Очна умора от шиене, < в топла стая, > на открит въздух (**Nat. m., Ruta**); заболявания от дефектна акомодация.

Жадува за захар; детето я обича, но получава диария от нея (жадува за солено или пушено месо — **Cal. p.**). Оригване съпровожда повечето стомашни оплаквания.

Флатулентна диспепсия: оригване след всяко хранене; стомахът сякаш ще се пръсне от газове; оригването трудно, накрая въздухът изхвърча с голяма сила.

Диария: зелена слуз, като накълцан спанак на люспи; става зелена, след като престои на пелената; след пиене; след ядене на бонбони или захар; маси муко-лимфа на нишковидни ивици или късове (**Asar.**); с много шумни газове (**Aloe.**).

Диария веднага щом пие (**Ars., Crot. t., Throm.**). Урината изтича несъзнателно ден и нощ (**Caust.**).

Импотентност: ерекцията се проваля при опит за коитус (**Agnus, Calad., Selen.**). Коитус: болезнен и при двата пола; последван от кръвене от влагалището (**Nit. ac.**).

Метрорагия: при млади вдовици; при стерилитет; с нервен еретизъм при климакс (**Lach.**).

Голямо желание за свеж въздух (**Amyl., Puls., Sulph.**). Хроничен ларингит на певци; високите тонове причиняват кашлица (**Alum., Arg. m., Arum.**).

Голяма слабост на долните крайници, с треперене; не може да ходи със затворени очи (**Alum.**). Ходи и стои нестабилно, особено когато мисли, че не го наблюдават.

Конвулсии, предшествани от голямо безпокойство. Усещане за треска в гърлото при преглъщане (**Dolch., Hep., Nit. ac., Sil.**); в или около матката при ходене или возене.

Студен, когато е разкрит, но се чувства задушен, ако е завит; жадува свеж въздух.

Relation. — **Natrum mur.**, за лошите ефекти от каутеризация със сребърен нитрат. Кафето увеличава нервното главоболие. Оплаквания на момчета след употреба на тютюн (**Ars., Ver.**). Подобно: на **Nat. m., Nit. ac., Lach., Aur., Cup.** След **Ver.**; **Lyc.** следва добре при флатулентна диспепсия.

< **Студена храна; студен въздух; ядене на захар; сладолед; необичайно умствено усилие.**

> **Открит въздух; жадува вятъра да духа в лицето; къпане със студена вода.** 200-та или 1000-та потенция във воден разтвор като локално приложение при *ophthalmia neonatorum* е облекчавала, когато суровият сребърен нитрат е провалял.

Arnica montana

Нервни жени, сангвинични плеторични хора, с живо изражение и много червено лице. За лошите ефекти, произтичащи от механични наранявания; дори ако са получени преди години. Особено подходящ за тези, които дълго остават впечатлени дори от леки механични травми.

Болезненост, схванатост, натъртено усещане по цялото тяло, сякаш е бит; травматични заболявания на мускулите. Механични наранявания, особено със ступор от мозъчно

сътресение; неволни изпражнения и урина; след наранявания с тъпи предмети (**Symph.**).

Сложни фрактури и тяхната обилна супурация (**Calend.**). Сътресения и контузии, резултат от шок или травма; с разкъсване на меките тъкани; предотвратява супурация и септични състояния и подпомага абсорбцията.

Нервен, не може да понася болка; цялото тяло свръхчувствително (**Cham., Coff., Ign.**). Всичко, на което лежи, му се струва твърде твърдо; постоянно се оплаква от това и се мести от място на място в търсене на по-меко място (частите, върху които лежи, се усещат болезнени и натъртени — **Bap., Pyr.**; трябва да се движи непрекъснато, за да получи облекчение от болката — **Rhus**).

Топлина в горната част на тялото; студенина в долната. Лицето или главата и лицето са горещи, тялото — хладно.

Безсъзнание; когато му говорят, отговаря правилно, но безсъзнанието и делириумът веднага се връщат (заспива в средата на изречението — **Bap.**). Казва, че няма нищо лошо с него.

Менингит след механични или травматични наранявания; от падания, мозъчни сътресения и др. Когато се подозира ексудация на кръв — за улесняване на абсорбцията. Хидроцефал; смъртна студенина в предмишниците на деца (при диария — **Brom.**).

Апоплексия; загуба на съзнание, неволно изпразване на червата и пикочния мехур; при остър пристъп — контролира кръвоизлива и подпомага абсорбцията; трябва да се повтаря и да се остави да действа дни или седмици, освен ако симптомите не изискват друго лекарство.

Конюнктивален или ретинален кръвоизлив, с екстравазация, от наранявания или кашлица (**Led., Nux.**).

Подагра и ревматизъм, с голям страх да бъде докоснат или ударен от хора, които се приближават. Не може да ходи изправен поради натъртено усещане в тазовата област.

Склонност към малки, болезнени циреи, един след друг, изключително болезнени (малки циреи на групи — **Sulph.**).

Парализа (лява страна); пулс пълен, силен; стридор, въздишки, мърморене.

Оригване; газове; зловонни, гнили, като развалени яйца.

Дизентерия; с ишурия, безплодни напъни; дълъг интервал между изхожданията.

Запек: ректумът натоварен, изпражненията не излизат; лентовидни изпражнения — от уголемена простата или ретроверзия на матката.

Болезненост на частите след раждане; предотвратява постпартална хеморагия и пuerпeрални усложнения. Задържане или инконтиненция на урина след раждане (**Op.**).

Relation. — Допълва: **Acon., Hyper., Rhus.** Подобно: за болезненост като натъртено — **Bap., China, Phyt., Pyr., Rhus, Ruta, Staph. Arnica** следва добре: след **Acon., Apis., Ham., Ipec., Ver.**; следвана от **Sul. ac.** При оплаквания от спиртни напитки или от въгленови изпарения — **Arn.** често е показана (**Am. c., Bov.**). При спинално сътресение — сравни **Hyper.**

< **В покой; при лягане; от вино.**

> **От контакт; движение (Rhus, Ruta).**

Arsenicum album

Голяма прострация, с бързо спадане на жизнените сили; припадък. Настроението е:

a — Потиснато, меланхолично, отчаяно, безразлично.

b — Тревожно, изплашено, неспокойно, пълно с мъка.

c — Раздражително, чувствително, кисело, лесно обидчиво.

Колкото по-голямо е страданието, толкова по-големи са мъката, неспокойствието и страхът от смъртта. Умствено неспокоен, но физически твърде слаб, за да се движи; не може да почива никъде: непрекъснато сменя мястото; иска да бъде местен от едно легло на друго, и лежи ту тук, ту там.

Тревожен страх от смърт; мисли, че е безполезно да взема лекарства, че е неизлечим, че със сигурност ще умре; ужас от смъртта, когато е сам или когато си ляга. Пристъпи на тревожност нощем, изгонващи го от леглото, < след полунощ.

Парещи болки; засегнатите части горят като огън, сякаш горещи въглени са приложени върху тях (**Antr.**), > от топлина, топли напитки, топли апликации.

Пареща жажда без особено желание да пие; стомахът сякаш не понася, защото не може да асимилира студена вода; лежи като камък в стомаха. Исква я, но не може или не смее да я пие.

Не може да понася миризмата или вида на храна (**Colch., Sep.**). Голяма жажда за студена вода; пие често, но по малко; яде рядко, но много.

Стомашни разстройства: след студени плодове; сладолед; студена вода; кисела бира; развалена наденица; алкохолни напитки; силно сирене.

Пробиващи зъби деца — бледи, слаби, раздразнителни, искат да бъдат носени бързо.

Диария след ядене или пиене; изпражнения оскъдни, тъмни, зловонни, и независимо дали са малки или големи — последвани от голяма прострация.

Хемороиди: с жилеща болка при ходене или седене, не при изхождане; пречат да седи или да спи; пареща болка < от топлина; фисури затрудняват уринирането.

Дишане: астматично; трябва да седи или да се навежда напред; скача от леглото нощем, особено след дванадесет часа; не може да лежи от страх от задушаване; пристъпи като круп вместо обичайната уртикария.

Бързо изтощаване: със студена пот и голяма слабост (**Tub., Ver.**); на засегнатите части; маразъм.

Анасарка, кожата бледа, восъчна, земна (**Acet. ac.**).

Прекомерно изтощение от най-малкото усилие. Изтощението не се усеща, докато лежи неподвижно; когато се движи, се изненадва колко е слаб.

Симптомите обикновено по-лоши 1–2 ч. следобед, 12–2 ч. след полунощ.

Кожа: суха и лющеща се; студена, синя и набръчкана; със студена, лепкава пот; като пергамент; бяла и тестовидна; черни везикули и пареща болка.

Лоши ефекти от развалена храна или животинска материя — чрез инокулация, вдишване или поглъщане.

Оплакванията се връщат ежегодно (**Carbo v., Lach., Sulph., Thuja**).

Relation. — Допълва: **Allium s., Carbo v., Phos., Pyr. Ars.** трябва да се мисли при оплаквания от: дъвчене на тютюн; алкохолизъм; морски бани; отравяне с наденица; рани от дисекция и антракс; ужилвания от отровни насекоми.

< След полунощ (1 до 2 ч. сутрин или следобед); от студ; студени напитки или храна; когато лежи на засегнатата страна или с ниско поставена глава.

> От топлина като цяло (обратното на Sec.), освен главоболието, което временно е > от студено къпане (Spig.); парещата болка > от топлина.

Arum triphyllum

Кориза; разяждаща, течаща; ноздрите — сурови. Носът се усеща запушен въпреки воднистото отделяне (сравни **Am. c., Samb., Sinap.**); кихане < нощем.

Разяждащо, ихорозно отделяне, разраняващо вътрешността на носа, крилата и горната устна (**Ars., Cepa**). Постоянно човъркане в носа, докато започне да кърви; бъркане с пръст в страната на носа.

Човърка устните, докато започнат да кървят; ъглите на устата — болезнени, напукани, кървящи (с малигна тенденция — **Cund.**); гризе ноктите, докато пръстите започнат да кървят.

Пациентите човъркат и бъркат в суровите, кървящи повърхности, въпреки че са много болезнени; крещят от болка, но продължават да човъркат (при дифтерия, скарлатина, тиф).

Децата отказват храна и напитки поради болезненост на устата и гърлото (**Mer.**); безсъние.

Слюнка — обилна, разяждаща, разяжда лигавицата; езикът и устната кухина — сурови и кървящи.

Афония: пълна, след излагане на северозападни ветрове (**Acon., Hep.**); от пеење (**Arg. n., Caust., Phos., Sel.**).

„Гърло на проповедник“; гласът — дрезгав, несигурен, неконтролируем, непрекъснато променящ се; по-лошо от говорене, говорене на глас или пеење; при оратори, певци, актьори.

Десквамация на големи люспи, втори или трети път, при скарлатина. Тифозна скарлатина, с апатия, оскъдна или потисната урина; заплашваща уремия.

Болезнената уста и нос са водещи симптоми при малигна скарлатина и дифтерия.

Asarum europaeum

Нервни, тревожни хора; възбудими или меланхолични. Представя си, че се носи във въздуха като дух (**Lac. c.**); лекота на всички крайници. Студени „трепети“ от всяка емоция.

Свръхчувствителност на нервите — драскането на лен или коприна, шумоленето на хартия е непоносимо (**Fer. tar.**). Усещане сякаш ушите са запушени с чуждо тяло.

Когато чете — усещане в очите сякаш ще бъдат притиснати и разтворени навън; облекчено от измиване със студена вода. Студен въздух или студена вода са много приятни за очите; слънце, светлина и вятър са непоносими.

Гадене: на пристъпи или постоянно (**Ipec.**); < след ядене, език чист (**Sulph.**); при бременност.

Непреодолимо желание за алкохол; популярно средство в Русия за пияници. „Ужасно усещане“ на притискане, копаене в стомаха при събуждане сутрин (след запой).

Голяма слабост и постоянно прозяване.

Relation. — Подобно: на **Caust.** по модалности; на **Aloe, Arg. n., Mer., Pod., Puls., Sulph. ac.** при нишковидни, влакнести изпражнения. Следвано от: **Bis., Caust., Puls., Sulph. ac.**

< В студено и сухо, или ясно, хубаво време (**Caust.**).

> Измиване на лицето или къпането на засегнатите части със студена вода; във влажно, мокро време (**Caust.**).

Asterias rubens

За сикотичната диатеза; отпусната, лимфатична конституция; раздразнителен темперамент. Лесно възбудим от всяка емоция, особено от противоречия (**Anac., Con.**).

Топлина в главата, сякаш е заобиколена от горещ въздух. Сангвинозна конгестия към мозъка. Апоплексия; лицето — червено, пулс — твърд, пълен, чест.

Рак на млечната жлеза; остри, пронизващи болки; дърпаща болка в гърдата; подута, напрегната, както преди мензис; гърдата се усеща издърпана навътре.

Появява се тъмночервено петно, разкъсва се и отделя; постепенно обхваща цялата гърда, много зловонна миризма; ръбовете — бледи, повдигнати, мамилярни, твърди, обърнати навън; дъното — покрито с червеникави грануляции.

Походката — несигурна; мускулите отказват да се подчинят на волята (**Alum., Gels.**).

Епилепсия: потрепвания по цялото тяло четири или пет дни преди пристъпа.

Запек: упорит; безрезултатно желание; изпражнения — твърди, кръгли топки, като маслини.

Диария: водниста, кафява, изхвърляща се в силна струя (**Crot. t., Grat., Gum., Jatr., Thuja**).

Полово желание — увеличено при жените (**Lit.**).

Aurum metallicum

Сангвинични, румени хора, с черна коса и очи; живи, неспокойни, тревожни за бъдещето. Възрастни хора; слабо зрение; пълни; уморени от живота.

За конституции, разрушени от лошите ефекти на живак и сифилис. „Пиннинг“ момчета; унили, безжизнени, със слаба памет, лишени от „момчешки устрем“; тестисите — неразвити, висящи като парцали.

Постоянно мисли за самоубийство (**Naja** — но се страхува да умре, **Nux**). Дълбока меланхолия: чувства се омразен и свадлив; желание да извърши самоубийство; животът е постоянно бreme; след злоупотреба с живак; с почти всички оплаквания.

Неспокоен, забързан, голямо желание за умствена и физическа активност; не може да върши нещата достатъчно бързо (**Arg. n.**).

Оплаквания от уплаха, гняв, противоречия, унижение, раздразнение, страх или потиснато недоволство (**Staph.**).

Сврхчувствителен: най-малкото противоречие предизвиква гняв (**Con.**); към болка; към миризма, вкус, слух, допир (**Anac.**).

Главоболие при хора с тъмна маслиново-кафява кожа; тъжни, мрачни, мълчаливи; склонни към запек; от най-малкото умствено усилие.

Косопад, особено при сифилис и меркуриални заболявания.

Хемиопия: вижда само долната половина (вижда само лявата половина — **Lith. c.**, **Lyc.**).

Сифилитични и меркуриални заболявания на костите. Кариес: на носните, небцовите и мастоидните кости; озена, оторея, изключително зловонно отделяне, болки по-лоши нощем; довеждат до отчаяние; от меркуриален или сифилитичен произход (**Asaf.**).

Пролапс и втвърдяване на матката; от прерязтягане или напъване (**Pod.**, **Rhus**); от хипертрофия (**Con.**).

Менструални и маточни заболявания, с голяма меланхолия; < по време на мензис.

Лош дъх; при момичета в пубертета.

Усещане сякаш сърцето спира; сякаш престава да бие и после внезапно дава силен удар (**Sep.**). Силна палпитация; тревожност, с конгестия на кръв към главата и гърдите след усилие; пулс малък, слаб, бърз, нерегулярен; видимо биене на каротидните и темпоралните артерии (**Bell.**, **Glon.**).

Масна дегенерация на сърцето (**Phos.**).

< На студен въздух; при изстиване; при лягане; умствено усилие; много оплаквания се появяват само през зимата.

> В топъл въздух; когато се стопля; сутрин и през лятото.

Baptisia tinctoria

За лимфатичния темперамент. Голяма прострация, с тенденция към разлагане на течностите (**Pyr.**); улцерация на лигавиците.

Всички изпарения и отделяния — зловонни, особено при тиф или друго остро заболяване; дъх, изпражнения, урина, пот, язви (**Psor.**, **Pyr.**).

Отвращение към умствено усилие; неразположение или липса на способност да мисли. Пълно безразличие, не го е грижа да прави каквото и да е, неспособност да съсредоточи ума върху работа.

Ступор; заспива, докато му говорят, или в средата на отговора си (когато му говорят, отговаря правилно, но делириумът веднага се връща — **Arn.**).

Език: първо покрит с бяло, с червени папили; сух и жълто-кафяв в центъра; по-късно — сух, напукан, улцериран.

Лицето — зачервено, мрачно, тъмночервено, с тъп, опиянен, замаян израз (**Gels.**).

Може да преглъща само течности (**Bar. c.**); най-малката твърда храна предизвиква даване (може да преглъща само течности, но има отвращение към тях — **Sil.**).

Безболезнено възпалено гърло; сливици, меко небце и паротиди — тъмночервени, подути; гнилостно, зловонно отделяне (**Diph.**).

Дизентерия при възрастни хора; диария при деца, особено когато е много зловонна (**Carbo v.**, **Pod.**, **Psor.**).

Не може да заспи, защото не може „да се събере“; главата или тялото се усещат разпръснати из леглото; мята се, за да „събере частите“; мисли, че е трима души и не може да ги държи покрити (**Petr.**).

В каквато и позиция да лежи пациентът, частите, върху които лежи, се усещат болезнени и натъртени (**Pyr.** — сравни **Arn.**, **Pyr.**).

Декубитус при тиф (**Arn.**, **Mur. ac.**, **Pyr.**).

Relation. — Подобно: на **Arn.**, **Ars.**, **Bry.**, **Gels.** в ранните стадии на треска с неразположение, нервност, зачервено лице, сънливост и мускулна болезненост. Когато **Ars.** е бил правилно даден или твърде често повторен при тиф или тифус. След **Baptisia**: **Crot.**, **Ham.**, **Nit. ac.** и **Tereb.** действат добре при кръвоизливи в тиф и тифус.

Baryta carbonica

Особено подходящо за оплаквания на първото и второто детство; псорични или туберкуларни. Паметта — недостатъчна; забравящ, невнимателен; детето не може да бъде научено, защото не може да помни; заплашваща идиотия.

Скрофулозни, джуджести деца, които не растат (деца, които растат твърде бързо — **Cal.**); скрофулозна офталмия, роговицата — мътна; коремът — подут; чести пристъпи на колики; лицето — подпухнало; общо изтощение.

Децата — физически и умствено слаби. Джуджести, истерични жени и стари моми с оскъден мензис; недостатъчна топлина, винаги студени и мръзнещи.

Стари, кахектични хора; скрофулозни, особено когато са пълни; или такива, които страдат от подагрозни оплаквания (**Fluor. ac.**).

Болести на възрастни мъже; хипертрофия или втвърдяване на простатата и тестисите; умствена и физическа слабост.

Апоплектична тенденция при възрастни хора; оплаквания на стари пияници; главоболие на възрастни хора, които са детински.

Хора, склонни към ангини; лесно настиват, или при всяко, дори най-малко настиване получават тонзилит, склонен към супурация (**Hep., Psor.**).

Неспособност да преглъща нещо освен течности (**Bap., Sil.**).

Хемороиди — пролабират всеки път, когато уринира (**Mur. ac.**).

Хронична кашлица при псорични деца; уголемени сливици или удължена увула; < след леко настиване (**Alum.**).

Подуване и втвърдяване, или начеваща супурация на жлезите, особено цервикални и ингвинални.

Зловонна пот на краката; пръстите и стъпалата се разраняват; на петите; гърлени заболявания след потисната пот на краката (сравни **Graph., Psor., Sanic., Sil.**).

Голяма чувствителност към студ (**Cal., Kali c., Psor.**).

Relation. — Често полезно преди или след **Psor., Sulph.**, и **Tub.** След **Bar. c., Psor.** често премахва конституционната склонност към ангини. Подобно: на **Alum, Cal. iod., Dul., Fluor. ac., Iod., Sil.** Несъвместимо: след **Calc.** при скрофулозни заболявания.

< Когато мисли за болестта си (**Oxal. ac.**); при лежане на болезнената страна; след ядене; при измиване на засегнатите части.

Belladonna

Подходящо за билиозни, лимфатични, плеторични конституции; хора, които са живи и забавни, когато са здрави, но буйни и често делириозни, когато са болни. Жени и деца със светла коса и сини очи, фин тен, деликатна кожа; чувствителни, нервни, заплашени от конвулсии; туберкулозни пациенти.

Голяма склонност да настиват; чувствителни към течение, особено при разкриване на главата; след подстригване; сливиците се възпаляват след езда в студен вятър (**Acon.**, **Hep.**, **Rhus** — настива от излагане на краката, **Con.**, **Cup.**, **Sil.**).

Бърза чувствителност и движение; очите щракат и се движат бързо; болките идват внезапно, продължават неопределено и спират внезапно (**Mag. p.**). Болките обикновено са в кратки пристъпи; причиняват зачервяване на лицето и очите; пълнота в главата и пулсация на каротидите.

Представя си, че вижда духове, ужасни лица и различни насекоми (**Stram.**); черни животни, кучета, вълци. Страх от въображаеми неща, иска да избяга от тях; халюцинации.

Бурен делириум; склонност да хапе, плюе, удря и къса неща; избухва в пристъпи на смях и скърца със зъби; иска да хапе и удря обслужващите (**Stram.**); опитва да избяга (**Hell.**).

Главата — гореща и болезнена; лицето — зачервено; очите — диви, втречени, зениците — разширени; пулс — пълен и удрящ, сферичен, като сачми удрящи пръста; лигавицата на устата — суха; изпращения — забавени, урина — потисната; сънлив, но не може да спи (**Cham.**, **Op.**).

Конвулсии по време на пробиване на зъби, с треска (без треска — **Mag. p.**); идват внезапно, главата — гореща, краката — студени.

Прилив на кръв към главата и лицето (**Amyl.**, **Glon.**, **Mel.**).

Главоболие, конгестивно, с червено лице, пулсация на мозъка и каротидите (**Met.**); < от лек шум, удар, движение, светлина, лягане, най-малко усилие; > от натиск, стегнато превързване, завиване, по време на мензис.

Борене на главата в възглавницата (**Apis**, **Hell.**, **Pod.**).

Виене на свят при навеждане или при изправяне след навеждане (**Bry.**); при всяка промяна на положението.

Коремът — чувствителен, подут, < от най-малкия удар, дори от леглото; принуден да ходи много внимателно от страх от удар.

Болка в дясната илеоцекална област, < от най-лек допир, дори от завивката.

Трансверзалното дебело черво изпъква като възглавничка.

Кожа: равномерно, гладко, блестящо алено зачервяване; суха, гореща, пареща; предава парещо усещане на изследващата ръка; истинската Сиденхамова скарлатина, където обривът е напълно гладък и истински ален.

Натиск надолу, сякаш съдържанието на корема ще излезе през вулвата; > стоене и седене изправена; по-лошо сутрин (**Lil.**, **Mur.**, **Sep.**).

< **От допир, движение, шум, течение, гледане на ярки, блестящи предмети (Lys., Stram.);** след 3 ч. следобед; нощем, след полунощ; при пиене; разкриване на главата; лятно слънце; лягане.

> **Почивка; стоене или седене изправена; топла стая.**

Benzoic acid

Подагрозна, ревматична диатеза, присадена върху гонорейно или сифилитично болен. Подагрозни конкреции; *arthritis vaga*; засяга всички стави, особено коляното, пука при движение; нодозитети (**Berb.**, **Lith.**, **Lys.**).

Урината — тъмнокафява, с много усилена урина миризма. Нощна енуреза при деликатни деца; капеща урина при възрастни мъже с уголемена простата; силна характерна миризма; излишък на пикочна киселина.

Катара на пикочния мехур след потисната гонорея.

Диария при деца; бели, много зловонни, изтощителни течни изпражнения, които „преминават направо през пелената“ (**Pod.**); урината — зловонна и тъмnochервена.

Кашлица: с експекторация на зелена слуз (**Natr. s.**); крайна умора, отпадналост.

Болки — разкъсващи, пробождащи — в големите стави на палеца на крака; зачервяване и подуване на ставите; подагра < нощем.

Relation. — Подобно: на **Cop.**, **Nitr.**, **Fer.**, **Thuja**, особено при енуреза, след като **Nitr.** е пропаднал; **Berb.**, **Lith. c.** при артритни оплаквания. Полезно след като **Colch.** пропадне при подагра; след злоупотреба с **Cop.** при потисната гонорея. Несъвместимо: вино, което влошава уринарните подагрозни и ревматични заболявания.

Berberis vulgaris

Бъбречните или везикалните симптоми преобладават. Болка в поязната област; много чувствителна към допир в бъбречната област; < при седене и лежане, от удар, от умора. Парене и болезненост в областта на бъбреците.

Изтръпване, скованост, схванатост с болезнен натиск в бъбречната и лумбалната област.

Блед, земен тен, с хлътнали бузи и кухи, сини кръгове около очите.

Ревматични и подагрозни оплаквания, с болести на пикочните органи.

Колика от жлъчни камъни. Билиозна колика, последвана от жълтеница; изпразнения с цвят на глина; фистула на ануса, с билиозни симптоми и сърбеж на частите; къса кашлица и гръдни оплаквания, особено след операции за фистули (**Cal. p.**, **Sil.**).

Пробождаща, режеща болка от левия бъбрек, следваща хода на уретера към пикочния мехур и уретрата (**Tab.** — десен бъбрек, **Lyc.**). Бъбречна колика. < лява страна (**Tab.** — която и да е страна), с позиви и странгурия (**Canth.**).

Усещане за триене в бъбреците (**Med.**).

Урина: зеленикава, кървавочервена, с гъста, слuzеста слuz; прозрачна, червеникава или с желеподобна утайка.

Движението предизвиква или увеличава уринарните оплаквания.

Relation. — Подобно: на **Canth.**, **Lyc.**, **Sars.**, **Tab.** при бъбречна колика. Действа добре след **Arn.**, **Bry.**, **Kali bi.**, **Rhus**, **Sulph.** при ревматични заболявания.

< **Движение, ходене или возене в карета; всяко внезапно разклащащо движение.**

Bismuth

Самотата е непоносима; желае компания, детето се държи за ръката на майка си за компания (**Kali c.**, **Lil.**, **Lyc.**). Мъка; сяда, после ходи, после ляга — никога дълго на едно място.

Главоболие, връщащо се всяка зима; редуващо се с гастралгия или придружено от нея.

Лице — смъртно бледо, сини кръгове около очите.

Зъбобол > държане на студена вода в устата (**Bry.**, **Coff.**, **Puls.**).

Повръщане: на вода веднага щом достигне стомаха, храната се задържа по-дълго (повръща храна и вода — **Ars.**); на огромни количества, през интервали от няколко

дни, когато храната е напълнила стомаха; на всички течности веднага щом се вземат; и прочистване, зловонни изпражнения (воднисти изпражнения — **Ver.**); с конвулсивно даване и неизразима болка, след лапаротомия (**Nux, Staph.**).

Стомах: натиск като от товар в едно място; редуващ се с парене; болка — крампозна, спазматична; с раздразнение, кардиялгия и пироза.

Cholera morbus и летни разстройства, когато повръщането преобладава; изпражнения — зловонни; кашави, воднисти, много изтощителни (**Ars., Ver.**).

Borax

Страх от движение надолу при почти всички оплаквания. Голяма тревожност от движение надолу; когато детето бъде полагано на диван или в люлката — плаче и се вкопчва в баващата; при люлеене, танцуване, люлки; слизание по стълби или бързо спускане по хълм; езда (**Sanic.**).

Деца се събуждат внезапно, с писък, и се хващат за страните на люлката, без видима причина (**Apis, Cina, Stram.**).

Изключително нервни, лесно изплашени от най-слаб шум или необичаен остър звук — кашлица, кихане, вик, запалване на кибрит и др. (**Asar., Calad.**).

Косата става рошава и сплъстена; цепи се, слепва се на върховете; ако тези кичури бъдат отрязани, се образуват отново, не може да бъде сресана (**Flour. ac., Lyc., Psor., Tub.**).

Мигли: покрити със сух, лепкав ексудат; слепени сутрин; извиват се навътре и възпаляват окото, особено външния ъгъл; склонност към „диви косми“.

Ноздрите — корички, възпалени; върхът на носа — блестящо червен; червени носове при млади жени.

Запушване на дясната ноздра, или първо дясната, после лявата, с постоянно духане на носа (**Am. c., Lac c., Mag. m.**).

Афти: в устата, на езика, от вътрешната страна на бузата; лесно кървят при ядене или допир; пречат на детето да суче; с гореща уста, сухота и жажда (**Ars.**); напукан и кървящ език (**Arum.**); саливация, особено при пробиване на зъби.

Афтозен стоматит; по-лош от допир; от ядене на солена или кисела храна; при възрастни хора, често от зъбни протези (**Alumen**).

Детето има често уриниране и крещи преди да мине урината (**Lyc., Sanic., Sars.**).

Левкорей: обилна, албуминозна, нишестена, с усещане сякаш топла вода се стича надолу; за две седмици между менструациите (сравни **Bov.**, **Con.**).

Кожа: нездрава, леки наранявания супурират (**Calend.**, **Hep.**, **Mer.**, **Sil.**).

Relation. — **Borax** следва: **Calc.**, **Psor.**, **Sanic.**, **Sulph.** Следвано от: **Ars.**, **Bry.**, **Lyc.**, **Phos.**, **Sil.** Несъвместимо: не трябва да се използва преди или след оцетна киселина, оцет, вино.

< **Движение надолу; от внезапни, леки шумове; пушене, което може да предизвика диария; влажно, студено време; преди уриниране.**

> **Натиск; държане на болезнената страна с ръка.**

Bovista

Хора, които страдат от тетърни обриви, сухи или влажни. Подходящо за стари моми; с палпитации. Заекващи деца (**Stram.**).

Отделяне от носа и всички лигавици; много жилаво, нишковидно, лепкаво (**Kali bi.**).

Обикновено дълбок отпечатък на пръста от използване на тъпи инструменти, ножици, нож и др.

Непоносимост към стегнато облекло около кръста (**Calc.**, **Lach.**, **Sulph.**).

Пот под мишниците — мирише на лук.

Кръвоизлив: след изваждане на зъб (**Ham.**); от рани, епистаксис.

Голяма слабост на ставите и умора на ръцете и краката.

Несръчност, склонност да изпуска предмети от ръка (**Apis**); предметите падат от безсилни ръце.

Менструация: течението е само нощем; не през деня (**Mag. c.** — само през деня, спира при лягане — **Cac.**, **Caust.**, **Lil.**); на всеки две седмици, тъмно и със съсиреци; с болезнено притискане надолу (**Sep.**).

Нетърпим сърбеж на върха на опашната кост; трябва да се чеше, докато частите станат сурови и болезнени.

Bromium

Действа най-добре, но не изключително, при хора със светлосини очи, ленена коса, светли вежди, светла, деликатна кожа; руси, червенобузи, скрофулозни момичета.

Усещане за паяжина по лицето (**Bar.**, **Bor.**, **Graph.**).

Ветрилообразно движение на крилата на носа (**Ant. t.**, **Lyc.**).

Моряци страдат от астма „на сушата“.

Каменни, твърди, скрофулозни или туберкулозни подувания на жлезите, особено на долната челюст и гърлото (щитовидна, субмаксиларна, паротидна, тестиси).

Дифтерия: когато мембраната се образува във фаринкса; започва в бронхите, трахеята или ларинкса и се разпространява нагоре; болки в гърдите, излъчващи нагоре.

Мембранозен и дифтеритичен круп; много дрънчаща слуз при кашлица, но без задущаване (както при **Hepar.**); звучи хлабаво, но няма експекторация (**Ant. t.**).

Крупозни симптоми с дрезгавост по време на коклюш; задъхване за въздух.

Диспнея: не може да вдиша достатъчно дълбоко; сякаш диша през гъба или дихателните пътища са пълни с дим или изпарения на сяр; дрънчащо, трионоподобно дишане; гласът — нечуем; опасност от задущаване от слуз в ларинкса (в бронхите — **Ant. t.**).

Хипертрофия на сърцето от гимнастика при растящи момчета (от калистеника при млади момичета — **Caust.**).

Физометра; силно изпускане на газове от влагалището (**Lyc.**); мембранозна дисменорея (**Lac. c.**).

Студено усещане в ларинкса при вдишване (**Rhus**, **Sulph.**); > след бръснене (< след бръснене — **Carbo an.**).

Bryonia alba

Най-подходящо за хора с подагрозна или ревматична диатеза; склонни към т.нар. билиозни пристъпи. Пациентите на **Bryonia** са раздразнителни, склонни да бъдат бурни и гневни; с тъмна или черна коса, тъмен тен, стегната мускулатура; сухи, нервни, стройни хора (**Nux**).

Болки: пробощащи, разкъсващи, по-лоши нощем; < от движение, вдишване, кашляне; > от абсолютна почивка и лежане на болезнената страна (**Ptel.**, **Puls.** — пробощаща болка, но < и > са противоположни при **Kali c.**).

Прекомерна сухота на лигавиците на цялото тяло; устни и език — сухи, напукани; изпражнения — сухи като изгорени; кашлица — суха, силна, мъчителна, с оскъдна експекторация; урина — тъмна и оскъдна; голяма жажда.

Викарна менструация; кръвотечение от носа, когато мензисът трябва да се появи (**Phos.**); кръвохрак или хемоптиза.

Оплаквания от огорчение, унижение, гняв (**Col.**, **Staph.**); бурност, с втрисане и студенина; след гняв — студенина, но главата — гореща и лицето — червено (**Aur.**).

Оплаквания: когато настъпи топло време след студени дни; от студени напитки или лед в горещо време; след настиване или прегряване през лятото; от охлаждане, когато е прегрял; рита завивките; от излагане на течение, студен вятър (**Acon.**, **Hep.**); потиснати отделяния — мензис, мляко или обриви при остри екзантеми.

Една от главните характеристики на **Bryonia** е: влошаване от всяко движение и съответно облекчение от абсолютна почивка — умствена или физическа.

Желание за неща веднага, които не могат да бъдат получени, или които, когато бъдат предложени, се отказват.

Децата не обичат да бъдат носени или повдигани.

Делириум: говори постоянно за своята работа; желание да стане от леглото и да се прибере у дома (**Act.**, **Hyos.**).

Постоянно движение на лявата ръка и крак (**Apoc.**, **Hell.**). Пациентът не може да седне от гадене и слабост.

Голяма жажда за големи количества, на дълги интервали.

Главоболие: при навеждане, сякаш мозъкът ще пробие челото; от гладене (**Sep.**); при кашляне; сутрин след ставане или при първо отваряне на очите; започва сутрин, постепенно се усилва до вечерта; от запек (**Aloe**, **Colin.**, **Op.**).

Натиск като от камък в ямката на стомаха, облекчен от оригване (**Nux**, **Puls.**).

Запек: инертни черва, без желание; изпражнения — големи, твърди, тъмни, сухи, като изгорени; при пътуване по море (**Plat.**).

Диария: по време на горещо време; билиозна, разяждаща, с болезненост на ануса; като мръсна вода; от несмляна храна; от студени напитки, когато е прегрял; от плодове или кисело зеле; < сутрин, при движение, дори на ръка или крак.

Млечните жлези — тежки, каменно твърди; бледи, но твърди; горещи и болезнени; трябва да поддържа гърдите (**Phyt.**).

Кашлица: суха, спазматична, с даване и повръщане (**Kali c.**); с пробуждания в страната на гърдите; с главоболие, сякаш главата ще се разпадне; < след ядене, пиене, влизане в топла стая, дълбоко вдишване.

< Движение, усилие, допир; не може да седне — припада или му прилошава, или и двете; топлина, топли завивки; потиснати отделения от всякакъв вид.

> Лежане, особено на болезнената страна (**Ptel., Puls.**); натиск; покой; студено, ядене на студени неща.

Cactus grandiflorus

Сангинозни конгестии при хора с плеторична конституция (**Acon.**); често завършващи с кръвоизлив; сангинозна апоплексия.

Страх от смърт; вярва, че болестта е неизлечима (**Ars.**).

Кръвоизлив: от носа, белите дробове, стомаха, ректума, пикочния мехур (**Crot., Mill., Phos.**).

Главоболие, притискащо като тежест върху върха на главата (> от натиск — **Meny.**); климактерично (**Glon., Lach.**).

Главоболие и невралгия; конгестивни, периодични, десностранни; силна, пулсираща, трептяща болка.

Цялото тяло се усеща сякаш е в клетка, всяка тел се затяга все по-силно и по-силно.

Стягане: на гърлото, гърдите, сърцето, пикочния мехур, ректума, матката, влагалището; често причинено или предизвикано от най-лекия допир.

Тежест в гърдите, сякаш от голям товар; сякаш железен обръч пречи на нормалното движение.

Усещане за въже, силно вързано около долната част на гръдния кош, отбелязващо прикрепването на диафрагмата.

Сърцето се усеща сякаш бързо се стиска и отпуска от желязна ръка; сякаш е вързано, „няма място да бие“.

Болки навсякъде; стрелкащи, пружиниращи като верижна мълния, завършващи с остро, менгемеобразно стискане, само за да се повторят отново.

Менструалният поток спира, когато лежи (**Bov., Caust.**).

Палпитация: ден и нощ; по-лоша при ходене и при лежане на лявата страна (**Lach.**); при приближаване на мензиса.

Пристъпът на треска се връща в 11 ч. сутрин и 11 ч. вечер.

Calcareo ostrearum

Леукфлегматични, руса коса, светъл тен, сини очи, светла кожа; склонност към затлъстяване в младостта. Псорични конституции; бледи, слаби, плашливи, лесно уморяващи се при ходене.

Склонни да напълняват, корпулентни, тромави. Деца с червено лице, отпусната мускулатура, които лесно се потят и вследствие на това лесно настиват.

Големи глави и кореми; фонтанелите и шевове — отворени; костите — меки, развиват се много бавно. Изкривяване на костите, особено на гръбнака и дългите кости; крайниците — криви, деформирани; костите — неравномерно развити.

Главата се поти обилно по време на сън, намокряйки възглавницата наоколо (**Sil.**, **Sanic.**). Обилно изпотяване, главно на тила и шията, или на гърдите и горната част на тялото (**Sil.**).

Трудно и забавено пробиване на зъби с характерното изпотяване на главата и отворени фонтанели.

По време на болест или възстановяване — голямо желание за яйца; копнее за несмилаеми неща (**Alum.**); отвращение към месо.

Киселинност на храносмилателния тракт; кисели оригвания, кисело повръщане, кисели изпражнения; кисела миризма на цялото тяло (**Hep.**, **Rheum.**).

Момичета, които са пълни, плеторични и растат твърде бързо.

Менструация — твърде ранна, твърде обилна, твърде продължителна; с последваща аменорея и хлороза, с оскъден или потиснат мензис.

Жени: мензис твърде ранен, твърде обилен; краката — постоянно студени и влажни, сякаш са с мокри студени чорапи; непрекъснато студена в леглото.

Най-малкото умствено вълнение причинява обилно връщане на менструалния поток (**Sulph.**, **Tub.**).

Страхува се, че ще загуби разсъдъка си или че хората ще забележат умственото ѝ объркване (**Act.**).

Белодробни заболявания при високи, стройни, бързо растящи младежи; горната трета на десния бял дроб (**Ars.** — горен ляв, **Myr.**, **Sulph.**); по-често води към конституционното лекарство, отколкото **Phosphorus** (сравни **Tub.**).

Болести, произтичащи от дефектна асимилация; несъвършена осификация; трудност при научаване да ходи или стои; децата нямат желание да ходят и не опитват; потиснато изпотяване.

Разраняване на стъпалата от изпотяване (**Graph., Sanic.**); мехури и зловонна пот на краката.

Желание за свеж въздух (когато е в стая), който вдъхновява, облекчава, укрепва (**Puls., Sulph.**).

Студенина: обща; на отделни части (**Kali bi.**); глава, стомах, корем, крака и ходила; отвращение към студен открит въздух — „пронизва я“; чувствителност към студен, влажен въздух; голяма склонност да настива (противоположно на **Sulph.**).

Пот: на отделни части; глава, скалп — мокри, студени; тил; гърди; подмишници; полови органи; ръце, колене; крака (**Sep.**).

Ямката на стомаха — подута като обърната чиния и болезнена при натиск.

Уремични или други заболявания, причинени от стоене върху студени, влажни настилки или работа, докато стои в студена вода; моделиери или работници в студена глина.

Чувства се по-добре във всяко отношение, когато е запечена.

Изпражненията трябва да бъдат отстранявани механично (**Aloe., Sanic., Sel., Sep., Sil.**).

Безболезнена дрезгавост < сутрин.

Желание да бъде магнетизирана (**Phos.**).

< **Студен въздух; влажно време; студена вода; от миене (Ant. c.); сутрин; по време на пълнолуние.**

> **Сухо време; лежане на болезнената страна (Bry., Puls.).**

Calcareo phosphorica

За хора с анемичен и тъмен тен, тъмна коса и очи; слаби, хилави, вместо пълни. По време на първото и второто пробиване на зъби при скрофулозни деца; диария и големи газове.

Деца: изтощени, неспособни да стоят; бавни в научаването да ходят (**Cal., Sil.**); хлътнал, отпуснат корем.

Изтичане на кървава течност от пъпа на кърмачета (на урина — **Hyos.**).

Рахит; черепните кости — тънки и чупливи; фонтанелите и шевове остават отворени много дълго, или се затварят и отварят отново; забавено или усложнено пробиване на зъби.

Гръбнакът — слаб, склонен към изкривявания, особено наляво; неспособен да поддържа тялото; шията — слаба, не може да държи главата (**Abrot.**).

Момичета в пубертета, високи, растящи бързо, склонност костите да омекват или гръбнакът да се изкривява (**Ther.**).

В пубертета: акне при анемични момичета с главоболие на върха на главата и газова диспепсия, > от ядене.

Оплаквания от скръб, разочарована любов (**Aur., Ign., Phos. ac.**).

Усеща оплакванията повече, когато мисли за тях (**Helon., Ox. ac.**).

Неволно въздишане (**Ign.**).

Несрастване на кости; подпомага образуването на калус (**Symph.**).

Ревматизъм на студено време; подобрява се през пролетта и се връща през есента.

Главоболие на ученички (**Nat. m., Psor.**); диария.

При всеки опит да яде — коликообразни болки в корема.

Фистула на ануса, редуваща се с гръдни симптоми (**Berb.**); липса на животинска топлина; студена пот и обща студенина на тялото.

< **Излагане на влажно, студено, променливо време; източни ветрове; топящ се сняг; умствено усилие.**

> **През лятото; топла, суха атмосфера.**

Calendula

Травматични поражения: за осигуряване на зарастване *per primam intentionem* и предотвратяване на супурация. При всички случаи на загуба на меки тъкани, когато съединението не може да бъде постигнато чрез лепящи пластири.

Външни рани — със или без загуба на тъкан; разкъсани и назъбени рани; след хирургични операции; за насърчаване на здравословна гранулация и предотвратяване на прекомерна супурация и загрозяващи белези.

Травматичен и идиопатичен невром (**Cera**); неврит от разкъсани рани (**Hyper.**); изтощение от загуба на кръв и прекомерна болка.

Разкъсване на мускули или сухожилия; разкъсвания по време на раждане; рани, проникващи в стави, със загуба на синовиална течност.

Рани: със внезапна болка по време на фебрилна топлина; конституционна склонност към еризипел (**Psor.**); стари, занемарени, зловонни; заплашващи с гангрена (**Sal. ac.**).

Язви: раздразнени, възпалени, с разпад, варикозни; болезнени сякаш бити (**Arn.**); прекомерна секреция на гной.

Calendula е почти специфично средство за чисти, хирургически разрези или разкъсани рани, за предотвратяване на прекомерна супурация.

Camphora

Болката е по-добре, докато мисли за нея (**Hell.** — по-лошо, **Cal. p.**, **Helon.**, **Ox. ac.**).

Хора физически и умствено слаби и раздразнителни.

Изключително чувствителни към студен въздух (**Hep.**, **Kali m.**, **Psor.**).

Лоши ефекти от шок след нараняване; повърхността на тялото — студена, лицето — бледо, устните — сини, ливидни; дълбока прострация.

Повърхността — студена на допир, но не може да търпи да бъде завит; отхвърля всички покривки (**Med.**, **Sec.**).

Цялото тяло — болезнено чувствително към най-лекия допир.

Език — студен, отпуснат, треперещ.

Внезапни пристъпи на повръщане и диария; носът — студен и заострен; тревожен и неспокоен; кожа и дъх — студени (**Ver.**, **Jatr.**).

В първите стадии на *cholera morbus* и азиатска холера; силен, продължителен студен трепет (**Ver.**).

Голяма студенина на повърхността с внезапна и пълна прострация на жизнената сила; често лекарство при конгестивен студен пристъп; злокачествена интермитентна треска (**Ver.**); пулс — слаб, външно малък, едва доловим.

Морбили и скарлатина, когато обривът не се появява; с бледо или студено синьо, хипократическо лице; детето не иска да бъде завито (**Sec.**).

Всички последици след морбили.

> Когато мисли за съществуващото оплакване; топъл въздух; пиене на студена вода.

Бележка за размисъл. — Целият наш напредък като школа зависи от правилното разбиране на симптомите, получени чрез провеждане на проби с **Camphor** и **Opium**. — *Hering*.

Cannabis indica

Много забравителен: забравя последните си думи и идеи; започва изречение, забравя какво възнамерява да каже; неспособност да си припомни каквато и да е мисъл или събитие поради това, че други мисли нахлуват в мозъка (**Anac., Lac. c.**).

Постоянно теоретизира.

Смее се неумерено на всяка дребна дума, казана му.

Пълен с шеги и пакости, после може би стене и плаче.

Голямо безпокойство от приближаваща смърт.

Delirium tremens; прекомерна словоохотливост; преувеличаване на време и разстояние.

Времето изглежда твърде дълго (**Arg. n.**); няколко секунди изглеждат като векове.

Разстоянието изглежда огромно; няколко крачки изглеждат като мили.

Усещане сякаш черепната кухина се отваря и затваря (**Act.**).

Усещане за подуване в перинеума или близо до ануса, сякаш седи върху топка (с големи количества нишковидна слуз в урината — **Cinch.**).

Relation. — Сравни: **Bell., Hyos., Stram.**

Cannabis sativa

Усещане сякаш капки вода падат върху или от отделни части; върху главата, от ануса, стомаха, сърцето.

Упорит запек, причиняващ задържане на урината; стягане на ануса.

Контракция на пръстите след навяхване.

Изкълчване на капачката при изкачване на стълби.

Диспнея или астма, при които пациентът може да диша само в изправено положение.

Задушаване при преглъщане, нещата „отиват по грешния път“ (**Anac.**).

Остър, възпалителен стадий на гонорея (вторият стадий — парене след уриниране, секрет — гъст, жълт, подобен на гной — **Cub.**).

Уретрата — много чувствителна към допир или натиск; не може да ходи с прибрани крака, защото това боли уретрата.

Болка, разпространяваща се от отвора на уретрата назад, парещо-хапеща; по-назад — по-пробождаща, по време на уриниране.

Разкъсващи болки по уретрата в зигзагообразна посока.

Cantharis

Свръхчувствителност на всички части.

Кръвоизливи от носа, устата, червата, гениталните и уринарните органи.

Болка; сурова, болезнена, пареща във всяка част на тялото, вътрешно и външно; с крайна слабост.

Отвращение към всичко; напитки, храна, тютюн.

Пиенето дори на малки количества вода увеличава болката в пикочния мехур.

Постоянни позиви за уриниране, отделяйки само няколко капки наведнъж, смесени с кръв (внезапно желание за уриниране и силен сърбеж в уретрата — **Petros.**).

Нетърпими позиви — преди, по време и след уриниране; силни болки в пикочния мехур.

Парещи, режещи болки в уретрата по време на микция; силен тенезъм и странгурия.

Изпражнения: преминаване на бяла или бледочервена, жилава слуз, като остъргана от червата, с ивици кръв (**Carb. an., Colch.**).

Кърваво, нощно семеизпускане (**Led., Mer., Petr.**).

Сексуално желание: увеличено и при двата пола; пречи на съня; силен приапизъм, с прекомерна болка (**Pic. ac.**).

Жилава слуз в дихателните пътища (**Bov., Kali bi.**); сравни **Cantharis**, ако везикалните симптоми съответстват.

Кожа: везикуларен еризипел; мехури по цялото тяло, които са болезнени и супурират.

Еритема от излагане на слънчеви лъчи (слънчево изгаряне).

Парещата болка и нетърпимите позиви за уриниране са червената нишка на **Cantharis** във всички възпалителни заболявания.

Capsicum annuum

Хора със светла коса, сини очи, нервни, но набити и плеторични. Флегматична диатеза; липса на реактивна сила, особено при пълни хора, лесно изтощаващи се;

лениви, страхуващи се от всякакво усилие; хора, склонни да бъдат весели, но ядосващи се от дреболии.

Деца: страхуват се от открит въздух; винаги им е студено; непокорни, тромави, дебели, мръсни и неразположени да работят или мислят.

Желание да бъдат оставени на мира; искат да легнат и да спят. *Носталгия* (при лениви, меланхолични), с червени бузи и безсъние.

Стягане: във фауксите; гърлото; ноздрите; гърдите; пикочния мехур; уретрата; ректума.

Парещо и жилещо усещане, като от кайенски пипер, в гърлото и други части, не > от топлина.

Тонзилит: с пареща, жилеща болка; силна болезненост; стягане на гърлото с парене; възпалено, тъмночервено, подуто.

Парещото, спазматично стягане и другите болки — по-лоши **между актовете на преглъщане (Ign.)**.

Болезнено подуване зад ухото (мастоид), изключително болезнено и чувствително на допир.

Всеки изпразнение е последван от жажда, и всяка напитка — от тръпки.

Колкото повече се увеличава студенината на тялото, толкова повече се увеличава лошото настроение.

Нервна, спазматична кашлица; в внезапни пристъпи; сякаш главата ще се разпадне.

При всяка експлозивна кашлица (и в никакъв друг момент) се изпуска облак от остър, зловонен въздух.

Болка в отдалечени части при кашляне (пикочен мехур, колене, крака, уши).

Carbo animalis

Главоболие: сякаш торнадо в главата; сякаш главата е била взривена на парчета; трябва да седи през нощта и да я държи, за да не се разпадне.

Заболявания на възрастни хора с подчертана венозна плетора, сини бузи, сини устни и голяма слабост.

Кръвообращението — слабо, застойно, и жизнената топлина спада до минимум; цианоза (**Ant. t., Carbo v.**).

Жлези: втвърдени, подути, болезнени; на шията, подмишниците, слабините, млечните жлези; болки — пробощащи, режещи, парещи (**Con.**).

Доброкачествени супурации преминават в ихорозни или злокачествени състояния.

Лесно се разтегля от вдигане, дори на малки тежести; налягане и пренатоварване лесно причиняват голяма слабост; глезените се подгъват при ходене.

Стави — слаби; лесно се навяхват при леко усилие (**Led.**).

Отвращение към открит, сух, студен въздух.

След появата на мензиса — толкова слаба, че едва може да говори (**Alum., Coc.**); мензисът тече само сутрин.

Слухът — объркан; не може да определи откъде идва звукът.

Пробощаща болка остава в гърдите след възстановяване от плеврит (**Ran. b.**).

Менструация, левкорей, диария — всички изтощават (**Ars.** — всички са зловонни, **Psor.**).

< След бръснене (>** след — **Brom.**); най-лекият допир; след полунощ.**

Carbo vegetabilis

За лошите ефекти от изтощителни заболявания, както при млади, така и при стари (**Cinch., Phos., Psor.**); кахектични хора, чиято жизненост е отслабнала или изчерпана.

Хора, които никога не са се възстановили напълно от изтощителните ефекти на предишно заболяване; астма, започнала след морбили или коклюш в детството; лошо храносмилане след пиянски запой; лоши ефекти от отдавнашна травма; никога не се е възстановил от последиците на тиф (**Psor.**).

Оплаквания: от хинин, особено при потиснати интермитентни трески; злоупотреба с живак, сол, солени меса; развалена риба, месо или мазнини; от прегряване (**Ant. c.**).

Лоши ефекти от загуба на жизнени течности (**Caust.**); кръвоизлив от всяка разпаднала се лигавица (**Cinch., Phos.**).

Слабост на паметта и бавност на мисълта.

Епистаксис в ежедневни пристъпи, седмици наред, по-лош от усилие; лицето — бледо както преди, така и след кръвоизлива.

Кръвоизлив от всяко лигавично отворстие; при системи разпаднали се, изтощени; кръвта просмуква от отслабени тъкани; жизнената сила — изчерпана.

Хипократическо лице; много бледо, сиво-жълто, зеленикаво, студено, със студена пот; след кръвоизлив.

Разклащане на зъбите, лесно кървящи венци.

Пациентите копнеят за неща, които ги разболяват; стари пияници копнеят за уиски или бренди; искат дрехите да са хлабави около корема.

Слабо храносмилане; най-простата храна не понася; прекомерно натрупване на газове в стомаха и червата < при лежане; след ядене или пиене — усещане сякаш стомахът ще се пръсне; ефекти от запой, късни вечери, богата храна.

Оригванията дават временно облекчение.

Заболявания на венозната система преобладават (**Sulph.**); симптоми на несъвършено окисление (**Arg. nit.**).

Недостатъчно капилярно кръвообращение причинява посиняване на кожата и студени крайници; жизнените сили — почти изчерпани; желание да бъде постоянно ветрян.

Дрезгавост: < вечер; във влажен вечерен въздух; топло, влажно време; гласът отказва при усилие (< сутрин — **Caust.**).

Събужда се често от студени крайници и страда от студени колене през нощта (**Apis**).

Чести, неволни, трупно-миришещи изпражнения, последвани от парене; меки изпражнения, отделяни с трудност (**Alum.**).

В последните стадии на болест, с обилна студена пот, студен дъх, студен език, загубен глас — това лекарство може да спаси живот.

< **От масло, свинско, мазни храни; злоупотреба с хинин, кора и живак; от пеење или четене на глас; в топло, влажно време.**

> **От оригване; от ветряне.**

Carbolic acid

Потенциите се приготвят с алкохол (изключение от правилото за приготвяне на киселини).

Болките са ужасни; идват внезапно, траят кратко, изчезват внезапно (**Bell., Mag. p.**).

Дълбока прострация, колапс; повърхността — бледа и обляна в студена пот (**Camph., Carbo v., Ver.**).

Физическо усилие, дори много ходене, предизвиква абсцес в някоя част, но обикновено в дясното ухо. — *R. T. Cooper.*

Тъпо, тежко, фронтално главоболие, сякаш гумена лента е опъната силно през челото, от слепоочие до слепоочие (**Gels., Plat., Sulph.**).

Когато изгарянията имат склонност към улцерация и ихорозен секрет.

Гнилостни секрети от устата, носа, гърлото, ноздрите, ректума и влагалището (**Anthr., Psor., Pyr.**).

Злокачествена скарлатина и вариола (**Am. c.**).

Разкъсани рани с тъпи инструменти; оголени, смачкани кости; много разпадане на меките тъкани (**Calend.**).

Желание за уиски и тютюн (**Asar., Carbo v.**).

Повръщане: на пияници, при бременност, морска болест, рак; на тъмна, маслинено-зелена течност (**Pyr.**).

Дизентерия: течна слуз, като остъргана от лигавиците, и силен тенезъм (**Canth.**); диария, изпражнения — течни, неволни, черни, с нетърпима миризма.

Запек, с ужасно зловонен дъх (**Op., Psor.**).

Левкорей: кисела, обилна, зловонна, зелена.

Caulophyllum

Особено подходящо за жени; оплаквания по време на бременност, раждане, лактация.

Ревматизъм при жени, особено на малките стави (**Act. s.**); блуждаещи болки, сменящи място на всеки няколко минути (**Puls.**); болезнена скованост на засегнатите стави.

Болките са интермитентни, пристъпни, спазматични.

Хорея, хистерия или епилепсия в пубертета, по време на установяване на менструалната функция (**Actaea**).

Левкорей: разяждаща, изтощаваща; горните клепачи — тежки, трябва да ги повдига с пръсти (**Gels.**); с „петна от молец“ по челото (**Sep.**); при малки момичета (**Calc.**); пречи на забременяване.

Обичаен аборт от маточна слабост (**Alet.** — от анемия с дълбока меланхолия — **Helon.**).

Спазматично, ригидно маточно устие, забавящо раждането; игловидни, пробождащи болки в шийката.

Родилни болки — кратки, неправилни, спазматични; измъчващи, безполезни болки в началото на раждането (**Act.**); без напредък.

Ще коригира нарушената виталност и ще произведе ефективни болки, ако симптомите съвпадат.

Кръвоизлив след прибързано раждане; липса на тонус; пасивен, след аборт (**Sec., Thlaspi**).

Следродилни болки: след продължително, изтощително раждане; спазматични, през долната част на корема; разпространяват се към слабините (в пищялите — **Carbo v., Coc.**).

Лохии — продължителни; голяма атония; пасивно просмукване дни наред от отпуснати съдове (**Sec.**).

Causticum

Подходящо за хора с тъмна коса и стегната тъкан; слаби, псорични, с прекалено жълт, бледожълт тен; склонни към заболявания на дихателните и уринарните пътища.

Деца с тъмна коса и очи, деликатни, чувствителни, кожата — склонна към интертриго по време на пробиване на зъби (**Lyc.**), или конвулсии при пробиване на зъби (**Stan.**).

Нарушена функционална активност на мозъка и гръбначния мозък от изтощително заболяване или тежък умствен шок, водеща до парализа.

Разраняване или болезненост: на скалпа, гърлото, дихателните пътища, ректума, ануса, уретрата, влагалището, матката (сякаш натъртено — **Arn.**; сякаш навехнато — **Rhus**).

Меланхолично настроение: тъжно, безнадеждно; от грижи, скръб, тъга; със сълзливост — „и най-малкото нещо кара детето да плаче“.

Интензивно съчувствие към страданията на другите.

Оплаквания: от продължителна скръб и тъга (**Phos. ac.**); от загуба на сън, нощно бдение (**Coc., Ign.**); от внезапни емоции, страх, уплаха, радост (**Coff., Gels.**); от гняв или раздразнение; от потиснати обриви.

Деца, бавни в научаването да ходят (**Cal. p.**). Несигурно ходене и лесно падане при малки деца.

Запек: чести, безрезултатни позиви (**Nux**); изпражненията излизат по-добре, когато човек стои прав; възпрепятствани от хемороиди; жилави и лъскави, като намазани с грес; при деца и при нощна енуреза.

Урина — неволна: при кашляне, кихане, духане на носа (**Puls., Squil., Ver.**).

Кашлица: с разраняване и болезненост в гърдите; с неспособност за експекторация — храчките трябва да бъдат поглъщани (**Arn., Kali c.**); облекчава се от глътка студена вода; при издишване (**Acon.**); с болка в хълбоците; остава след коклюш; с експекторация главно нощем.

Дрезгавост с разраняване и афония < сутрин (< вечер — **Carbo v., Phos.**).

През нощта — неспособен да намери удобна поза или да лежи неподвижно дори миг (**Eup., Rhus**). Трябва да се движи постоянно, но движението не облекчава.

Не може да бъде прекалено топло завит, но топлината не >.

Припадъчно отслабване на силите; слабост и треперене.

Старите изгаряния, особено от огън или вряла вода, се „освежават“, отново стават болезнени; стари травми се отварят; пациентите казват: „никога не съм бил добре след онова изгаряне“.

Мензис: твърде ранен; твърде слаб; само през деня; спира при лягане.

Парализа: на отделни части; гласови органи, език, клепачи, лице, крайници, пикочен мехур; обикновено на дясната страна; от излагане на студен вятър или течение; след тиф, тифус или дифтерия; появява се постепенно.

Падане на горните клепачи; не може да ги държи отворени (**Caul., Gels., Graph.** — на двата клепача — **Sep.**).

Ревматични заболявания, със свиване на флексорите и скованост на ставите; напрежение и скъсяване на мускулите (**Am. m., Cimex, Guaiac., Nat. mur.**).

Брадавиците: големи, назъбени, често на дръжка; лесно кървящи; отделящи влага; малки — по цялото тяло; по клепачите, лицето; по носа.

Пациентът се подобрява за известно време, след което настъпва „застой“ (**Psor., Sulph.**).

< В ясно, хубаво време; при влизане от въздуха в топла стая (**Bry.**); студен въздух, особено течение от студен въздух; при изстиване; от намокряне или къпане.

> Във влажно, мокро време; топъл въздух.

Chamomilla

Хора, особено деца, със светлокафява коса, нервен, възбудим темперамент; свръхчувствителни от употреба или злоупотреба с кафе или наркотични вещества.

Деца, новородени и по време на пробиване на зъби.

Кисели, раздразнителни, свръхчувствителни към болка, доведени до отчаяние (**Coff.**); заядливи, не могат да отговорят учтиво.

Детето — изключително раздразнително, капризно; спокойно само когато го носят; нетърпеливо, иска това или онова и се ядосва, когато му се откаже, или когато му се предложи — раздразнено го отхвърля (**Bry., Cina, Kreos.**); „твърде грозно, за да живее“; сприхаво, злобливо.

Жалостиво стенене на детето, защото не може да получи това, което иска; хленчещо безпокойство.

Пациентът не може да търпи никой около себе си; е сприхав, не може да търпи да му се говори (**Sil.**); не обича да говори, отговаря раздразнено.

Оплаквания от гняв, особено втрисане и треска.

Болка: изглежда непоносима, довежда до отчаяние; < от топлина; < вечер преди полунощ; с топлина, жажда и припадане; с изтръпване на засегнатата част; оригванията — <.

Едната буза — червена и гореща, другата — бледа и студена.

Свръхчувствителност към открит въздух; голямо отвращение към вятър, особено около ушите.

Зъбобол, ако нещо топло се вземе в устата (**Bis., Bry., Coff.**); при влизане в топла стая; в леглото; от кафе; по време на мензис или бременност.

Родилни болки: спазматични, мъчителни, иска да избяга от тях; дърпащи надолу по краката; натискат нагоре.

Диария: от студ, гняв или огорчение; по време на пробиване на зъби; след тютюн; в послеродовия период; от движение надолу (**Bor., Sanic.**).

Изпражнения — зелени, воднисти, разяждащи, като нарязани яйца и спанак; горещи, много зловонни, като на развалени яйца.

Зърната — възпалени, чувствителни на допир (**Helon., Phyt.**); гърдите на кърмачето — чувствителни на допир.

Млякото изтича при кърмещи жени (изтича след отбиване — **Con.**).

Конвулсии при деца от кърмене, след пристъп на гняв у майката (**Nux** — след уплаха у майката — **Op.**).

Силни ревматични болки го изкарват от леглото през нощта, принуждават го да ходи (**Rhus**).

Сънлив, но не може да спи (**Bell., Caust., Op.**).

Парене на стъпалата през нощта, изкарва краката от леглото (**Puls., Med., Sulph.**).

> От носене на ръце; гладуване; топло, влажно време.

Chelidonium majus

Хора със светъл тен, блондини; слаби, хилави, раздразнителни; склонни към чернодробни, стомашни и абдоминални оплаквания (**Pod.**); всяка възраст, пол и темперамент.

Постоянна болка под долния и вътрешния ъгъл на дясната лопатка (**Kali c., Mer.** — под лявата — **Chenop. g., Sang.**).

Оплаквания: предизвикани или подновени от промяна на времето (**Mer.**); всички намаляват след обяд.

Език — силно обложен в жълто, с червени ръбове, показва отпечатьци от зъбите (**Pod.** — голям, отпуснат, с отпечатьци от зъби — **Mer.**).

Желание за много горещи напитки; ако не са почти врящи, стомахът не ги задържа (**Ars., Casc.**).

Периодична орбитална невралгия (дясна страна), с прекомерно сълзотечение; сълзите буквално се изливат (**Rhus**).

Запек: изпражнения — твърди, кръгли топчета като овчи изпражнения (**Op., Plumb.**); редуване на запек и диария.

Диария: нощем; слузеста, светлосива; ярко-жълтеникава; кафява или бяла, водниста, кашава; неволна.

Лице, чело, нос, бузи — забележително жълти.

Жълто-сив цвят на кожата; повяхнала кожа; на дланите (**Sep.**).

Чернодробни заболявания; жълтеница, болка в дясното рамо.

Пневмония на десния бял дроб, чернодробни усложнения (**Mer.**).

Спазматична кашлица; малки бучки слуз излитат от устата при кашляне (**Bad., Kali c.**).

Засяга най-вече дясната страна; дясно око, десен бял дроб, десен хипохондриум и корем, дясно бедро и крак; дясното стъпало — студено като лед, лявото — нормално (**Lyc.**).

Стари, гнилостни, разпространяващи се язви, с анамнеза за чернодробно заболяване или туберкулозна диатеза.

China

За набити, мургави хора; за системи, някога здрави и силни, които са станали изтощени, „разбити“ от изтощителни отделения (**Carbo v.**).

Апатичен, безразличен, мълчалив (**Phos. ac.**); унил, мрачен, няма желание да живее, но му липсва смелост да извърши самоубийство.

Оплаквания: от загуба на жизнени течности, особено кръвоизливи, прекомерна лактация, диария, супурация (**Chin. s.**); от маларичен произход, с подчертана периодичност; връщат се през ден.

След климактериума — с обилни кръвоизливи; острите заболявания често завършват с воднянка.

Болки: дърпащи или разкъсващи; във всяка става, във всички кости.

Периостът — сякаш разтегнат; болезнен навсякъде; принуден да движи крайниците често, защото движението облекчава; възобновяват се при допир и след това постепенно се усилват до голяма степен.

Главоболие: сякаш черепът ще се пръсне; силно пулсиране на главата и каротидите, зачервено лице; от тилната област по цялата глава; < при седене или лежане, трябва да стои или да ходи; след кръвоизлив или сексуални излишества.

Лице — бледо, хипократическо; очите — хлътнали и заобиколени със сини кръгове; блед, болнав вид, както след излишества; зъбобол при кърмене.

Прекомерни газове в стомаха и червата; ферментация, бълбукане, оригването не облекчава (оригването облекчава — **Carbo v.**); < след ядене на плодове (**Puls.**).

Колики: в определен час всеки ден; периодични, от жлъчни камъни (**Card. m.**); по-лоши нощем и след ядене; по-добре при прегъване на две (**Coloc.**).

Голяма слабост, треперене, отвращение към усилие; чувствителност към допир, към болка, към течение; цялата нервна система — изключително чувствителна.

Невъзстановяващ сън или постоянна сънливост; < след 3 ч. сутринта; събужда се рано.

Кръвоизливи: от устата, носа, червата или матката; продължителни; желание за кисели неща.

Склонност към кръвоизлив от всяко отворстие на тялото, с шум в ушите, припадък, загуба на зрение, обща студенина, понякога конвулсии (**Fer.**, **Phos.**).

Болките са < от най-лекия допир, но > от силен натиск (**Caps.**, **Plumb.**).

Едната ръка — ледено студена, другата — топла (**Dig.**, **Ipec.**, **Puls.**).

Интермитентна треска: пристъпът идва по-рано с два до три часа при всяка атака (**Chin. s.**); връща се всеки седем или четиринадесет дни; никога нощем; обилно се поти по цялото тяло при завиване или по време на сън (**Con.**).

< От най-лекия допир; течение; през ден; умствени емоции; загуба на жизнени течности.

> Силен натиск; прегъване на две.

Соса

За хора, които се изтощават под физическото и умственото напрежение на забързан живот; които страдат от изтощени нерви и мозък (сравни **Fluor. ac.**).

Меланхолия от нервно изтощение; стеснителен, плах, не на място в обществото.

Тъжен, раздразнителен; намира удоволствие в самота и тъмнина.

Желание за алкохолни напитки и тютюн; за обичайните стимуланти.

Недостиг на въздух: при занимаващи се с атлетични спортове; задух при възрастни хора; при онези, които прекаляват с тютюн и уиски.

Хемоптиза, с тежест в гърдите и диспнея.

Сънлив, но не може да намери покой никъде.

Силно сърцебиене: от задържани газове (**Arg. n.**, **Nux**); от преумора; от натоварване на сърцето (**Arn.**, **Bor.**, **Caust.**).

Лоши ефекти: от изкачване на планини или балониране (**Ars.**); от стимуланти, алкохол, тютюн.

Предпазва от кариес на зъбите.

Cocculus

За жени и деца със светла коса и очи, които страдат силно по време на менструация и бременност; неомъжени и бездетни жени.

Подходящо за „книжни червеи“; чувствителни, романтични момичета с нерегулярна менструация; развратници, онанисти и хора, изтощени от сексуални излишества.

Гадене или повръщане от возене в карета, лодка или влак (**Arn.**, **Nux m.**), или дори от гледане на движеща се лодка; морска болест; болест при пътуване.

Главоболие: в тила и тилната област; разпространяващо се към гръбнака; сякаш стегнато силно с въже; с гадене, сякаш е на море; при всяка менструация; < при лежане на тила.

Мигрена от возене в карета, лодка или влак.

Заболявания, характерни за пияници.

Загуба на апетит, с метален вкус (**Mer.**).

Времето минава твърде бързо (твърде бавно — **Arg. n.**, **Can. I.**).

Голяма отпадналост на цялото тяло; необходимо е усилие, за да стои стабилно; чувства се твърде слаб, за да говори силно.

Лоши ефекти: от загуба на сън, умствено напрежение и нощно бдение; чувстват се слаби, ако загубят дори един час сън; конвулсии след загуба на сън; от гняв и скръб.

Треперене на ръцете и краката; от вълнение, усилие или болка.

Виене на свят, сякаш е пиян, при изправяне в леглото; или от движението на каретата (**Bry.**).

Усещане: в корема — за рязане и търкане при всяко движение, сякаш от остри камъни; за празнота в главата и други части (**Ign.**).

По време на опит за менструация е толкова слаба, че едва може да стои, поради слабост на долните крайници (**Alum.**, **Carbo an.**); след всеки цикъл — хемороиди.

Левкорейя вместо менструация или между циклите (**Iod.**, **Xan.**); като отмиване на месо; като серум, ихорозна, кървава; по време на бременност.

Не може да търпи противоречие; лесно се обижда; всяка дреболия го ядосва; говори прибързано (**Anac.**).

Когато треската приема бавна, „прокрадваща се“, нервна форма, с виене на свят; със склонност към гняв.

< Ядене, пиене, сън, пушене, говорене, возене в карета, движение или люлеене на кораб; изправяне по време на бременност.

Coffea cruda

Високи, слаби, приведени хора, тъмен тен, сангвинично-холеричен темперамент.

Сврхчувствителност; всички сетива — по-остри: зрение, слух, обоняние, вкус, допир (**Bell., Cham., Opium**).

Необичайна активност на ума и тялото.

Пълен с идеи; бърз да действа, не спи поради това.

Оплаквания: лошите ефекти от внезапни емоции или приятни изненади (**Caust.** — възбуждащи или лоши новини — **Gels.**); плач от радост; редуване на смях и плач.

Болките се усещат интензивно; изглеждат почти непоносими, довеждат пациента до отчаяние (**Acon., Cham.**); мятане в агония.

Безсъние, будно състояние; невъзможно е да затвори очите; физическо възбуждане чрез умствено превъзбуждане. (Сравни **Senecio** — за безсъние от пролапс, маточна раздразнимост, по време на климактериума.)

Главоболие: от прекомерно умствено усилие, мислене, говорене; едностранно, сякаш пирон е забит в мозъка (**Ign., Nux**); сякаш мозъкът е разкъсан или разбит на парчета; по-лошо на открит въздух.

Прибързано ядене и пиене (**Bell., Hep.**).

Зъбобол: интермитентен, пулсиращ, облекчава се от държане на ледена вода в устата, но се връща, когато водата се стопли (**Bis., Bry., Puls., Caust., Sep., Nat. s.**).

< Внезапна умствена емоция; прекомерна радост; студен, открит въздух; наркотични лекарства.

Colchicum autumnale

Подходящо за ревматичната, подагрозната диатеза; хора с здрава, силна конституция; заболявания на възрастни хора.

Външни впечатления — светлина, шум, силни миризми, допир, лоши маниери — го правят почти извън себе си (**Nux**); страданията му изглеждат непоносими.

Оплаквания: от скръб или от простъпките на други (**Staph.**).

Болките са дърпащи, разкъсващи, притискащи; леки или повърхностни при топло време; засягат костите и по-дълбоките тъкани, когато въздухът е студен; болките отиват отляво надясно (**Lach.**).

Обонянието — болезнено остро; гадене и прималяване от миризмата на готвеща се храна, особено риба, яйца или тлъсто месо (**Ars., Sep.**); лоши ефекти от нощно бдение (**Coc.**).

Отвращение към храна; погнуса дори от вида, още повече от миризмата ѝ.

Коремът е огромно подут от газове, усещане сякаш ще се пръсне.

Парене или ледена студенина в стомаха и корема.

Есенна дизентерия, изпражненията съдържат големи количества бели нишковидни частици; бяла слуз; „остъргано от червата“ (**Canth., Carb. ac.**).

Урина: тъмна, оскъдна или задържана; на капки, с бял утайка; кървава, кафява, черна, мастилена; съдържа съсиреци от гнила, разложена кръв, албумин, захар.

Засегнатите части — много чувствителни към допир и движение.

Артритни болки в ставите; пациентът крещи от болка при докосване на става или удар на пръста на крака.

< Умствена емоция или изтощение; ефекти от усилено учене; миризма на готвеща се храна. Движение: ако пациентът лежи напълно неподвижно, склонността към повръщане е по-малка. Всяко движение я възобновява (Bry.).

Collinsonia canadensis

Тазова и портална конгестия, водеща до дисменорея и хемороиди.

Конгестия на тазовите органи, с хемороиди, особено в последните месеци на бременността.

Отоци от сърдечно заболяване.

Сърцебиене: при пациенти, склонни към хемороиди и лошо храносмилане; действието на сърцето — постоянно ускорено, но слабо.

След като сърцето бъде облекчено, старите хемороиди се появяват отново, или потиснатият мензис се връща.

Хронични, болезнени, кървящи хемороиди; усещане сякаш пръчици, пясък или чакъл са заседнали в ректума (**Aesc.**).

Хемороидална дизентерия с тенезъм.

Редуване на запек и диария; конгестивна инерция на долното черво; изпразнения — мудни и твърди, с болка и много газове.

Запек.

Пруритус по време на бременност с хемороиди, неспособна да легне.

< Най-леката умствена емоция или възбуда влошава симптомите (Arg. n.).

Colocynthis

Агонизираща болка в корема, караща пациента да се прегъва на две, с безпокойство, въртене и извиване, за да получи облекчение; > от силен натиск (> от топлина — **Mag. p.**).

Болките: са по-лоши след ядене или пиене; принуждават пациента да се прегъва на две (**Mag. p.** — < при прегъване на две — **Dios.**); мензис, потиснат от огорчение, коликообразни болки.

Изключително раздразнителен, нетърпелив; ядосва се или се обижда, когато бъде разпитван.

Раздразнителен; хвърля нещата от ръцете си.

Заболявания от гняв, с възмущение — колики, повръщане, диария и потискане на мензиса (**Cham., Staph.**).

Виене на свят: при бързо завъртане на главата, особено наляво, сякаш ще падне; от стимуланти.

Ишиас: крампозна болка в хълбока, сякаш е стегнат в менгеме; лежи на засегнатата страна.

Стрелкаща болка, като светкавични удари, по целия крайник — ляв хълбок, ляво бедро, ляво коляно, в подколенната ямка.

< Гняв и възмущение; огорчение, причинено от обида (**Staph., Lyc.**); сирене — < колики.

> От прегъване на две; силен натиск.

Conium maculatum

„Балсамът от Галаад“ за заболявания на стари моми и жени по време и след климактериума.

Особено за заболявания на стари мъже; стари моми; стари ергени; с ригидни мускулни влакна; хора със светла коса, които лесно се възбуждат; силни хора със заседнал начин на живот.

Отпадналост на възрастни хора; оплаквания, причинени от удар или падане; ракови и скрофулозни хора с увеличени жлези; ригидни влакна.

Без склонност към работа или учене; ленив, безразличен, не проявява интерес към нищо.

Паметта — слаба, неспособен да поддържа каквото и да е умствено усилие.

Мрачен; лесно раздразнителен; властен, свадлив, кара се, не търпи противоречие (**Aur.**); всяко възмущение причинява умствена депресия.

Страхува се да бъде сам, но избягва обществото (**Kali c., Lyc.**).

Жлезиста индурация с каменна твърдост; на млечните жлези и тестисите при хора с ракова предразположеност; след натъртвания и травми на жлезите (сравни **Aster. rub.**).

Гърдите — болезнени, твърди и чувствителни преди и по време на менструация (**Lac c., Kali c.**).

Виене на свят: особено при лягане или обръщане в леглото; при леко движение на главата или дори на очите; трябва да държи главата напълно неподвижна; при завъртане на главата наляво (**Col.**); при възрастни хора; при яйчникови и маточни оплаквания.

Кашлица: на спазматични пристъпи, причинена от сухо място в ларинкса (в гърлото — **Act.**); със сърбеж в гърдите и гърлото (**Iod.**); по-лоша нощем, при лягане и по време на бременност (**Caust., Kali br.**).

Голяма трудност при уриниране; потокът прекъсва, после тръгва отново; простатни или маточни заболявания.

Мензис: слаб, потиснат; твърде късен, оскъден, кратък; с обрив от малки червени пъпчици по тялото, който изчезва с потока (**Dul.**); спира от настинка; от потапяне на ръцете в студена вода (**Lac d.**).

Левкорей: десет дни след мензиса (**Bor., Bov.**); разяждаща; кървава; млечна; обилна; гъста; прекъсваща.

Лоши ефекти: от потиснато сексуално желание или потиснат мензис; от неудовлетворен сексуален инстинкт или от прекомерно удовлетворяване.

Отвращение към светлина без възпаление на очите; по-лошо от използване на очите на изкуствена светлина; често лекарството на студенти за нощна работа; силна фотофобия (**Psor.**).

Пот денем и нощем, щом заспи, или дори при затваряне на очите (**Cinch.**).

< Нощем; при лягане; при обръщане или изправяне в леглото; при безбрачие.

Crocus sativus

Чести и крайни промени в усещанията; внезапни, от най-голяма веселост до най-дълбоко отчаяние (**Ign., Nux m.**).

Прекалено щастлив, привързан, иска да целува всички; след миг — в ярост.

Кървоизлив от която и да е част, кръвта — черна, вискозна, съсиреци, образуващи дълги черни нишки, висящи от кървящата повърхност (**Elaps**).

Главоболие: по време на климактериума, пулсиращо, трептящо, < през двата или трите дни на обичайния менструален поток; нервно или менструално главоболие преди, по време или след потока (**Lach., Lil., Sec.**).

Очи: усещане сякаш стаята е пълна с дим; сякаш е плакал; сякаш студен вятър духа през очите; силно затваряне на клепачите дава >.

Кървене от носа: черно, лепкаво, нишковидно, всяка капка може да бъде издърпана като нишка; със студена пот на големи капки по челото (студена пот, но иска да бъде ветрян; с яркочервена кръв — **Carbo veg.**); при деца, които се развиват твърде бързо (**Cal., Phos.**).

Дисменорея: потокът — черен; нишковиден, съсирен (**Ust.**).

Усещане сякаш нещо живо се движи в стомаха, корема, матката, ръцете или други части на тялото (**Sab., Thuja, Sulph.**); с гадене и примаяване.

Хорея и хистерия с голяма веселост, пеене и танцуване (**Tar.**); редуващи се с меланхолия и ярост.

Спазматични контракции и потрепвания на отделни групи мускули (**Agar., Ign., Zinc.**).

Relation. — **Nux, Puls.** или **Sulph.** следват **Crocus** добре при почти всички оплаквания. Сравни: при менструални нарушения (**Ust.**).

Crotalus horridus

Показан при стромозни, изтощени, хеморагични, разпаднали се конституции; по време на зимотични заболявания; при пияници; склонност към карбункули или кръвни циреи (**Anthr.**).

Заболявания, причинени от предишно ниско състояние на организма; ниска септична тифозна или маларична треска; хроничен алкохолизъм; изчерпана жизнена сила; истински колапс.

Апоплексия; апоплектични конвулсии при пияници, хеморагични или разпаднали се конституции.

Хеморагична диатеза; кръв тече от очите, ушите, носа и от всяко отворстие на тялото; кървава пот.

Жълт цвят на конюнктивата; изчиства зрението след кератит или керато-ирит.

Злокачествена жълтеница; хематична, а не чернодробна.

Purpura haemorrhagica; появява се внезапно от всички отворстия, кожата, ноктите, венците.

Език — огнено червен, гладък и полиран (**Pyr.**); силно подут.

Злокачествена дифтерия или скарлатина; оток или гангрена на гърлото или сливиците; болка < при празно преглъщане; ако се появят повръщане или диария.

Прострация на жизнената сила; пулсът — едва осезаем; кръвно отравяне (**Pyr.**).

Повръщане: жлъчно, с тревожност и слаб пулс; всеки месец след менструация; не може да лежи на дясната страна или по гръб, без веднага да се появи тъмно, зелено повръщане; черно или като утайка от кафе — при жълта треска.

Диария; изпражнения — черни, течни; като утайка от кафе; зловонни; от вредни изпарения или септични вещества в храна или напитки; от „висока дивеч“ (**Pyr.**); по време на жълта треска, холера, тиф, тифус.

Чревен кръвоизлив при типични септични или зимотични заболявания; кръвта — тъмна, течна, несъсирваща се.

Дисекционни рани; ужилвания от насекоми; лоши ефекти от ваксинация.

Викарна менструация; при изтощени конституции (**Dig., Phos.**).

Менопауза: силни топли вълни и обилни изпотявания; примаяване и потъване в стомаха; продължителна метророгия, тъмна, течна, зловонна; дълбока анемия.

Злокачествени заболявания на матката, голяма склонност към кръвоизлив, кръвта — тъмна, течна, зловонна.

Croton tiglium

Засяга лигавицата на чревния тракт, произвеждайки трансудации на водните части на кръвта, обилна, водниста диария (**Ver.**), и развива остър екзема по цялото тяло (**Rhus**).

Червата се изпразват сякаш от спазматични тласъци, „изхвърчащи като изстрел“ (**Gamb.**); щом пациентът яде, пие, или дори докато яде; жълт, воднист изпражнения.

Постоянни позиви за дефекация, последвани от внезапно изпразване, което е изстреляно от ректума (**Gamb., Grat., Pod., Thuja**).

Плискащо усещане в червата, сякаш от вода, преди изпражнение (къркорене преди изпражнение — **Aloe**).

Дърпаща болка през гърдите от гърдата към лопатката на същата страна всеки път, когато детето суче; зърното — много болезнено.

Интензивен сърбеж на кожата, но толкова чувствителна, че не може да се чеше; > от леко разтриване; екзема по цялото тяло.

Интензивен сърбеж на гениталиите и при двата пола (**Rhus**); везикуларен обрив при мъжа; толкова чувствителен и болезнен, че не може да се чеше.

Кашлица: щом главата докосне възглавницата, настъпва спазматичен пристъп на кашлица; задушава се, трябва да ходи из стаята или да спи на стол.

< Диария; всяко движение; след пиене; докато яде или кърми (**Arg. n., Ars.**); през лятото; от плодове и сладкиши (**Gamb.**); от най-малко количество храна или напитка.

Cuprum metallicum

Спазми и крампи: симптомите са склонни да се появяват периодично и на групи.

Умствено и физическо изтощение от преумора на ума и загуба на сън (**Coc., Nux**); пристъпи на непреодолима тревожност.

Силен, сладникав, металически, меден вкус в устата с отделяне на слюнка (**Rhus**).

Постоянна прострация и прибиране на езика, като змия (**Lach.**).

При пиене течността слиза надолу с клокочещ звук (**Ars., Thuja**).

Cholera morbus или азиатска холера, с крампи в корема и прасците.

Лоши ефекти от реперкусирани обриви (от неразвити — **Zinc.**), водещи до мозъчни заболявания, спазми, конвулсии, повръщане; от потисната пот на краката (**Sil.**, **Zinc.**).

Конвулсии, със синьо лице и стиснати палци.

Крампи в крайниците; болки в стъпалата, прасците, с голяма умора на крайниците.

Клонични спазми, започващи в пръстите на ръцете и краката и разпространяващи се по цялото тяло; по време на бременност; пуерперални конвулсии; след уплаха или раздразнение; от метастаза от други органи към мозъка (**Zinc.**).

Парализа на езика; несъвършена, заекваща реч.

Епилепсия: аурата започва в коленете и се изкачва нагоре; < нощем по време на сън (**Bufo**); около новолуние, на редовни интервали (като мензис); от падане или удар по главата; от измокряне.

Кашлицата има клокочещ звук, сякаш вода се излива от бутилка.

Кашлица, > от пиене на студена вода (**Caust.** — < от студена вода — **Spong.**).

Коклюш: продължителна, задушаваща, спазматична кашлица; неспособен да говори; без дъх, синьо лице, ригиден, схванат; три пристъпа последователно (**Stan.**); повръщане на твърда храна след възвръщане на съзнанието (**Can.**); каталептичен спазъм при всеки пристъп.

Следродилни болки; силни, мъчителни, в прасците и стъпалата.

< **Студен въздух; студен вятър; нощем; потисната пот на краката или екзантема.**

> **Гадене, повръщане и кашлица — от глътка студена вода.**

Cyclamen europeum

Най-подходящо за леуко-флегматични хора с анемични или хлорозни състояния; лесно уморяващи се и вследствие на това несклонни към какъвто и да е труд; слаби или потиснати функции на органи или сетива.

Бледи, хлорозни; нарушен мензис (**Fer.**, **Puls.**), придружен от виене на свят, главоболие, замъглено зрение.

Болки: притискащи, дърпащи или разкъсващи в части, където костите лежат близо до повърхността.

Оплаквания: от потисната скръб и угризения на съвестта; от неизпълнен дълг или извършено лошо дело.

Голяма тъга и раздразнителност, сприхав, мрачен, зле настроен; склонност към плач; желание за уединение; отвращение към открит въздух (обратното на **Puls.**).

Главоболие при анемични пациенти, с премигване пред очите или замъглено зрение, при ставане сутрин.

Премигване пред очите, огнени искри, като в различни цветове, блестящи игли, замъглено зрение като от мъгла или дим.

Насищане след няколко хапки (**Lyc.**), храната след това става отвратителна, причинява гадене в гърлото и небцето.

Слюнката и цялата храна имат солен вкус; свинско месо не понася.

Мензис: твърде ранен, твърде обилен, черен и съсирен; мембранозен (твърде късен, блед, оскъден — **Puls.**); по-добре по време на потока (по-лошо — **Act., Puls.**).

Пареща, болезнена чувствителност в петите при седене, стоене или ходене на открит въздух (**Agar., Caust., Val., Phyt.**).

< **Открит въздух; студена вода; студено къпане; мензис** — < при седене и лежане нощем.

> **В топла стая; на закрито; мензис** — > при ходене (левкорей — < при седене, > при ходене — **Cac., Coc.**).

Digitalis purpurea

Внезапни топли вълни, последвани от голяма нервна слабост и неправилен, прекъсващ пулс, появяващи се при климактериума; < от най-малкото движение.

Слабо сърце без клапни усложнения.

Усещане сякаш сърцето ще спре да бие, ако се движи (**Cocaine** — страхува се, че ако не е постоянно в движение, сърцето ще спре да бие — **Gels.**).

Прималяване или потъване в стомаха; изтощение; крайна прострация; чувства сякаш умира.

Нощни емисии, с голяма слабост на гениталиите след коитус.

Голяма слабост в гърдите, не може да търпи да говори (**Stan.**).

Изпражнения: много светли, пепеляви; забавени, тебеширени (**Chel., Pod.**); почти бели (**Cal., Cinch.**); като „тръбичка“; неволни.

Пулс — пълен, неправилен, много бавен и слаб; прекъсва на всеки трети, пети или седми удар.

Лице — бледо, с вид на смърт и синкаво-червеникав оттенък.

Посиняване на кожата, клепачите; устните и езика.

Дишане — неправилно, затруднено, с дълбоки въздишки.

Пръстите „заспиват“ често и лесно.

Отоци: след скарлатина; при болест на Брайт; със задържане на урина; на вътрешни и външни части; с прималяване, когато има органични сърдечни заболявания (с болезненост в маточната област — **Conv.**).

Фатален синкоп може да настъпи при изправяне в седнало положение.

< При седене, особено при изправено седене; движение.

Dioscorea villosa

Хора със слаби храносмилателни способности, стари или млади.

Газове след хранене или след ядене, особено при пиещи чай; често са подложени на силни колики.

Стискащи болки в корема около пъпа.

Силна, усукваща колика, появяваща се на редовни пристъпи, сякаш червата са хванати и усукани от мощна ръка.

Коликообразни болки: < от навеждане напред и при лежане; > при изправено стоене или навеждане назад (обратното на **Col.**).

Емисии по време на сън; ярки сънища за жени през цялата нощ (**Staph.**); коленете — слаби; гениталиите — студени; голямо унияние (**Staph.**).

Фелони; в ранните стадии, когато болките са остри и мъчителни, когато се появи първото убождане; ноктите — чупливи.

Склонност към паронихия (**Hep.**).

< Лежане; седене; прегъване на две.

> Движение; ходенето е трудно, принуден е да ходи, дори когато е уморен.

Diphtherinum

Особено подходящо за стромозна диатеза; скрофулозни, псорични или туберкулозни хора, склонни към катарални заболявания на гърлото и дихателните лигавици.

Пациенти със слаба или изчерпана жизненост, следователно изключително възприемчиви към дифтеритичния вирус; когато пристъпът от самото начало има склонност към злокачественост (**Lac. c., Mer. cy.**).

Безболезнена дифтерия; симптомите почти или напълно обективни; пациентът твърде слаб, апатичен или твърде простриран, за да се оплаква; сопор или ступор, но лесно се събужда, когато му се говори (**Var., Sulph.**).

Тъмночервено подуване на сливиците и палатинните дъги; паротидните и цервикалните жлези — силно подути; дъхът и отделянията от гърлото, носа и устата — много зловонни; езикът — подут, много червен, с малко налеп.

Дифтеритична мембрана — дебела, тъмносиво или кафяво-черна; температурата — ниска или субнормална, пулсът — слаб и бърз; крайниците — студени и изразена слабост; пациентът лежи в полу-оглупяло състояние; очите — тъпи, замъглени (**Apis, Var.**).

Епистаксис или дълбока прострация от самото начало на пристъпа (**Ali., Apis, Carb. ac.**); колапс почти от самото начало (**Crot., Mer. cy.**); пулс — слаб, бърз и жизнената реакция — много ниска.

Гълта без болка, но течностите се повръщат или излизат през носа; дъхът — ужасно зловонен.

Ларингеална дифтерия, след като **Chlor., Kali bi.** или **Lac c.** се провалят; постдифтеритична парализа, след като **Caust., Gels.** се провалят.

Когато пациентът от самото начало изглежда обречен и най-внимателно подобрите лекарства не успяват да облекчат или да подобрят трайно.

Горните са излекувани симптоми, верификации, които авторът е намирал водещи и надеждни в продължение на двадесет и пет години.

Лекарството се приготвя, както всички нозоди и животински отрови, според Хомеопатичната фармакопея, и както всички хомеопатични лекарства е напълно безопасно, когато се дава на болни.

Както всички нозоди, то е практически безполезно в потенции под 30-та; неговата лечебна стойност също се увеличава с увеличаване на потенцията от 200-та до М и СМ.

Не е необходимо и не трябва да се повтаря твърде често.

Ще излекува във всеки случай, в който суровият антитоксин би излекувал, и не само че е лесно за приложение, но е безопасно и напълно лишено от опасни последици. Освен това е хомеопатично.

Авторът го е използвал двадесет и пет години като профилактика и никога не е виждал втори случай на дифтерия да се появи в семейство, след като е било приложено.

Професията е приканена да го подложи на изпитание и да публикува неуспехите пред света.

Drosera rotundifolia

Коклюш с насилствени пристъпи, които следват един след друг бързо, едва може да си поеме дъх (събужда се в 6–7 ч. сутринта и не спира да кашля, докато не се издигне голямо количество лепкава слюз — **Coc. c.** — обилна епистаксис при всеки пристъп — **Ind.**; „минутно оръдие“ през деня, коклюш нощем — **Cor. r.**).

Дълбоко звучаща, дрезгава, лаеща кашлица (**Verb.**), < след полунощ, по време или след морбили; спазматична, с даване, позиви за повръщане и повръщане (**Bry., Kali c.**).

Постоянна, гъделичкаща кашлица при деца, започва веднага щом главата докосне възглавницата вечер (**Bell., Hyos, Rum.**).

Нощна кашлица при млади хора в туберкулоза; кървави или гнойни храчки.

Кашлица: < от топлина, пиене, пеене, смях, плач, лягане, след полунощ.

По време на кашлица: повръщане на вода, слюз и често кървене от носа и устата (**Cup.**).

Усещане за перо в ларинкса, предизвикващо кашлица.

Заболявания, преобладаващи по време на епидемичен коклюш.

„Гърло на проповедник“; с грубо, стържещо, сухо усещане дълбоко във фаринкса; гласът — дрезгав, дълбок, без тон, напукан, изисква усилие, за да говори (**Arum.**).

Стягане и пълзене в ларинкса; дрезгавост и жълти или зелени храчки.

Ларингеална туберкулоза, след коклюш (бронхиален катар след коклюш — **Coc. c.**).

Dulcamara

Подходящо за хора с флегматични, скрофулозни конституции; неспокойни, раздразнителни.

Катарален ревматизъм или кожни заболявания, предизвикани или влошени от излагане на студено, влажно, дъждовно време, или внезапни промени в горещо време (**Bry.**).

Увеличени секреции на лигавиците; потта е потисната от студ.

Пациенти, живеещи или работещи в влажно, студено мазе или млечна ферма (**Aran., Ars., Nat. s.**).

Умствена объркваност; не може да намери правилната дума за нищо.

Кожата е деликатна, чувствителна към студ, склонна към обриви, особено уртикария; всеки път, когато пациентът настине или е дълго изложен на студ.

Анасарка; след малария, ревматизъм, скарлатина.

Отоци: след потисната пот; потиснати обриви; излагане на студ.

Диария: от настиване на влажни места или по време на влажно, мъгливо време; при промяна от топло към студено време (**Bry.**).

Катарална ишурия при пораснали деца, с млечна урина; от газене с боси крака в студена вода; неволна.

Обрив преди мензиса (**Con.** — по време на обилен мензис — **Bell., Graph.**).

Уртикария по цялото тяло, без треска; сърбежът пари след разчесване; < в топлина, > в студ.

Дебели, кафяво-жълти корички по скалпа, лицето, челото, слепоочията, брадичката; с червеникави граници, кървящи при разчесване.

Брадавици — месести, големи, гладки; по лицето или по гърба на ръцете и пръстите (**Thuja**).

< От студ като цяло; студен въздух; студено влажно време; потиснат мензис, обриви, пот.

> От движение (**Fer., Rhus**).

Eupatorium perfoliatum

Подходящо за заболявания на възрастни хора; изтощени конституции, особено от пиянство; кахексия от продължителни или чести пристъпи на жлъчни или интермитентни трески.

Усещане за натъртване, сякаш счупен, по цялото тяло (**Arn., Bellis, Pyr.**).

Костни болки, засягащи гърба, главата, гърдите, крайниците, особено китките, сякаш са изкълчени.

Колкото по-обща и по-силна са болките, толкова по-подходящо е лекарството (сравни **Bry., Mer.**).

Болезнена чувствителност на очните ябълки; кориза, болки във всяка кост; голяма прострация при епидемичен грип (**Lac. c.**).

Болките идват бързо и си отиват бързо (**Bell., Mag. p., Eup. pur.**).

Виене на свят; усещане сякаш пада наляво (не може да завърти главата наляво от страх да не падне — **Col.**).

Кашлица: хронична; влажна, с хектика; гърдите — болезнени, трябва да ги поддържа с ръце (**Bry., Nat. c.**); < нощем; след морбили или потиснати интермитентни трески.

Треска: студени тръпки в 9 ч. сутринта един ден, на обяд — следващия ден; горчиво повръщане в края на студа; пиенето ускорява студа и причинява повръщане; костни болки преди и по време на студа.

Ненаситна жажда преди и по време на студа и треската; знае, че студът идва, защото не може да се напие достатъчно.

Euphrasia

Лоши ефекти от падания, контузии или механични наранявания на външни части (**Arn.**).

Катарални заболявания на лигавиците, особено на очите и носа.

Обилно, разяждащо сълзотечение, с обилна, блага кориза (обратното на **All. c.**).

Очите сълзят непрекъснато и са слепени сутрин; ръбовете на клепачите — червени, подути, парещи.

Обилна течаща кориза сутрин с насилствена кашлица и обилна експекторация, < от излагане на топъл южен вятър.

При опит да изчисти гърлото от зловонна слюз сутрин — даване, докато повърне току-що изядената закуска (**Bry.**).

Обилна експекторация на слюз чрез доброволно отхрочване, < при ставане сутрин.

Аменорея, с катарални симптоми на очите и носа; обилно разяждащо сълзотечение.

Мензис: болезнен, редовен, сега трае само един час; или късен, оскъден, кратък, траещ само един ден (**Bar.**).

Коклюш: прекомерно сълзотечение по време на кашлица; кашлица само през деня (**Fer., Nat. m.**).

< Вечер; в леглото; на закрито; топлина; влага; след излагане на южен вятър; при докосване (**Her.**).

Ferrum metallicum

Хора със сангвиничен темперамент; раздразнителни, свадливи, склонни към спорове, лесно възбудими, най-малкото противоречие ги ядосва (**Anac., Coc., Ign.**); > умствено усилие.

Раздразнителност: леки шумове, като шумоленето на хартия, го довеждат до отчаяние (**Asar., Tar.**).

Жени, които са слаби, деликатни, хлорозни, но имат огнено червено лице.

Крайна бледност на лицето, устните и лигавиците, която става червена и зачервена при най-малката болка, емоция или усилие.

Зачервяване (**Amyl., Coca.**).

Еретична хлороза, по-лоша през зимата.

Червените части стават бели: лице, устни, език и лигавица на устата.

Виене на свят: с усещане за балансиране, сякаш е върху вода; при гледане на течаща вода; при ходене над вода, като при преминаване по мост (**Lys.**); при слизване (**Bor., Sanic.**).

Главоболие: удрящи, биещи, пулсиращи болки, трябва да легне; с отвращение към ядене или пиене.

За два, три или четири дни, на всеки две или три седмици.

Мензис: твърде ранен, твърде обилен, твърде продължителен, с огнено червено лице; звънене в ушите; прекъсва за два или три дни и после се връща; потокът — блед, воднист, изтощаващ.

Хеморагична диатеза; кръвта — яркочервена, съсирва се лесно (**Fer. p., Ipec., Phos.**).

Регургитация и оригване на храна на хапки (**Alum.**), без гадене.

Вълчи глад или загуба на апетит, с крайно отвращение към всякаква храна.

Повръщане: веднага след полунощ; на приетата храна, щом бъде изядена; напуска масата внезапно и с едно усилие повръща всичко изядено, след което може да седне и да яде отново; кисело, ацидно (**Lyc., Sul. ac.**).

Диария: неусвоени изпражнения нощем или докато яде или пие (**Crot. t.**); безболезнена, с добър апетит; при туберкулозни [сравни лекциите на Кент].

Запек: от чревна атония; неуспешни позиви; изпражнения — твърди, трудни, последвани от болка в гърба или крампозна болка в ректума; пролапс на ректума при деца; сърбеж на ануса нощем.

Винаги се чувства по-добре, когато ходи бавно, въпреки че слабостта го принуждава да легне.

Кашлица само през деня (**Euphr.**); облекчава се при лягане; > при ядене (**Spong.**).

Отоци: след загуба на жизнени течности; злоупотреба с хинин; потиснати интермитентни трески (**Carbo v., Cinch.**).

< Нощем; в покой, особено при спокойно седене.

> Бавно ходене; през лятото.

Fluoric acid

Оплаквания на старостта или на преждевременна старост; при сифилитична, меркуриална дискразия; млади хора изглеждат стари.

Увеличена способност за физическо усилие без опасност (**Coca.**); по-слабо засегнат от прекомерната топлина на лятото или студа на зимата.

Старите цикатрикси стават червени по краищата и заплашват да се превърнат в открити язви (**Caust., Graph.**).

Варикозни вени и язви, упорити, дългогодишни случаи, при жени, родили много деца.

Кариес и некроза, особено на дългите кости, псорични или сифилитични, от злоупотреба с живак или силиция (**Angus.**).

Наевус, плосък, при деца (дясно слепоочие); капилярен аневризъм (сравни **Cal. fl., Tub.**).

Язви: червени краища и везикули; декубитални; обилно отделяне; < от топлина, > от студ; силни болки, като светкавични линии, ограничени в малко място.

Бърз кариес на зъбите; фистула dentalis или lachrymalis; екзостоза на костите на лицето (**Hekla**).

Gelsemium

За деца, млади хора, особено жени с нервен, хистеричен темперамент (**Croc., Ign.**).

Пълна релаксация и прострация на цялата мускулна система с пълна моторна парализа.

Възбудим, раздразнителен, чувствителен; за нервните заболявания на онанисти от двата пола (**Kali p.**).

Лоши ефекти от уплаха, страх, вълнуващи новини и внезапни движения (**Ign.** — от приятна изненада — **Coff.**).

Страх от смъртта (**Ars.**); пълна липса на кураж.

Очакването на каквото и да е необичайно изпитание — подготовка за църква, театър или среща — предизвиква диария; сценична треска, нервен страх от появяване пред публика (**Arg. n.**).

Обща депресия от слънчевата топлина или лятото.

Слабост и треперене: на езика, ръцете, краката; на цялото тяло.

Желание да бъде тихо, да бъде оставен на мира; не желае да говори или някой да бъде близо до нея, дори човекът да е мълчалив (**Ign.**).

Виене на свят, разпространяващо се от тилната област (**Sil.**); с диплопия, замъглено зрение, загуба на зрение; изглежда опиянен, когато се опитва да се движи.

Деца: страх от падане, хващат се за креватчето или за медицинската сестра (**Bor., Sanic.**).

Главоболие; предшествано от слепота (**Kali bi.**), > от обилно уриниране.

Липса на мускулна координация; объркан; мускулите отказват да се подчинят на волята.

Главоболие: започва в шийния отдел на гръбнака; болките се разпространяват по главата, причинявайки усещане за пръсване във фронталната област и очните ябълки (**Sang., Sil.** започва по същия начин, но е полулатерално); < от умствено усилие; от пушене; от слънчева топлина; при лежане с ниско поставена глава.

Усещане за лента около главата над очите (**Carb. ac., Sulph.**); скалпът — болезнен при допир.

Страхува се, че ако не е в движение, сърцето ще спре да бие (страхува се, че ще спре да бие, ако се движи — **Dig.**).

Бавен пулс при старост.

Голяма тежест на клепачите; не може да ги държи отворени (**Caust., Graph., Sep.**).

Студени тръпки без жажда, особено по гръбнака, тичащи нагоре и надолу по гърба в бърза, вълнообразна последователност от сакрума към тилната област.

< Влажно време; преди буря; умствена емоция или вълнение; лоши новини; тютюнопушене; когато мисли за своите заболявания; когато му се говори за загубата му.

Glonoine

Нервен темперамент; плеторични, румени, чувствителни жени; хора, които лесно се засягат.

Лоши ефекти от умствено вълнение, уплаха, страх, механични наранявания и техните по-късни последици; от подстригване на косата (**Acon.**, **Bell.**).

Главни оплаквания: от работа под газова светлина, когато топлината пада върху главата; не може да търпи топлина около главата, топлина от печка или ходене на слънце (**Lach.**, **Nat. c.**).

Церебрална конгестия или редуваща се конгестия на главата и сърцето.

Глава: чувства се огромно голяма; сякаш черепът е твърде малък за мозъка; слънчев удар и слънчево главоболие; увеличава се и намалява всеки ден заедно със слънцето (**Kal.**, **Nat. c.**).

Ужасен удар в главата, синхронен с пулса.

Пулсиращо, трептящо главоболие; държи главата с двете ръце; не може да лежи — „възглавницата би туптяла“.

Мозъкът се чувства твърде голям, пълен, пръскащ; кръвта сякаш се изпомпва нагоре; пулсира при всеки тласък, стъпка, удар на пулса.

Интензивна мозъчна конгестия от забавен или потиснат мензис; главоболие вместо мензис.

Главоболие: появяващо се след обилен маточен кръвоизлив; прилив на кръв към главата при бременни жени.

Силна палпитация, с пулсиране в каротидите; сърдечната дейност — затруднена, потисната; кръвта сякаш се втурва към сърцето и бързо към главата.

Конвулсии при деца от мозъчна конгестия; менингит по време на никнене на зъби, случаи, които изглеждат подходящи за **Belladonna**.

Децата се разболяват вечер, когато седят пред открит въгленов огън или заспиват там.

Топли вълни; при климактериума (**Amyl.**, **Bell.**, **Lach.**); с менструацията (**Fer.**, **Sang.**).

< **На слънце; излагане на слънчеви лъчи; газова светлина; прегряване; тласък; навеждане; изкачване; докосване на шапката; подстригване на косата.**

Graphites

Подходящо за жени, склонни към затлъстяване, които страдат от навичен запек; с анамнеза за забавена менструация. „Каквото е **Pulsatilla** в пубертета, **Graphites** е в климактериума.“

Прекомерна предпазливост; плашлива; колеблива; неспособна да вземе решение за каквото и да е (**Puls.**).

Неспокойна, докато седи на работа (**Zinc.**).

Тъжна, отчаяна; музиката я кара да плаче; мисли за нищо друго освен за смърт (музиката е непоносима — **Nat. c., Sab.**).

Екзема на клепачите; обрив влажен и напукан; клепачите — червени, а ръбовете — покрити с люспи или корички.

Сексуална слабост от сексуална злоупотреба.

Мензис: твърде оскъден, блед, късен, с насилствени колики; нерегулярен; забавен от намокряне на краката (**Puls.**).

Сутрешно гадене по време на менструация; много слаба и прострирана (**Alum., Carbo an., Coc.**).

Левкорей: разяждаща, ексориативна; появява се на пориви ден и нощ; преди и след мензиса (преди — **Sep.**, след — **Kreos.**).

Твърди цикатрикси, оставащи след мамарен абсцес, забавящи потока на млякото; рак на гърдата от стари белези и повтарящи се абсцеси.

Нездрава кожа; всяко нараняване нагноява (**Hep.**); старите цикатрикси отново се разтварят; обриви по ушите, между пръстите на ръцете и краката и по различни части на тялото, от които изтича водниста, прозрачна, лепкава течност.

Ноктите — чупливи, ронливи, деформирани (**Ant. c.**); болезнени, чувствителни, сякаш язвени; дебели и изкривени.

Пукнатини или фисури по краищата на пръстите, зърната, лабиалните комисури; на ануса; между пръстите на краката.

Парещо кръгло петно на върха на главата (**Cal., Sulph.** — студено петно — **Sep., Ver.**).

Каталептично състояние; в съзнание, но без сила да се движи или говори.

Лесно настива, чувствителна към течение (**Bor., Cal., Hep., Nux.**).

Засегнатите части отслабват, стават хилави.

Чува по-добре, когато има шум; когато пътува в карета или влак, когато има тътнеш звук (**Nit. ac.**).

Диария: изпражнения — кафяви, течни, смесени с неусвоени вещества и с непоносим мирис; често причинена от потиснати обриви (**Psor.**).

Хроничен запек; изпражнения — трудни, големи, твърди, възлести, с бучки, свързани с нишки слюз; твърде големи (**Sulph.**); пареща, болезнена чувствителност в ануса след дефекация.

Деца: нахални, дразнещи, смеят се на порицания.

Усещане за паяжини по челото, усилено се опитва да ги изтрие (**Bar., Bor., Brom., Ran. s.**).

Флегмонозен еризипел: на лицето, с пареща, жилеща болка; започва от дясната страна, преминава към лявата; след приложение на йод.

Изразено отвращение към коитус (и при двата пола).

< **Нощем; по време и след менструация.**

Hamamelis virginica

Този храст цъфти от септември до ноември, когато листата падат. Семената узряват през следващото лято.

Подходящо за венозни кръвоизливи от всеки отвор на тялото: нос, бели дробове, черва, матка, пикочен мехур.

Венозна конгестия; пасивна, на кожата и лигавиците; флебит, варикозни вени; язви, варикозни, с жилеща, пробощаща болка; хемороиди.

Пациенти, склонни към варикозни вени, настиват лесно при всяко излагане, особено в топъл, влажен въздух.

„Е **Aconite** на венозната капилярна система.“

Натъртена болезненост на засегнатите части (**Arn.**); ревматизъм, ставен и мускулен.

Рани: разрезни, разкъсни, контузни; наранявания от падания; спира кръвоизлива, премахва болката и болезнеността (**Arn.**).

Хронични ефекти от механични наранявания (**Con.**).

Травматичен конюнктивит; сугилтации или екстравазации в камерите на окото; от силна кашлица; интензивна болезненост (**Arn., Calen., Led.**).

Кървене от носа: потокът — пасивен, продължителен, кръвта — несъсирваща се (**Crot.**); обилен кръвоизлив > главоболието (**Mel.**); идиопатичен, травматичен, викариращ, в детството.

Хеморагия: обилна, тъмна, гъста, от язви на червата (**Crot.**); маточна — активна или пасивна; след падане или грубо яздене; викарираща менструация; без умствена тревожност.

Хемоптиза: гъделичкаща кашлица, с вкус на кръв или сира; венозна, без усилие или кашляне; понякога ежесмесчно, години наред.

Обилни отделяния, които наподобяват хеморагия и изтощават организма толкова, колкото и загубата на кръв.

Хемороиди: силно кървящи; с парене, болезненост, пълнота, тежест; сякаш гърбът ще се пречупи; позиви за дефекация; синкав цвят; анусът — болезнен и суров.

Мензис: поток — тъмен и обилен; с болезненост в корема; след удар върху яйчника или падане; всички страдания < по време на менструалния период (**Act., Puls.**).

Маточна хеморагия — активна или пасивна; от раздрусване при яздене по неравни пътища; притискаща надолу болка в гърба.

След кръвоизлив от хемороиди — прострация, несъразмерна с количеството загубена кръв (**Hydr.**).

Лоши ефекти от загуба на кръв (**Cinch.**).

Helleborus niger

Слаби, деликатни, псорични деца; склонни към мозъчни заболявания (**Bell., Cal., Tub.**); със серозен излив.

Меланхолия: тъжна; отчаяна; мълчалива; с тревога; след тиф; при момичета в пубертета или когато мензисът не се връща след появяване.

Раздражителен, лесно се ядосва; утешаването — < (**Ign., Nat., Sep., Sil.**); не иска да бъде безпокоен (**Gels., Nat.**).

Безсъзнателен; глупав; отговаря бавно, когато го питат; картина на остра идиотия (за хронична — **Bar. c.**).

Мозъчни симптоми по време на никнене на зъби (**Bell., Pod.**); заплашващ излив (**Apis., Tub.**).

Менингит: остър, церебро-спинален, туберкулозен, с ексудация; парализа — повече или по-малко пълна; с *cri encephalique*.

Празен, безмислен поглед; очите — широко отворени; нечувствителни към светлина; зениците — разширени или редуващо се свити и разширени.

Сопорозен сън, с писъци, викове, подскачания.

Хидроцефал, постскарлатинозен или туберкулозен, който се развива бързо (**Apis, Sulph., Tub.**); автоматични движения на една ръка и крак.

Конвулсии с крайна студенина на тялото, освен главата или тилната област, които може да са горещи (**Arn.**).

Алчно поглъща студена вода; хапе лъжицата, но остава в безсъзнание.

Дъвчащи движения на устата; ъглите на устата — болезнени, напукани; ноздрите — мръсни и саждести, сухи.

Постоянно чопли устните си, дрехите си или бърка в носа с пръст (докато е напълно в съзнание — **Arum.**).

Забиване на главата в възглавницата; търкаляне от една страна на друга; удряне на главата с ръце.

Диария: по време на остър хидроцефал, никнене на зъби, бременност; водниста; бистра, лепкава, безцветна слуз; бяла, желеподобна слуз; като жабешки хайвер; неволна.

Урина: червена, черна, оскъдна, с утайка като кафе; потисната при мозъчни заболявания и отоци; албуминозна.

Отоци: на мозъка, гърдите, корема; след скарлатина, интермитентни трески; с треска, слабост, потисната урина; от потиснати екзантеми (**Apis, Zinc.**).

Hypericum perforatum

Механични наранявания на гръбначния мозък; лоши ефекти от спинална контузия; болки след падане върху опашната кост.

Прободни, разрезни или разкъсани рани; болезнени, чувствителни (**Led.** — контузни рани — **Arn., Ham.**), особено ако са от дълго време.

Наранявания: от настъпване на пирони, игли, карфици, трески (**Led.**); от ухапвания от плъхове; предотвратява тетанус.

Запазва целостта на разкъсани и разчленени части, когато са почти напълно отделени от тялото (**Calend.**).

Нараняване на части, богати на сетивни нерви — пръсти, пръсти на краката, матрици на ноктите, длани или стъпала — където непоносимата болка показва силно засягане на нервите; на тъкани на животинския живот, като ръце и крака.

Нервна депресия след рани или хирургични операции; премахва лошите ефекти от шок, уплаха, месмеризъм.

Винаги модифицира и понякога спира улцерация и гангрена (**Calend.**).

Смачкани, притиснати върхове на пръстите.

Тетанус след травматични наранявания (сравни **Phys.**).

Виене на свят: усещане сякаш главата внезапно се удължава; нощем, с позиви за уриниране.

Главоболие: след падане върху тилната област, с усещане сякаш се издига високо във въздуха; голяма тревога да не падне от тази височина.

Гръбнак: след падане; най-лекото движение на ръцете или шията изтръгва викове; гръбнакът — много чувствителен на допир.

Буниони и мазоли, когато болката е мъчителна, показваща нервно участие.

Конвулсии; след удари по главата или контузия.

Ignatia

Особено подходящо за нервен темперамент; жени с чувствителна, лесно възбудима природа; тъмна коса и кожа, но мек характер, бързо възприемащи, бързи в изпълнението.

В ярък контраст с русата, податлива, плачлива, но бавна и нерешителна **Pulsatilla**.

Лекарството на големите противоречия: шумът в ушите > от музика; хемороидите > при ходене; възпаленото гърло се чувства > при преглъщане; празното усещане в стомаха не е > от ядене; кашлицата < колкото повече кашля; кашлица при спиране по време на разходка (**Ast. fl.**); спазматичен смях от скръб; сексуално желание с импотентност; жажда по време на студ, без жажда по време на треска; цветът на лицето се променя, когато е в покой.

Психичните състояния се променят бързо, в почти невероятно кратко време — от радост към тъга, от смях към плач (**Coff., Croc., Nux m.**); променливо настроение.

Хора, психически и физически изтощени от дълго концентрирана скръб.

Неволно въздишане (**Lach.**); със слабо, празно усещане в ямката на стомаха; не е > от ядене (**Hydr.**, **Sep.**).

Лоши ефекти от гняв, скръб или несподелена любов (**Cal. p.**, **Hyos.**); тъгува в самота над въображаеми неприятности.

Желание да бъде сам.

Фино чувствително настроение, деликатно съзнание.

Непостоянен, нетърпелив, нерешителен, свадлив.

Любезен по характер, когато се чувства добре, но лесно смутим от най-леката емоция; лесно обиден.

Най-малката критика или противоречие предизвиква гняв, и това го ядосва със самия себе си.

Деца, когато са порицани, нахокани или изпратени в леглото, се разболяват или получават конвулсии по време на сън.

Лоши ефекти от лоши новини; от раздразнение с потиснато недоволство; от потиснати душевни страдания; от срам и унижение (**Staph.**).

Главоболие, сякаш пирон е забит навън през страната, облекчено от лежане върху нея (**Coff.**, **Nux**, **Thuja**).

Не понася тютюн; пушенето или престоят в тютюнев дим предизвиква или влошава главоболие.

При говорене или дъвчане — хапе вътрешната страна на бузата.

Пот по лицето само на малко място, докато яде.

Свръхчувствителност към болка (**Coff.**, **Cham.**).

Запек: от пътуване с карета; от паралитичен произход; с прекомерни позиви, усещани повече в горната част на корема (**Ver.**); с голяма болка, страхува се да отиде до тоалетната; при жени, които редовно пият кафе.

Пролапс на ануса от умерено напъване при дефекация, навеждане или вдигане (**Nit. ac.**, **Pod.**, **Ruta**); < когато изпражненията са редки.

Хемороиди: пролапс при всяко изхождане, трябва да бъдат намествани; остри пробождания, стрелящи нагоре в ректума (**Nit. ac.**); < часове след дефекация (**Rat.**, **Sulph.**).

Трепвания, подскачания, дори спазми на отделни крайници или на цялото тяло при заспиване.

Болка в малки, ограничени точки.

Треска: червено лице по време на студа (**Fer.**); студ с жажда само по време на студа; > от външна топлина; топлина без жажда, < от завиване (> от завиване — **Nux**).

Оплакванията се връщат в точно същия час.

Ignatia има същото отношение към заболяванията на жените, каквото **Nux** има към сангвинични, билиозни мъже.

Има много повече **Ignatia**-хора в Северна Америка, отколкото **Nux vomica**-хора — Херинг.

< От тютюн, кафе, бренди, контакт, движение, силни миризми, душевни емоции, скръб.

> Топлина, силен натиск (**Cinch.**); преглъщане; ходене.

Iodum

Хора със скрофулозна диатеза, с тъмна или черна коса и очи; ниско кахектично състояние, с дълбока слабост и голямо изтощаване (**Abrot.**).

Голяма слабост и загуба на дъх при изкачване на стълби (**Calc.**); по време на мензис (**Alum.**, **Carbo an.**, **Coc.**).

Вълчи глад; яде обилно и добре, но въпреки това отслабва непрекъснато (**Abrot.**, **Nat. m.**, **Sanic.**, **Tub.**).

Празни оригвания от сутрин до вечер, сякаш всяка частица храна се е превърнала във въздух (**Kali c.**).

Страда от глад, трябва да яде на всеки няколко часа; тревожен и разтревожен, ако не яде (**Cina**, **Sulph.**); чувства се > докато яде или след ядене, когато стомахът е пълен.

Сърбеж: ниско долу в белите дробове, зад гръдната кост, причиняващ кашлица; разпространява се през бронхите към носната кухина (**Coc. c.**, **Con.**, **Phos.**).

Хипертрофия и индурация на жлезиста тъкан — щитовидна жлеза, гърди, яйчници, тестиси, матка, простата или други жлези — гърдите може да закърнеят и да станат отпуснати.

Твърд гуша при хора с тъмна коса (при светла коса — **Brom.**); чувства се > след ядене.

Палпитация, по-лоша от най-малкото усилие (сравни **Dig.** — от най-малко умствено усилие — **Cal. ars.**).

Усещане сякаш сърцето е стиснато; сякаш е хванато с желязна ръка (**Cac., Sulph.**).

Левкорей: разяждаща, корозивна, оцветяваща и разяждаща бельото; най-обилна по време на мензис.

Карцинозна дегенерация на шийката; режещи болки в корема и кръвоизлив при всяко изхождане.

Запек, с неуспешни позиви, > от пиене на студено мляко.

Круп: мембранозен, дрезгава, суха кашлица, по-лоша в топло, влажно време; с хриптене и „трионоподобно“ дишане (**Spong.**).

Детето се хваща за ларинкса (**Cera**); лицето — бледо и студено, особено при пълни деца.

< **Топлина; завиване на главата (обратното на Hep., Psor.)**.

Ipecacuanha

Подходящо за случаи, при които стомашните симптоми преобладават (**Ant. c., Puls.**); езикът — чист или леко обложен.

При всички заболявания с постоянна и непрекъсната гадене.

Гадене: с обилна слюнка; повръщане на бяла, стъкловидна слюз в големи количества, без облекчение; след което се приспива; по-лошо от навеждане; първичните ефекти на тютюна; на бременността.

Стомах: чувства се отпуснат, сякаш виси надолу (**Ign., Staph.**); стискащи, притискащи, хващащи болки, сякаш от ръка, всеки пръст рязко притискащ червата; по-лошо от движение.

Флатулентна, режеща колика около пъпа.

Изпражнения: тревисто-зелени; от бяла слюз (**Colch.**); кървави; ферментирали, пенести, слюзести, като пенлива меласа.

Есенна дизентерия; студени нощи след горещи дни (**Colch., Merc.**).

Азиатска холера, първи симптоми, когато гаденето и повръщането преобладават (**Colch.**).

Хеморагия: активна или пасивна, яркочервена, от всички отвори на тялото (**Erig., Mill.**); маточна — обилна, със съсиреци; тежко, потиснато дишане по време на нея; пробуждащи болки от пъпа към матката.

Режещи болки през корема отляво надясно (**Lach.** — отдясно наляво — **Lyc.**).

Кашлица: суха, спазматична, стегната, астматична.

Затруднено дишане от най-малкото усилие; силна диспнея, с хриптене и тревога в областта на стомаха.

Коклюш: детето губи дъх, пребледнява, втвърдява се и посинява; задушаване, с давяне и повръщане на слюз; кървене от носа или устата (**Indigo**).

Кашлица с дрънчаща слюз в бронхите при вдишване (**Ant. t.**); заплашващо задушаване от слюз.

Болки сякаш костите са разкъсани на парчета (сякаш са счупени — **Eup.**).

Интермитентна треска: в началото на нередовни случаи; с гадене или от стомашно разстройство; след злоупотреба с хинин или потискане от него.

Интермитентна диспепсия, през ден, в същия час; треска с упорита гадене.

Свръхчувствителност към топло и студено.

< **Зима и сухо време; топли, влажни, южни ветрове** (**Euph.**); **най-лекото движение.**

Kali bichromicum

Дебели, светлокоси хора, които страдат от катарални, сифилитични или псорични заболявания.

Дебели, пухкави, късоврати деца, склонни към круп и крупозни заболявания.

Заболявания на лигавиците — очи, нос, уста, гърло, бронхи, гастро-интестинален и генито-уринарен тракт — отделяне на гъста, нишковидна слюз, която се залепва за частите и може да бъде издърпана на дълги нишки (сравни **Hyd., Lys.**).

Оплаквания, появяващи се в горещо време.

Склонност да настива на открит въздух.

Ревматизъм, редуващ се със стомашни симптоми — едното се появява през есента, другото през пролетта; ревматизъм и дизентерия се редуват (**Abrot.**).

Болки: в малки точки, могат да бъдат покрити с върха на пръста (**Ign.**); бързо се преместват от една част в друга (**Kali s.**, **Lac c.**, **Puls.**); появяват се и изчезват внезапно (**Bell.**, **Ign.**, **Mag. p.**).

Невралгия всеки ден в същия час (**Chin. s.**).

Стомашни оплаквания: лоши ефекти от бира; загуба на апетит; тежест в ямката на стомаха; газове; < скоро след ядене; повръщане на нишковидна слюз и кръв; кръгла язва на стомаха (**Gym.**).

Нос: притискаща болка в корена на носа (в челото и корена на носа — **Stict.**); отделяне на тапи, „корички“; гъста, нишковидна, зелена течна слюз; на прозрачни маси; и има силна болка от тилната област към челото, ако отделянето се облекчи.

Улцерация на септума, с кърваво отделяне или големи люспи твърда слюз (**Alum.**, **Sep.**, **Teuc.**).

Дифтерия: псевдомембранозни налепи, твърди, перлени, фибринозни, склонни да се разпространяват надолу към ларинкса и трахеята (**Lac c.** — обратното на **Brom.**).

Оточен, мехуроподобен вид на увулата; голямо подуване, но малко зачервяване (**Rhus**).

Кашлица: силна, дрънчаща, с даване от вискозна слюз в гърлото; < при събличане (**Hep.**).

Круп: дрезгава, металическа, с експекторация на гъста слюз или фибро-еластични отливки сутрин при събуждане; с диспнея, > при лягане (по-лошо при лягане — **Aral.**, **Lach.**).

Дълбоко разяждащи язви във фаринкса; често сифилитични.

Главоболие: замъглено зрение или слепота предхождат пристъпа (**Gels.**, **Lac d.**); трябва да легне; отвращение към светлина и шум; зрението се връща, когато главоболието се увеличава (**Iris**, **Nat.**, **Lac d.**).

Пролапс на матката, сякаш в горещо време.

Сексуално желание липсва при пълни хора.

< **Топлината на лятото; горещо време.**

> **Кожните симптоми са по-добри в студено време (обратното на Alum. и Pet.).**

Kali bromatum

Подходящо за едри хора, склонни към затлъстяване; действа по-добре при деца, отколкото при възрастни.

Загуба на чувствителност — на фаринкс, ларинкс, уретра, на цялото тяло; залища, несигурна походка; чувства сякаш краката му са разпръснати по целия тротоар.

Нервен, неспокоен; не може да стои на едно място, трябва да се движи или да бъде зает; ръцете и пръстите — в постоянно движение; неспокойни ръце (неспокойни крака — **Zinc.**); потрепване на пръстите.

Пристъпи на неконтролируем плач и дълбоки меланхолични заблуди.

Загуба на памет; забравя как да говори; разсеян; трябва да му се каже думата, преди да може да я произнесе (**Anac.**).

Потиснат, унил, тревожен, „чувства сякаш ще загуби разсъдъка си“.

Несъгласуваност на мускулите (**Gels.**); нервна слабост или парализа на движението и изтръпване.

Неспокойство и безсъние поради тревоги и скръб, загуба на имущество или репутация, от бизнес затруднения (**Hyos.**).

Нощни ужаси при деца (**Kali p.**); скърцане със зъби в съня, писъци, стенания, плач; ужасни сънища, не може да бъде утешено от близки.

Сомнамбулизъм (**Sil.**).

Спазми: от уплаха, гняв или емоционални причини при нервни, плеторични хора; по време на раждане, никнене на зъби, коклюш, Брайтова болест.

Епилепсия: вродена, сифилитична, туберкулозна; обикновено ден или два преди мензиса; при новолуние; главоболие след пристъпа.

Cholera infantum, с рефлекторно дразнене на мозъка, преди излив; първи стадий на хидроцефалoid.

Ежедневна колика при кърмачета около 5 сутринта (в 4 следобед — **Col., Lyc.**).

Нервна кашлица по време на бременност; суха, силна, почти непрекъсната, заплашваща аборт (**Con.**).

Заекване; бавна, трудна реч (**Bov., Stram.**).

Акне: *simplex, indurata, rosacea*; синкаво-червено, пустулозно, по лицето, гърдите, раменете; оставя грозни белези (**Carbo an.**); при млади, пълни хора с груби навици.

Kali carbonicum

За заболявания на възрастни хора, отоци и парализа; с тъмна коса, отпусната тъкан, склонни към затлъстяване (**Am. c., Graph.**).

След загуба на течности или жизненост, особено при анемични (**Cinch., Phos. ac., Phos., Psor.**).

Болки, пробождащи, стрелкащи, по-лоши по време на покой и при лежане на засегнатата страна (пробождат, стрелкащи, по-добри по време на покой и при лежане на болезнената страна — **Bry.**).

Не може да търпи да бъде докосван; подскача, когато бъде докоснат дори съвсем леко, особено по краката.

Голяма отвращение към това да бъде сам (**Ars., Bis., Lyc.** — желае да бъде сам — **Ign., Nux.**).

Торбовидни отоци между горните клепачи и веждите.

Слаби очи; след коитус, полюция, аборт, морбили.

Стомах: подут, чувствителен; усеща се сякаш ще се пръсне; прекомерни газове, всичко, което яде или пие, изглежда се превръща в газ (**Iod.**) [**Lyc.**].

Кървене от носа при миене на лицето сутрин (**Am. c., Arn.**).

Зъбобол само при ядене; пулсиращ; < когато бъде докоснат от нещо топло или студено.

Болки в гърба, изпотяване, слабост; след аборт, раждане, метророгия; при ядене; докато ходи, чувства сякаш трябва да се откаже и да легне.

Кашлица: суха, пристъпна, отделя вискозна слюз или гной, която трябва да бъде погълната; спазматична, с даване или повръщане на приетата храна; твърди, бели или опушени маси излитат от гърлото при кашляне (**Bad., Chel.**).

Чувства се зле седмица преди менструацията; болки в гърба преди и по време на мензиса.

Родилни болки — недостатъчни; силна болка в гърба; иска гърбът да бъде притискан (**Caust.**).

Астма, облекчена при сядане или навеждане напред или при люлеене; по-лоша от 2 до 4 сутринта.

Хора, страдащи от улцерация на белите дробове, едва ли могат да оздравеят без този антипсорик — Ханеман.

Затруднено преглъщане; пробощаща болка във фаринкса като от рибена кост (**Hep., Nit. ac.**); храната лесно попада в трахеята; болка в гърба при преглъщане.

Запек: изпразнения — големи, трудни, с пробощащи, коликообразни болки час или два преди това.

Сърце: склонност към мастна дегенерация (**Phos.**); сякаш е окачено на конец (**Lach.**).

Много склонен да настива.

Kalmia latifolia

Подходящо за остри невралгии, ревматизъм, подагрозни оплаквания, особено когато сърцето е засегнато като последица от ревматизъм или подагра.

При сърдечни заболявания, които са се развили от ревматизъм или се редуват с него.

Болки — пробощащи, стрелкащи, притискащи, стрелящи в посока надолу (**Cac.** — нагоре — **Led.**); придружени или последвани от изтръпване на засегнатата част (**Acon., Cham., Plat.**).

Силна пробощаща болка в дясното око и орбитата (в лявото око — **Spig.**); скованост в мускулите, болка < при движение на очите (**Spig.**); започва при изгрев, < по обед и изчезва при залез (**Nat. m.**).

Ревматизъм: болките — силни, сменят мястото си внезапно, преминавайки от става в става; ставата — гореща, червена, подува; по-лошо от най-малкото движение.

Виене на свят при навеждане или гледане надолу (**Spig.**).

Пулс — бавен, едва доловим (35–40 удара в минута); бледо лице и студени крайници.

Kreosotum

Тъмна кожа, слаба, кльощава, недоразвита, зле хранена, прераснала; много висока за възрастта си (**Phos.**).

Деца: изглеждат стари, набръчкани (**Abrot.**); скрофулозни или псорични заболявания; бързо изтощаване (**Iod.**); постклимактерични заболявания при жени (**Lach.**).

Хеморагична диатеза; малки рани кървят свободно (**Crot., Lach., Phos.**); потокът — пасивен, при епистаксис, хемоптиза, хематурия; при тиф, последван от голяма прострация; тъмно, просмукващо се кървене след изваждане на зъб (**Ham.**).

Бучене и шум в ушите, с глухота, преди и по време на мензиса.

Корозивни, зловонни, ихорозни отделения от лигавиците; жизнеността — силно потисната.

Сърбеж, толкова силен към вечерта, че почти подлудява (сърбеж без обрив — **Dolichos**).

Болезнено никнене на зъби; зъбите започват да се развалят веднага щом се появят; венците — синкаво-червени, меки, гъбести, кървящи, възпалени, скорбутни, язвени.

Повръщане: при бременност — сладникава вода със слюноотделяне; при холера — по време на болезнено никнене на зъби; непрекъснато, с трупен изпражнения; при злокачествени заболявания на стомаха.

Силно главоболие преди и по време на мензиса (**Sep.**).

Мензис: твърде ранен, обилен, продължителен; болка по време на него, но < след него; потокът — при лягане, спира при сядане или ходене; студени напитки облекчават менструалните болки; потокът прекъсва; понякога почти спира, после започва отново (**Sulph.**).

Инконтиненция на урината; може да уринира само когато лежи; обилна, бледа; позиви — не може да стане от леглото достатъчно бързо (**Apis, Petros.**); по време на първия сън (**Sep.**), от който детето се събужда трудно.

Парене и смъдене по време и след уриниране (**Sulph.**).

Левкорей: разяждаща, корозивна, зловонна; по-лоша между периодите (**Bov., Bor.**); има мирис на зелена царевица; втвърдява се като нишесте, оцветява бельото в жълто.

Лохии: тъмни, кафяви, на бучки, зловонни, разяждащи; почти спират, после отново се засилват (**Con., Sulph.**).

Силен корозивен сърбеж на външните полови органи и влагалището.

< **На открит въздух; студено време; при изстиване; от миене или къпане със студена вода; покой, особено при лежане.**

> **Обикновено по-добре от топлина.**

Lac caninum

За нервни, неспокойни, силно чувствителни организми.

Симптоми — непостоянни, болките непрекъснато „летят“ от една част към друга (**Kali bi., Puls.**); сменят страните на всеки няколко часа или дни.

Много разсеяна, забравяща; прави покупки и си тръгва без тях (**Agnus, Anac., Caust., Nat.**).

При писане използва твърде много думи или не правилните; пропуска последната буква или букви в думата; не може да концентрира ума си, за да чете или учи; много нервна (**Bov., Graph., Lach., Nat. c., Sep.**).

Отчаяна, безнадеждна; мисли, че болестта ѝ е неизлечима; няма нито един жив приятел; нищо не си струва да се живее; може да заплаче във всеки момент (**Act., Aur., Cal., Lach.**).

Кисела, раздразнителна; детето плаче и крещи непрекъснато, особено нощем (**Jal., Nux, Psor.**).

Страхува се да бъде сама (**Kali c.**); от умирање (**Ars.**); от полудяване (**Lil.**); от падане по стълбите (**Bor.**).

Хронично „синьо“ състояние; всичко изглежда толкова тъмно, че не може да стане по-тъмно (**Lyc., Puls.**).

Пристъпи на ярост, ругатни и псувни при най-малката провокация (**Lil., Nit. ac.**); силна грозота; омраза.

Кориза, с отделяне на гъста, бяла слуз.

Едната ноздра запушена, другата — свободна и отделяща; тези състояния се редуват; отделянето — разяждащо, носът и устната — сурови (**Arum, Cepa**).

Дифтерия и тонзилит; симптомите се сменят многократно от страна на страна.

Болки в гърлото и кашлица — склонни да започват и завършват с менструацията; жълти или бели налепи; болките стрелят към ухото.

Гърло: чувствително към външен допир (**Lach.**); < при празно преглъщане (**Ign.**); постоянно желание за преглъщане, болезнено, почти невъзможно (**Mer.**); болките се разпространяват към ушите (**Hep., Kali bi.**); започва от лявата страна (**Lach.**).

Лъскав, глазиращ вид на дифтеритичните налепи, шанкри и язви.

Много гладна, не може да яде достатъчно, за да се насити; толкова гладна след ядене, колкото и преди (**Casc., Cal., Cina, Lyc., Stront.**).

Потъване в епигастриума; прималвяване в стомаха.

Мензис: твърде ранен; твърде обилен; потокът — на пориви, яркочервен, вискозен и нишковиден (тъмен, черен, нишковиден — **Croc.**); гърдите — подути, болезнени, чувствителни преди и по време (**Con.**).

Отделяне на газове от влагалището (**Brom., Lyc., Nux m., Sang.**).

Гърди: възпалени, болезнени; < от най-лекото разклащане и към вечерта; трябва да ги държи здраво, когато се качва или слиза по стълби (**Bry.**).

Полезно в почти всички случаи, когато е необходимо да се пресуши млякото (**Asaf.** — за връщане или увеличаване — **Lac d.**).

Усещане сякаш дъхът ще я напусне, когато лежи; трябва да стане и да ходи (**Am. c., Grind., Lach.**).

Загуба на мляко по време на кърмене, без известна причина (**Asaf.**).

Палпитация — силна, когато лежи на лявата страна; > при обръщане на дясната (**Tab.**).

Половите органи — лесно възбудими от допир, натиск при сядане или триене при ходене (**Cinn., Coff., Mur., Plat.**).

Когато ходи, сякаш ходи по въздуха; когато лежи, сякаш не докосва леглото (**Asar.**).

Болки в гърба: силни, непоносими, през супрасакралната област, разпространяващи се към дясната седалищна област и десния седалищен нерв; < при покой и при първо движение (**Rhus**); гръбнакът боли от основата на мозъка до опашната кост, много чувствителен към допир или натиск (**Chin. s., Phos., Zinc.**).

Lac defloratum

Успешното лечение на диабет и Брайтова болест с обезмаслено мляко от Донкин беше намерението, който доведе д-р Суон до потенциране и доказване на това средство. Всеки даден симптом е бил проверен в лечението на болни.

Заболявания с погрешно и дефектно хранене, с рефлексни засягания на нервните центрове.

Отчаян; не му се живее; няма страх от смъртта, но е сигурен, че ще умре.

Американско мигренозно главоболие: започва във фронталната област, разпространява се към тилната, сутрин при ставане (**Bry.**); интензивно пулсиране, с гадене, повръщане, слепота и упорит запек (**Epig., Iris, Sang.**); < шум, светлина, движение (**Mag. m., Sil.**); по време на мензис (**Kreos., Sep.**); голяма прострация; > натиск, чрез стегнато превързване на главата (**Arg. n., Puls.**); обилна, бледа урина.

Globus hystericus; усещане за голяма топка, издигаща се от стомаха към гърлото, причиняваща чувство на задушаване (**Asaf., Kal.**).

Повръщане; непрекъснато, без отношение към хранене; първо на несмляна храна, силно кисела, после на горчива вода; при бременност (**Lac. ac., Psor.**).

Запек: с неуспешни позиви (**Anac., Nux**); фекалии — сухи и твърди (**Bry., Sulph.**); изпражнение — голямо, твърдо, със силно напъване, разкъсващо ануса; болезнено, изтръгващо викове.

Жена е вземала 10 до 12 клизми дневно, често е минавала 4 или 5 седмици без изхождане, запек от 15 години.

Мензис: забавен; потиснат от потапяне на ръцете в студена вода (**Con.**); изпиването на чаша мляко ще потисне потока незабавно до следващия период (сравни **Phos.**).

Голяма неспокойност, крайно и продължително страдание от загуба на сън (**Coc., Nit. ac.**).

Чувства се напълно изтощена, независимо дали прави нещо или не; голяма умора при ходене.

Усещане: сякаш студен въздух духа върху нея, дори когато е завита; сякаш чаршафите са влажни.

Отоци: от органично сърдечно заболяване; от хронично чернодробно заболяване; напреднала албуминурия; след интермитентна треска; затлъстяване; мастна дегенерация.

Lac defloratum

Успешното лечение на диабет и Брайтова болест с обезмаслено мляко от Донкин беше намерено, който доведе д-р Суон до потенциране и доказване на това средство. Всеки даден симптом е бил проверен в лечението на болни.

Заболявания с погрешно и дефектно хранене, с рефлексни засягания на нервните центрове.

Отчаян; не му се живее; няма страх от смъртта, но е сигурен, че ще умре.

Американско мигренозно главоболие: започва във фронталната област, разпространява се към тилната, сутрин при ставане (**Bry.**); интензивно пулсиране, с гадене, повръщане, слепота и упорит запек (**Epig., Iris, Sang.**); < шум, светлина, движение (**Mag. m., Sil.**); по време на мензис (**Kreos., Sep.**); голяма прострация; > натиск, чрез стегнато превързване на главата (**Arg. n., Puls.**); обилна, бледа урина.

Globus hystericus; усещане за голяма топка, издигаща се от стомаха към гърлото, причиняваща чувство на задушаване (**Asaf., Kal.**).

Повръщане; непрекъснато, без отношение към хранене; първо на несмляна храна, силно кисела, после на горчива вода; при бременност (**Lac. ac., Psor.**).

Запек: с неуспешни позиви (**Anac., Nux**); фекалии — сухи и твърди (**Bry., Sulph.**); изпражнение — голямо, твърдо, със силно напъване, разкъсващо ануса; болезнено, изтръгващо викове.

Жена е вземала 10 до 12 клизми дневно, често е минавала 4 или 5 седмици без изхождане, запек от 15 години.

Мензис: забавен; потиснат от потапяне на ръцете в студена вода (**Con.**); изпиването на чаша мляко ще потисне потока незабавно до следващия период (сравни **Phos.**).

Голяма неспокойност, крайно и продължително страдание от загуба на сън (**Coc., Nit. ac.**).

Чувства се напълно изтощена, независимо дали прави нещо или не; голяма умора при ходене.

Усещане: сякаш студен въздух духа върху нея, дори когато е завита; сякаш чаршафите са влажни.

Отоци: от органично сърдечно заболяване; от хронично чернодробно заболяване; напреднала албуминурия; след интермитентна треска; затлъстяване; мастна дегенерация.

Lachesis

Хора с меланхоличен темперамент, тъмни очи и склонност към унилоост и леност.

Жени с холеричен темперамент, с лунички и червена коса (**Phos.**). По-добре приспособено към слаби и изтощени, отколкото към пълни хора; към тези, които са били променени, както психически, така и физически, от болестта си.

Климактерични заболявания: хемороиди, хеморагии; горещи вълни и горещи изпотявания; парещо главоболие на върха, особено по време или след менопаузата (**Sang., Sulph.**).

Оплаквания от продължителна скръб; тъга, уплаха, раздразнение, ревност или несподелена любов (**Aur., Ign., Phos. ac.**). Жени, които не са се възстановили от климакса, „никога не са се чувствали добре оттогава“.

Лявата страна е главно засегната; болестите започват отляво и преминават надясно — ляв яйчник, тестис, гръден кош.

Голяма чувствителност към допир; гърло, стомах, корем; не може да търпи завивки или нощница да докосват гърлото или корема — не защото са болезнени, както при **Apis** или **Bell.**, а защото дрехите причиняват беспокойство, правят я нервна.

Нетърпимост към стегнати ленти около шията или кръста.

Крайните горещини и студове причиняват голяма слабост.

Пияници с конгестивни главоболия и хемороиди; склонни към еризипел или апоплексия.

Главоболие: притискаща или разпукваща болка в слепоочията < от движение, натиск, навеждане, лежане, след сън; страхува се да заспи, защото се събужда с такова главоболие.

Прилив на кръв към главата; след алкохол; душевни емоции; потиснат или нередовен мензис; при климакс; лявоостранна апоплексия.

Тежест и натиск на върха (**Sep.**); като олово — в тилната област.

Всички симптоми, особено психичните, по-лоши след сън, или влошаването го събужда; заспива в аграцията; нещастен, потиснат, тревожен, тъжен < сутрин при събуждане.

Психическа възбудимост; екстаз, с почти пророчески възприятия; с ярко въображение; голяма словоохотливост (**Agar.**, **Stram.**); иска да говори непрекъснато; прескача от една идея към друга; една дума често води към друга история.

Запек: неактивност, изпражненията лежат в ректума без позиви; усещане за стягане на сфинктера (**Caust.**, **Nit. ac.**).

Мензис в редовно време; твърде кратък, оскъден, слаб; болките се облекчават от потока; винаги по-добре по време на мензиса (**Zinc.**).

Хемороиди: с оскъден мензис; при климакс; заклещени; с пробождания, стрелящи нагоре (**Nit. ac.**).

Най-малкото нещо, приближаващо се до устата или носа, пречи на дишането; иска да бъде ветрена, но бавно и от разстояние (бързо — **Carbo v.**).

Щом заспи — дишането спира (**Am. c.**, **Grind.**, **Lac c.**, **Op.**).

Голяма физическа и психическа слабост; треперене на цялото тяло, би паднал от слабост; по-лошо сутрин (**Sulph.**, **Tub.**).

Епилепсия; идва по време на сън (**Bufo**); от загуба на жизнени течности; онанизъм, ревност.

Хеморагична диатеза; малки рани кървят лесно и обилно (**Crot., Kreos., Phos.**); кръвта — тъмна, несъсирваща се (**Crot., Sec.**).

Фурункули, карбункули, язви с интензивна болка (**Tar.**); злокачествени пустули; декубитус; тъмно-синкав, пурпурен вид; склонност към малигнизация.

Лоши ефекти от отровни рани; след аутопсия (**Pyr.**).

Усещане като топка, търкаляща се в пикочния мехур.

Треска, ежегодно връщаща се; пристъп всяка пролет (**Carbo v., Sulph.**), след потискане с хинин предишната есен.

Треска: тифозна, тифус; ступор или бълнуване, хлътнало лице, падане на долната челюст; език сух, черен, треперещ, изтласква се трудно или се закача за зъбите при изтласкване; конюнктиви — жълти или оранжеви; пот — студен, оцветява жълто, кървав (**Lyc.**).

Дифтерия и тонзилит, започващи отляво и преминаващи надясно (**Lac. c., Sabad.**); тъмно-пурпурен вид (**Naja**); < от топли напитки, след сън; течности — по-болезнени от твърди при преглъщане (**Bell., Bry., Ign.**); прострация несъразмерна с вида на гърлото.

< След сън; контакт; крайности на температурата; киселини; алкохол; хинин; живак; натиск или стягане; слънчеви лъчи; пролет; лято.

Ledum palustre

Подходящо за ревматична, подагрозна диатеза; конституции, увредени от алкохол (**Colch.**).

Кръвоизлив в предната камера след иридектомия.

Контузии на окото и клепачите, особено ако има много екстравазация на кръв; екхимоза на клепачите и конюнктивата.

Ревматизъм или подагра; започва в долните крайници и се изкачва нагоре (слиза надолу — **Kal.**); особено ако е довело до ниско астенично състояние от злоупотреба с **Colchicum**; ставите стават седалище на възли и „подагрозни камъни“, които са болезнени; остър и хроничен артрит.

Засяга лявото рамо и дясната тазобедрена става (**Agar., Ant. t., Stram.**).

Изтощаване на засегнатите части (**Graph.**).

Болките са пробощащи, разкъсващи, пулсиращи; ревматичните болки са < от движение; < нощем, от топлината на леглото и завивките (**Mer.**); > само когато държи краката в ледена вода (**Sec.**).

Оплаквания на хора, които са студени през цялото време; винаги чувстват студ и тръпки; липса на животинска или жизнена топлина (**Sep., Sil.**); особено ранените части са студени на допир.

Частите студени на допир, но не студени субективно за пациента.

При някои заболявания топлината на леглото е непоносима поради горене и парене в крайниците.

Подуване: на краката, до коленете; на глезена с непоносима болка при ходене, сякаш от навяхване или фалшива стъпка; възглавничката на палеца — подута, болезнена; в петите — сякаш натъртени.

Интензивен сърбеж на краката и глезените; < от чесане и топлината на леглото (**Puls., Rhus**).

Лесно навяхване на глезени и стъпала (**Carbo an.**).

Прободни рани от остри, заострени инструменти, като шила, пирони (**Hyper.**); ухапвания от плъхове, ужилвания от насекоми, особено комари.

Червени пъпки или туберкули по челото и бузите, както при пиячи на бренди, парещи при допир.

Дълго оставащо обезцветяване след наранявания: „черни и сини“ места стават зелени.

Lilium tigrinum

Засяга главно лявата страна на тялото (**Lach., Thuja**).

Измъчена относно своето спасение (**Lyc., Sulph., Ver.**), с яйчникови или маточни оплаквания; утешаването — <.

Диво, лудо усещане на върха на главата; объркани идеи.

Дълбока депресия на духа; едва може да се въздържа от плач; много плашлива, страхлива и много плаче; безразлична към това, което се прави за нея.

Тревожна: относно болестта; страхува се, че симптомите показват органично заболяване; изразено и при двата пола.

Склонност да ругае, удря, да мисли неприлични неща (**Anac., Lac c.**); редува се с маточно дразнене.

Безучастна, но не може да стои на едно място; неспокойна, но не иска да ходи; трябва да бъде заета, за да потисне сексуалното желание.

Желание да прави нещо, прибързан начин, но без амбиция; безцелно, прибързано движение (**Arg. n.**).

Страхове: да бъде сама, от лудост, от сърдечно заболяване; страхува се, че е неизлечима; от някакво предстоящо нещастие или болест.

Главоболия и психични оплаквания, зависещи от маточно дразнене или разместване.

Менструални нередности и раздразнено сърце.

Не може да ходи по неравен терен; болки в малки точки; непрекъснато сменящи се (**Kali bi.**).

Чести позиви за уриниране; ако желанието не бъде удовлетворено, усещане за конгестия в гърдите.

Усещане за притискане надолу; в корема и таза, сякаш всички органи ще излязат навън (**Lac. c., Murex, Sep.**); < при поддържане на вулвата с ръка; с палпитация.

Мензис: ранен, оскъден, тъмен, зловонен; потокът — само когато се движи; спира да тече, когато спре да ходи (**Caust.** — при лягане — **Kreos., Mag. c.**).

Усещане сякаш сърцето е хванато в менгеме (**Cac.**); сякаш цялата кръв е отишла в сърцето; чувства се пълна до пръсване; невъзможност да ходи изправена.

Пулсации по цялото тяло и пълно, раздуто усещане, сякаш кръвта ще пробие съдовете (**Aesc.**).

Палпитация, пърхане; прималвяване, прибързано, тревожно усещане около върха на сърцето; остра болка в лявата гръдна половина събужда през нощта; нерегулярен пулс; крайниците — студени и покрити със студена пот; < след ядене, при лежане на която и да е страна (на лявата страна — **Lach.**).

Бърз пулс, 150 до 170 удара в минута.

Постоянно желание за дефекация и уриниране (с пролапс), от натиск в ректума.

Слабо и атонично състояние на яйчниците, матката и тазовите тъкани, водещо до антефлексия, ретрофлексия, субинволюция (**Helon., Sep.**); бавно възстановяване след раждане; почти винаги със запек, от неактивност.

Lobelia inflata

Най-подходящо за хора със светла коса, сини очи, светъл тен, склонни към пълнота.

Стомашни разстройства, крайна гадене и повръщане; сутрешно повръщане; спазматична астма; коклюш, с диспнея, заплашваща задушаване.

Главоболие: стомашно, с гадене, повръщане и голяма прострация; след опиянение; < следобед до полунощ; внезапна бледност с обилна пот (**Tab.**); < от тютюн или тютюнев дим.

Повръщане: лицето — облято със студена пот; при бременност, с обилно слюноотделяне (**Lac. ac.** — нощем — **Mer.**); хронично, с добър апетит, с гадене, обилна пот и изразена прострация.

Прималяване, слабост и неопределимо усещане в епигастриума от прекомерна употреба на чай или тютюн.

Урина: с дълбок оранжево-червен цвят; обилен червен утайник.

Диспнея: от стягане в средата на гърдите; < при всяка родилна болка, сякаш неутрализира болките; < при излагане на студ или най-малкото усилие, при качване или слизане по стълби (**Ipec.**).

Усещане за конгестия, натиск или тежест в гърдите, сякаш кръвта от крайниците я изпълва; > при бързо ходене.

Усещане сякаш сърцето ще спре; дълбока болка в основата му (върха — **Lil.**).

Сакрум: крайна чувствителност; не може да понесе най-лекия допир, дори на мека възглавница; седи, наклонена напред, за да избегне допир с дрехите.

< Най-лекото движение; допир, студ.

> Болката в гърдите — при бързо ходене.

За лошите ефекти от пиянство при хора със светла коса, сини или сиви очи, румен тен, пълни — **Lobelia** има същото отношение, каквото **Nux vomica** има към хора с противоположен темперамент.

Lycopodium clavatum

За хора интелектуално остри, но физически слаби; горната част на тялото — изтощена, долната — полуотточна; предразположени към белодробни и чернодробни заболявания (**Cal.**, **Phos.**, **Sulph.**); особено в крайните възрасти — деца и стари хора.

Дълбоки, прогресивни, хронични заболявания.

Болки: тъпи, притискащи, дърпащи; главно десностранни, < от четири до осем вечерта.

Засяга дясната страна, или болката преминава отдясно наляво; гърло, гръден кош, корем, черен дроб, яйчници.

Деца — слаби, изтощени; с добре развито тяло, но дребни, болнави тела.

Бебето плаче цял ден, спи цяла нощ (обратното на **Jal.**, **Psor.**).

Оплаквания от уплаха, гняв, унижение или раздразнение със задържано недоволство (**Staph.**).

Алчни, лакоми, скъпернически, злобни, малодушни.

Раздразнителни; кисели и ядосани при ходене; грозни, ритат и крещят; лесно се гневят; не могат да търпят противопоставяне или противоречие; търсят спорове; извън себе си.

Плаче цял ден, не може да се успокои; много чувствителна, плаче дори когато ѝ благодарят.

Страх от хора; от самота, раздразнителна и меланхолична; страх от това да бъде сама (**Bis.**, **Kali c.**, **Lil.**).

Тен — блед, мръсен; нездрав; жълтеникав, с дълбоки бразди, изглежда по-стар от възрастта си; ветрилообразно движение на крилата на носа (**Ant. t.**).

Катарални състояния: сухо, носът запушен нощем, трябва да диша през устата (**Am. c.**, **Nux**, **Samb.**); „сумтене“, детето се стряска от сън и търка носа; на корена на носа и фронталните синуси; корички и еластични тапи (**Kali bi.**, **Marum**).

Дифтерия; фаринкс — кафеникаво-червен, налепът се разпространява от дясната сливица към лявата, или слиза от носа към дясната сливица; < след сън и от студени напитки (от топли напитки — **Lach.**).

Всичко има кисел вкус; оригвания, киселини, воднисти кисели повръщания (между студ и топлина).

Вълчи глад; колкото повече яде, толкова повече иска; главоболие, ако не яде.

Стомашни заболявания; прекомерно натрупване на газове; постоянно усещане за ситост; добър апетит, но няколко хапки го изпълват до гърлото и се чувства подут; ферментация в корема, с високо къркорене, клопочене, особено в долната част на корема (горната част — **Carbo v.**; целият корем — **Cinch.**); пълнотата не се облекчава от оригване (**Cinch.**).

Запек: от пубертета; от последното раждане; когато е далеч от дома; при кърмачета; с неуспешни позиви, ректумът се свива и пролабира по време на изхождане, развивайки хемороиди.

Червен пясък в урината, върху пелената на детето (**Phos.**); детето плаче преди уриниране (**Bor.**); болка в гърба, облекчена от уриниране; бъбречна колика, дясна страна (лява — **Berb.**).

Импотентност: при млади мъже от онанизъм или сексуални излишества; penis — малък, студен, отпуснат; при стари мъже — със силно желание, но несъвършени ерекции; заспива по време на полов акт; преждевременни емисии.

Сухота на влагалището; парене в него, по време и след коитус (**Lys.**); физометра.

Кървене от гениталиите при всяко изхождане.

Плодът сякаш прави салта.

Херния: дясностранна, излекувала много случаи, особено при деца.

Пневмония; пренебрегната или неправилно лекувана, основата на десния бял дроб е особено засегната; за ускоряване на абсорбцията или експекторацията.

Кашлица — дълбока, куха, дори отделянето на големи количества слюз дава малко облекчение.

Единият крак — горещ, другият — студен (**Cinch., Dig., Ipec.**).

Събужда се нощем, чувствайки глад (**Cina., Psor.**).

< Почти всички заболявания от 4 до 8 вечерта (**Hell.** — от 4 до 9 вечерта — **Col., Mag. p.**).

> Топла храна и напитки; от разкриване на главата; разхлабване на дрехите.