

The Materia Medica

Nosodes

Henry Clay ALLEN

Copyright © Médi-T 2003

Lac felinum

(Котешко мляко)

Ум :

Голяма потиснатост на духа.

Много раздразнителна към всички.

Страх от падане по стълбите, но без световъртеж.

Болестна съвестност; всяка малка грешка изглежда като престъпление.

Психична илюзия, че ъглите на мебелите или всеки остър предмет близо до нея ще се забият в очите; симптомът е чисто умствен; предметите не ѝ изглеждат прекалено близо (астенопия).

Глава :

Тъпа болка във фронталната област, в региона на веждите.

Тежест във фронталната област.

Тежък натиск в страничните части на главата и върха.

Пулсации в главата, с усещане за топлина във фронталната област и стягане през носния мост.

Остра болка на върха на главата.

Остри болки във фронталната област.

Интензивна болка рано сутрин на върха на главата и в лявата страна; започва точно пред върха, с прилив на топлина, който се разпространява напред около инч, след което следва интензивната болка; топлината и болката се разпространяват, никога не преминават средната линия, надолу по лявата страна като воал, обхващайки половината нос и челюсти, и навлизайки в ухото, карайки я да затваря очи от интензивността; по време на болката главата е извита надолу така, че брадичката силно притиска гърдите, а агонията е толкова голяма, че трябва да държи главата здраво с ръце и да тича из къщата от стая в стая, крещейки (от 17-та потенция).

Остра болка над лявото око и слепоочието.

Болка в главата < от четене.

Остри, пронизващи, зигзагообразни болки, преминаващи надолу по лявата страна на главата на всеки десет минути от върха към лявото ухо.

Болка, започваща с хладно усещане в корена на носа; също студена болка, преминаваща нагоре по средната линия към върха и към ухото (като предишния симптом).

Главоболие над очите (1).

Болка във фронталната област, тилната област и лявата страна на главата, с ригидност на мускулите на шията (splenius и trapezius) и топлина във върха; болката във фронталната област е тежка, притискаща надолу над очите (главоболие).

Интензивна болка от главата надолу по долната челюст, причиняваща напълване на устата със слюнка.

Пълзящо усещане на върха на мозъка (астенопия).

Тежест на върха (астенопия).

Ужасно главоболие, проникващо в лявото очно ябълко към центъра на мозъка, с болка в лявата супраорбитална област, простираща се през мозъка към върха (главоболие).

Парене в лявото слепоочие близо до окото, < през нощта (кератит).

Очи :

Остра, пронизваща болка през центъра на лявото очно ябълко, оставяща го много болезнено вътрешно и причиняваща обилно сълзене (от 1m).

Тежък натиск надолу върху веждите и клепачите, сякаш частите са от олово.

Склонност да държи очите затворени.

Очите се усещат сякаш хлътнали в главата, а лявото око понякога сълзи.

Трептене на външния край на левия горен клепач, отвътре.

(Трептене на клепачите — десен и ляв).

(Цилиарна невралгия).

Остра, пронизваща болка в центъра на дясното очно ябълко, простираща се навън към слепоочието и фронталната област над окото, с интензивна фотофобия, зачервяване на конюнктивата и сълзене; < от четене или писане; болката изглежда вътре в очното ябълко и се простира към задната стена на орбитата, а след това към слепоочията, с пулсации; замъглено зрение при четене; също запек, загуба на апетит, отпадналост в краката (хориоидит).

(Имал съм голям успех с него в очни случаи, особено когато има силна болка в задната част на орбитата, показваща хориоидит. — Swan).

При фиксиран поглед, четене или писане — стрелкаща болка от очите почти до тилната област; много < в дясното око (астенопия).

При четене буквите се сливат, с тъпа болка зад очите или стрелкаща болка в очите; замъгленото зрение и стрелкането са < в дясното око; симптомите се провокират от настинка или преумора (астенопия).

Болка в очите, назад към главата, изключително остра, с усещане сякаш очите се простират назад; силна фотофобия към естествена или изкуствена светлина; всяко продължително заслепяване води до тази болка (подобрено).

Стрелкаща болка, отиваща назад в центъра на дясното око, < през нощта (кератит).

Ако лежи на лявата страна, дясното око се усеща сякаш се движи и е твърде тежко, с голяма болка.

(Улцерация на роговицата).

Фотофобия.

Лявото око се усеща горещо и залепва сутрин.

Бяло петно на външния ръб на лявата роговица, с червени съдове, излизаци към него от конюнктивата, и стрелкащи болки от петното към тилната област.

Болка в долния орбитален ръб вдясно, сякаш е болезнен, с чувствителност при допир и стрелкане в дясното око.

Дясното око възпалено, със стрелкане назад там, където е бялото петно; лявото око също възпалено, но без стрелкане.

Ечемик на левия горен клепач.

Два ечемика на десния долен клепач.

Очите се влошават всеки септември.

Очите болят при газова светлина.

(Излекувано в различни случаи на улцерация на роговицата).

Белезникава язва в дясната роговица над зеницата; десните клепачи червени и подути; сълзене на дясното око.

Стрелкаща болка, отиваща назад в центъра на дясното око, < през нощта.

Ако лежи на лявата страна, дясното око се усеща сякаш се движи и е твърде тежко, със силна болка.

С дясното око всичко изглежда в бяла мъгла.

Фотофобия на дясното око.

Винаги се чувства уморена.

Mr. E., 28 г., хроничен иридит; през последните три години имал шест пристъпа, редуващи се в двете очи.

Първият пристъп продължил пет седмици; интервалите между пристъпите — от пет до осем месеца.

Бил му казано, че е неизлечим.

26 март, „88.

Дясното око силно възпалено; тъпа болка през нощта; стрелкане от дясното око към слепоочието и веждата; по-лошо между 3 и 5 сутринта.

Зрението много замъглено.

Ирисът изглежда червен.

Черно петно пред дясното око, движещо се с окото при слънчева светлина.

Lac felinum cm.

Постепенно и сигурно подобрене, зрението по-малко замъглено, окото изглежда ясно; усещане за пясък в дясното око при събуждане; черните петна изчезнали; може да чете печатен текст. — Berridge.

Дясното око възпалено; тъпа болка през нощта.

Стрелкане от дясното око към слепоочието и веждата, < между 3 и 5 сутринта.

Зрението много замъглено.

Ирисът — червен.

Черно петно пред дясното око, движещо се с окото при слънчева светлина.

Усещане за пясък в дясното око при събуждане.

Нос :

Не може да понася миризмата на миди, които по принцип много обича, и не може да ги яде.

Зъби :

Болки във всички зъби, когато горещата болка от главата ги достигне.

Уста :

Усещане сякаш езикът е опарен от гореща напитка.

Зачервяване под езика, по венците и в цялата устна кухина.

Болезненост и усещане за язви на езика и небцето.

Частите на устата сякаш се слепват, изисквайки впръскване на въздух или слюнка, за да се разделят.

Загуба на вкус.

Метален (меден) вкус в устата.

Слюноотделяне, езикът увеличен и наъбен по краищата от зъбите.

Малки бели язви, покриващи езика и цялата устна кухина.

Удължаване на небцето.

Много болезнена уста.

(Сухота в устата).

Гърло :

Гъста слуз във фаринкса.

Влакнеста, жилава слуз във фаринкса, не може да я изкашля и трябва да я преглъща; когато може да бъде експекторана, е жълта.

Слуз във фаринкса между главата и гърлото — гъста, жълта, жилава, влакнеста, трудно експекторана и има болнав сладникав вкус.

Задната стена на фаринкса леко възпалена, с усещане за болезненост.

Стомах :

Без апетит.

След хранене се чувства подута; трябва да свали роклята и да разхлаби дрехите.

Голямо желание да яде хартия.

Стомахът болезнен навсякъде точно под колана, < лява страна.

Понякога много леко гадене.

Топлина в епигастриума.

Голяма болезненост и чувствителност на епигастралната област.

Корем :

Болка в корема и гърба, сякаш менструацията предстои.

Болка в червата.

В полунощ — усещане за студен бинт върху долната част на корема.

Голяма тежест и притискане надолу в таза, като падане на матката, сякаш не може да ходи; < при стоене.

Болка в таза през хълбоците при натиск, както при поставяне на ръце на хълбоците.

Изпражнения и ректум :

Нормално изхождане, но много бавно преминаващо, в 2 ч. сутринта.

Изпражнението — дълго, жилаво, връща се обратно, когато спре да напъва; привидна неспособност на ректума да изхвърли съдържанието си.

Пикочни органи :

Често желание за уриниране, урината много бледа.

(Затруднение при уриниране, трябва да чака).

Женски полови органи :

Левкорейта спря на третия и се появи отново на четвъртия ден.

Бясно сърбене на вулвата, отвътре и отвън; жълта левкорей.

(Теглеща болка в левия яйчник).

Дихателни органи :

Сухота на ръба на глотиса.

Гръден кош :

Много силно затруднено дишане, продължаващо няколко дни; това е затруднение в поемането на дълбок дъх, или по-скоро изисква поемане на много дълбока инхалация, защото изглежда сякаш дишането се извършва само от горната част на белите дробове.

Горни крайници :

Болка в дясната страна на лявата китка при използване на показалеца.

Долни крайници :

Левият крак се усеща студен, когато десният го докосне.

Краката болят.

Сън :

Тъпота, сънливост, прозяване.

Тежък, дълбок сън, трудно се събужда.

Сънувала земетресения.

Треска :

Студ и топлина последователно, всеки продължаващ само кратко време.

Общи :

Цялата дясна страна — от върха на главата до стъпалото — се усеща ужасно слаба, тежка и измъчена, така че е трудно да ходи.

(Постоянно нервно треперене, особено на ръцете, както при пияници.)