

The Materia Medica

Nosodes

Henry Clay ALLEN

Copyright © Médi-T 2003

Lac vaccinum

(Краве мляко)

Описание :

Въведено и доказано от д-р J. C. Boardman, Трентън, Ню Джърси, който използвал 200-тата потенция на **Swan**. Много хора са силно непоносими към мляко — при тях то предизвиква главоболие, „жлъчност“, чревни газове и упорит запек. Тези ефекти на млякото се развили в доказването, особено характерното главоболие и запек, и са клинично потвърдени.

Добре е да се помни, че млякото развива или влошава пикочнокиселинната диатеза, увеличавайки ревматичната склонност, а жаждата и полиурията трябва да насочат вниманието ни към него като лекарство за изучаване при диабет.

При някои силно чувствителни жени ефектът върху функцията на половите органи е изразен: менструалният поток се потиска при потапяне на ръцете в студена вода; изпиването на чаша мляко незабавно потиска потока до следващия период — отбелязва се идиосинкразията.

Burnett отбелязва като клиничен факт, че деца, които пият много мляко след пълното израстване на зъбите, стават много податливи на настинки.

Както при **Natrum muriaticum**, потенцираното лекарство ще произведе характерните си симптоми, дори когато доказващият го използва в сурова форма едновременно.

Ум :

Обща нервност, с потиснатост на духа, усещане сякаш предстои да чуе лоши новини.

Психическо объркване, продължаващо дълго след доказването.

Психическа прострация, настъпила толкова внезапно, че не била способна да събере мислите си или да запише симптомите си.

Психическо объркване, не можела да изрази мислите си.

Тъпа, слаба, обърквана, с треперене на цялото тяло.

Глава :

Световъртеж: пада назад, ако затвори очи.

Пълзящо усещане или винтово, или вертикално движение, започващо над лявото око и продължаващо нагоре към върха; след това същото движение започва два инча зад лявото ухо и също се издига към върха; също натиск на върха, с усещане за топлина при допир с ръка (1 ч.).

Усещане като огнени топки в двете слепоочия едновременно (20 мин).

Всички тези симптоми изчезнали, освен болката на върха на главата, която се усеща сякаш нещо тежко е поставено там, и понякога остра болка едновременно (3½ ч.).

Събудила се сутрин с болка в цялата глава, най-силна в тилната област.

Пълнота в главата, сякаш е твърде голяма и тежка.

Световъртеж.

Очи :

Тъпа болка над дясното око и много лека тъпа болка над лявото.

Очите имат замъгляване, или притъмняване, или неяснота на зрението, ту за няколко мига, ту изчезва.

Слепота на двете очи, появила се три или четири пъти поред, траеща само секунда, след което напълно изчезва, оставяйки болка във всяко слепоочие, на върха на главата, в лявото ухо и под лявото ухо в шията (2½ ч.).

Уши :

Ушите се усещат запушени; чувствала се глуха и в двете уши, въпреки че чувала както преди.

Уста :

Мръсно жълто обложен език, усещаш се пресъхнал.

Кисел вкус.

Кисела слюнка, оцветяваща носната кърпа в жълто.

Язви на езика — плоски, бели, хлътнали; езикът подут, изключително чувствителен, покрит с бяла слузеста материя по неязвените части; дъхът — изключително зловонен; язвите се разпростират към вътрешната страна на бузите и сливиците; болезнено преглъщане.

Гърло :

Усещане за тапа в гърлото или ларинкса.

Апетит :

Жажда за студена вода в големи количества; изпила три чаши вечерта.

Стомах :

Подуване или раздуване на стомаха (3-ти ден).

В 10:30 сутринта — кисел вкус; гадене, но без повдигане или повръщане (1 ч.).

Контрактивна, притискаща болка в ямката на стомаха, > от външен натиск.

Оригвания.

Корем :

Болка, започваща от стернума, простираща се през корема около инч под пъпа.

Постоянни, нетърпими газове, започващи час след изпиване на мляко на обяд и продължаващи цял следобед.

Борборигми, с силно, шумно къркорене (200).

Изпражнения :

Упорит запек; изпражненията — твърди, сухи, на слепени топки; могат да бъдат изхвърлени само с голямо напъване.

Изпускане на зловонни газове в голямо количество, което облекчава.

Пикочни органи :

Урината не била увеличена сутрин, но била тъмночервена, без утайка.

Напълнила голяма метална лъжица с урина и я варила 20 минути; останала маса от албумин — около една четвърт от цялото; специфично тегло 1030.

Вчера урината оцветявала синята хартия в червено; днес оцветява червената хартия в синьо (13-ти ден).

Следобед била принудена да уринира на всеки 15 минути, в голямо количество всеки път; страхувала се да пресече улицата до магазина, да не би да я „настигне“ преди да се върне; всичко преминало същата нощ.

Плътноста на урината варирала няколко дни от 1,018 до 1,028, цветът — бистър, без миризма, кисела реакция.

Често отделяне на бистра урина, почти безцветна, без утайка.

Женски полови органи :

Бяла водниста левкорей; болка в сакрума.

Бяла водниста левкорей; болки в сакрума.

Изпиването на чаша мляко незабавно потиска менструалния поток до следващия период.

Менструацията потисната, забавена от потапяне на ръцете в студена вода.

„Гадене при бременност с желание за храна, > от пиене на мляко.“

Дихателни органи :

Усещане за тапа в гърлото или ларинкса.

Гръден кош :

Остра болка, появяваща се в място с размер на монета от двете страни на стернума и около средата на гърдите, с усещане за задушаване.

По-късно — парене в същата област; същата болка се простира през корема около пет инча по-надолу (около инч под пъпа); не изглежда да засяга пикочния мехур; няма къркорене или газове.

Остри болки в левия долен гръден кош, или в областта на долния лоб на левия бял дроб; болката била моментна и не се повторила (5-ти ден).

Остра болка започнала в десния гръден кош, около три инча под ключицата; преминала нагоре към върха на дясното рамо, после надолу по ръката и предмишницата към палеца, и след това изчезнала.

Гръб :

Болки в сакрума.

Силни, тъпи, болезнени болки в лумбалната област; доказващата често възкликвала: „Ох, как ме боли гърбът!“

Горни крайници :

Пръстите на двете ръце, особено при изпъване, треперят и потрепват като от крайна слабост.

Лепкава, студена, влажна хладина в двете ръце и двата крака едновременно.

Остра болка под лявата лопатка, около три инча надолу от върха; след това преминала нагоре към върха на лявото рамо, после надолу по ръката, предмишницата и ръката към четирите пръста на лявата ръка, и след това изчезнала.

Скоро след това се появила болезненост в лявата тазобедрена става, която скоро преминала.

Долни крайници :

Пронизваща или ланцинираща болка във всяка тазобедрена става, не силна.

Болка по външната страна на двата бедра, завършваща в коленете.

Болки в двете колена като ревматична болка; започнали едновременно в двете колена, но дясното било по-силно (5-ти ден).

При качване по стълби коленете треперят или са толкова слаби, че не може да направи крачка напред.

Болки в костите от двете тазобедрени стави до двата крака едновременно; също парене в двата крака.

Всички стави на тялото, особено коленете, се усещат слаби и безсилни, както когато човек е полупиян.

Кратки ревматични болки в коляното и тарзалните стави при ходене.

Сън :

Спала добре цяла нощ и се събудила без болка (8:30 сутринта).

Главата се усеща тежка, тъпа, болезнена, сънлива, иска да заспи.

Ходът е нестабилен.

Трябва да се насилва да остане будна.

Трябва да се насилва да държи очите си отворени, защото ако ги затвори, не може да избегне падането назад на пода.

След седем часа казала, че все още се чувства сънлива и би могла да заспи за минута по всяко време през целия ден.

Обща неспокойност и лоши сънища.

Сънища за опит да подреди труп и др.

Треска :

Ръцете станали горещи и сухи, ясно фебрилно затопляне на ръцете.

Също болка в лявата страна на главата, простираща се от шията към върха на главата, и студено усещане с нея.

Лека треска по цялото тяло с влажност в двете ръце и болки в краката от бедрата до коленете, и от двете страни едновременно.

Треска през нощта, последвана от обилна пот по цялото тяло; треската била предшествана от втрисане, започващо от раменете и след това преминаващо от краката към главата; главоболие.

Кожа :

Кафяви корички с мазен вид, особено в ъглите на устата, подобни на т.нар. „маслени ранички“.

Miss H. взела една доза 1m (Fincke).

Предизвикала често обилно отделяне на бистра урина, без утайка и почти безцветна.

Бяла водниста левкорей; болки в сакрума; усещане за тапа в гърлото или ларинкса; кисел вкус в устата; кисела слюнка, оцветяваща носната кърпа в жълто; контрактивна притискаща болка в ямката на стомаха, облекчена от външен натиск.

Общи :

Болките в гърдите, корема, хълбоците, бедрата и коленете се усещали отъясно и отляво едновременно.

Била толкова внезапно простирана психически и физически, че не могла да събере мислите си или да използва молив, за да запише симптомите си; затова била наблюдавана, разпитвана и записвана; след като доказването почти приключило, казала, че има толкова много психическо объркване, че не може да се проясни достатъчно, за да почувства мислите си или да ги изрази; можела да дава само кратки директни отговори; за писане на симптомите нямала физическа сила.

След два часа всички симптоми постепенно отшумели, но все още имало общо треперене или потрепване на цялото тяло, както и на пръстите.

След шест и половина часа — почти облекчена, освен голяма физическа прострация; умът отново нормален.