

The Materia Medica

Nosodes

Henry Clay ALLEN

Copyright © Médi-T 2003

Magnetis polus arcticus

(Северен полюс на магнита)

Ум и настроение :

Раздразнен и уморен.

Плачливо настроение, със студенина и склонност да чувства студ.

Тъга вечер; трябвало да плаче против волята си, след което очите му се чувствали болезнени.

Вечер усещал сякаш му е трудно да започне изпълнението на намеренията си, и минавало дълго време преди да започне; но щом започнел, изпълнявал намеренията си с голяма бързина.

Лениви фантазии; понякога чувствал сякаш няма никаква фантазия.

Когато седял, чувствал сякаш е изгубил всички сили за движение и сякаш е залепнал за стола.

Ленив ум.

Тревожно, отчаяно, неутешимо, самообвиняващо настроение.

Сънят прекъснал в три часа сутринта и той станал тревожен; започнал да се безпокои за здравето си, сякаш е опасно болен; станал мрачен; съжалявал за всяка дума, която бил принуден да изрече.

Прекомерна, свръх-скрупулозна загриженост.

Раздразнено и ядосано настроение; не обича да бъде прекъсван в работата си, и въпреки това не постига нищо.

Докато върши работата си, говори на глас със себе си.

Прави грешки лесно при писане.

Иска да работи много, но не е доволен от себе си; мисли, че върши нещата бавно.

Редува се между тъга и веселост.

Държи се сякаш е изплашен и плах (веднага).

Отчаяние.

Тревожна скрупулوزност (веднага).

Прибързан, смел, бърз, твърд.

Спокойно, уравновесено настроение, лишено от грижи.

Редуващо се веселие и тъга през целия ден.

Веселост и чувство за голяма сила, редуващи се с липса на смелост и слабост.

Сензориум :

(Световъртеж, усещане сякаш би паднала във всяка посока).

Световъртежно движение в едната страна на главата.

След изкачване на стълби усеща движение от центъра на мозъка към всяко ухо, като махало на часовник.

Усещане сякаш разбирането му е спряно, и сякаш нещо притиска мозъка надолу, а очите навън — вид припадък.

Усещане за опиянение, като бръмчене в главата.

Тъпота в главата с желание за открит въздух.

Слаба памет, но се чувства весел.

Глава :

Два дни поред се събужда от следобедната дрямка с силно главоболие, сякаш мозъкът е натъртен и притъпен; главоболието намалява след пълно събуждане и постепенно изчезва след ставане.

Главоболие, състоящо се в болезнена и натъртена болка на повърхността на мозъка, в темето и в едното слепоочие.

Главата се чувства натъртена и сякаш разбита на парчета в едното полукълбо.

Тласък в едната страна на главата сутрин в леглото.

Усещане сякаш главата е притисната надолу от товар.

Притискане сякаш от нещо твърдо в няколко части на мозъка.

(Доста топлина в главата).

Неприятно, притискащо усещане в главата, сякаш част от мозъка е притисната навътре.

Главата е разтърсвана от звука на чук.

Главоболие, особено при повдигане или движение на очите.

Опъващо усещане в мозъка зад челото, простиращо се надолу към корена на носа.

Бодежи в горната част на челото сутрин след ставане, до следобед.

Главоболие, сякаш слепоочията са раздалечени.

Силно главоболие през целия следобед, сякаш мозъкът е разкъсан.

Прилив на кръв към главата и зачервяване на бузите.

Дърпащо-пробивна болка в дясното слепоочие, придружена от спазматична болка под дясната ябълчна кост.

Притискане в дясното слепоочие при ходене на открит въздух, причиняващо тъпота в главата.

Болезнена болка над лявата слепоочна област, външно.

Разкъсване в главата зад дясното ухо, с усещане като тласък, постепенно преместващо се към предната част на главата при ходене на открит въздух.

Тласкащо разкъсване в главата зад лявото ухо при седене.

Опъване на скалпа, сякаш здраво прилепнал към черепа, причиняващо тъпота в главата (няколко часа).

Притискане в ставата на кондилите на тилната кост с атласа отвътре навън, принуждаващо го да държи главата постоянно наведена напред.

Болезнена болка в лявата част на челото.

Болезнена болка във външните части над дясната вежда.

Туберкули по окосмената част на главата, болезнени при допир.

Парещ сърбеж на окосмената част на главата.

Очи :

Студено движение, като студен дъх, в очите.

Очите изпъкват.

Втренчен поглед.

Фини жиления в лявото око.

Парещ, непрекъснат бодеж в горния клепач.

Мехурче на ръба на горния клепач, притискащо окото.

Болезнена чувствителност на клепачите при четене.

Сърбеж във вътрешния ъгъл и по ръба на клепачите.

Болезнено усещане за сухота в клепачите сутрин при събуждане.

Потрепване и дърпане в клепачите.

Дърпане в клепачите със сълзене.

Жилене в клепачите.

Слепване на клепачите сутрин.

Сълзене рано сутрин.

Прекомерно сълзене; светлината на слънцето е непоносима.

Разширение на зениците; те се свиват много малко на светлина (веднага).

Свиване на зениците през първите часове.

Жилене във вътрешния ъгъл и лявата буза.

Усещане като пясък в окото.

Сърбеж в окото.

Парене в слабото дясно око; то станало червено и се напълнило с вода (магнитът държан в контакт със слабото дясно око четвърт час).

Студенина в слабото око за три или четири минути (магнитът държан в контакт с окото две минути).

Студенина в слабото око, сякаш окото е парче лед; когато студът преминал, се появило продължително жилене в окото.

Жилещо усещане в окото, наподобяващо тиктакането на часовник.

Неспокойно движение на окото, с натрупване на много вода в двете очи.

Усещане като паяжина пред очите.

Блясък в окото като падаща звезда.

Мравучкане между двете очи.

Силно дърпане над окото, по повърхността на бузата, ухото, простиращо се в горната челюст (магнитът в контакт с окото).

Уши :

Бодеж, стрелкащ от Евсталиевата тръба към вътрешността на ухото (при навеждане).

Фино звънене в противоположното ухо (веднага).

Няколко разкъсвания във вътрешността на дясното ухо, наподобяващи оталгия.

Свиствене и дърпащо усещане в ухото.

Стегнатост на тъпанчето.

Пукане в ухото като от горящо сухо дърво (при държане на магнита в ухото).

Топлина и шум в ухото, като когато вода кипи и бълбука (магнитът държан в ухото).

Звънене в ухото от същата страна.

Топлина и „клъвкащо“ усещане в ухото (магнитът държан в ухото).

Вид глухота, сякаш тънка ципа е опъната над дясното ухо, след което се усеща топлина в ухото.

Нос :

Илюзия на обонянieto: представя си, че стоят мирише на прясна вар и прах; представя си, че стоят мирише на развалени яйца или на съдържанието на тоалетна.

Силно кръвотечение от носа три последователни следобеда, увеличаващо се всеки следобед, предшествано от болезнена болка в челото.

Болезнена болка в ноздрите, дори без докосване или движение.

Зачервяване и топлина на върха на носа, последвани от горещи, червени, ограничени петна по бузите.

Пъпки на дясното крило на носа, със жилещо-сърбящо усещане.

Лице :

Изключително болезнена стегнатост в лицето, простираща се чак до сливиците.

Дърпане в лявата буза.

Безброй жиления в бузата, с усещане за топлина, без да се забелязва топлина отвън.

Зачервяване на бузите, с прилив на кръв към главата.

Туберкул в лицето, близо до носа, болезнен при допир; когато не се докосва, се усещат редки, бавни боджежи в него.

Челюсти и зъби :

Крамповидно-болезнена болка в лявата субмаксиларна жлеза.

Смачкаваща-болезнена или щипеща болка в субмаксиларните жлези, без да са докосвани или движени, както се усеща при остро подуване на гърлото.

Разкъсваща болка в цервикалните мускули, сякаш са твърде уморени.

Болезнен крамп в цервикалните мускули, от едното ухо до другото.

Дърпане в лявата челюст и лявата буза.

Опъваща болка в лявата горна челюст рано сутрин при събуждане.

Болезнено дърпане в ставата на долната челюст при движение, сякаш ще бъде изкълчена насила.

Дърпащо-болезнена болка, идваща от слепоочието, под мастоидния израстък, между мускула **sternocleidomastoideus** и ramus на долната челюст.

Опъваща болка в лявата субмаксиларна жлеза.

Крамповидна зъбобол в дясната долна челюст.

Зъбобол, сякаш зъбът ще бъде изтръгнат, по-лош след хранене и при седене или лежане, подобрява се при ходене.

Зъбобол в посока към окото, много бърза поредица от „клъвкания“ в кухия зъб, с подути възпалени венци и червена, горяща буза; зъбоболът се увеличава веднага след хранене, подобрява се при ходене на открит въздух, но < в задимена стая.

Пулсиране в кухия зъб (веднага), последвано от притискане в зъба, сякаш нещо е влязло в него, с дърпане в слепоочията.

Пулсиране в зъба, с парене във венците и подути, червени, горещи бузи, с пареща болка и затопляне в бузите следобед.

Зъбоболът спира при ходене на открит въздух и се връща в стаята.

Болезненост в кухите зъби, със подуване на едната страна на лицето.

Зъбобол с тласъци през периоста на челюстта, болката е стрелкащо-болезнена, разкопаващо-разкъсваща или парещо-жилеща.

Зъбоболът е по-лош след хранене и в топла стая.

Изтръпване и нечувствителност на венците на болезнения зъб.

Дърпаща болка в кухия зъб и предните зъби, увеличаваща се от всичко топло; с зачервяване на бузата по време на болката.

Подуване на венците на кух зъб, болезнени при докосване с езика.

Зъбобол, сякаш венците са болезнени или разрязани, увеличаващ се от въздуха, влизащ в устата.

Уста :

Болезнена болка в левия ъгъл на устата при движение, сякаш ще се образува язва.

Бавни, изключително остри и болезнени жилава в долната устна.

Малки пъпки по вътрешната повърхност на горната устна.

Сърбеж в предната част на езика, принуждаващ човек да търка и чеше.

Натрупване на слюнка в устата (веднага).

Болка в левите горни резци, сякаш нещо твърдо ги притиска и чупи.

Болка в резците при вдишване на въздух.

Зъбобол при хранене, зъбите се чувстват разхлабени и сякаш ще се прегънат.

Болезнено бръмчене в кухите зъби на долната челюст, по-лошо отдысно; зъбоболът спира по време на хранене.

Апетит и вкус :

Продължителна гранясала киселина (heart-burn).

Не му е вкусна дори най-приятната храна на вечеря.

При пушене усеща стържещо усещане в гърлото, сякаш има киселини или е имал киселини.

Кисел вкус сутрин, сякаш човек е гладувал.

При пушене има горчив вкус в задната част на езика.

Тютюнът му е неприятен.

Тя се чувствала толкова препълнена на вечеря, че не могла да яде.

Алчен апетит на вечеря.

Шоколадът имал плосък, неприятен вкус, сякаш е добавена нечиста вода.

Храната му е вкусна на вечеря, но скоро след това има плосък вкус в устата и усеща топлина в ушните лобчета.

Стомах :

Оригване с вид болезнен тласък.

Чести оригвания само на въздух.

Магнитът изглежда благоприятства киселинността на стомаха.

Езикът е силно обложен и покрит със слюз; отвращение към мляко.

Стомахът се чувства сякаш е разстроен; храната тежи в стомаха.

Внезапно стискане в ямката на стомаха.

Пулсиране в ямката на стомаха (веднага).

Усещане в епигастриума и стомаха, сякаш стените на стомаха са чувствителни към болка.

Дърпане в ямката на стомаха, простиращо се в дясната част на гърдите.

Корем :

Събужда се през нощта от притискане в корема, сякаш от камък.

Дърпаща болка в корема.

Топлина в областта на пъпа, причиняваща тревога; последвана от усещане сякаш ще започне повръщане.

Студенина в корема (веднага след докосване на магнита).

Тласъци и удари, идващи от корема и простиращи се през гърдите към гърлото (веднага).

Няколко тласъка в корема, като вид къркорене, сякаш нещо пада в корема на интервали (веднага).

Няколко боджежи в страната на корема и движение в корема, сякаш ще започне диария.

Спазматично свиващо усещане в хипогастриума, външно и вътрешно, рано сутрин.

Щипане, особено в епигастриума, веднага след вечеря.

Силно, непрекъснато щипане, сякаш от задържани газове, на малко място в лявата страна на корема.

Газова колика веднага след вечеря; остро притискане във всяка част на корема отвътре навън, сякаш коремът ще се пръсне; облекчава се при абсолютно неподвижно седене.

Газова колика рано сутрин, веднага след събуждане; газовете се изтласкват нагоре към хипохондриума, с опъващи болки в целия корем, причиняващи силно притискане тук и там, придружено от гадене, идващо от корема, усещано както при движение, така и в покой.

Непрекъсната болезнено-щипеща болка в целия хипогастриум, като вид колика, но без видими газове; не изчезва нито при движение, нито при покой, нито при хранене и пиене, но се увеличава силно при размишление и умствено напрежение, и тогава е придружена от гадене; коликата намалява малко при строг покой, но изчезва напълно за един час при докосване на цинк.

Вечер и сутрин усеща притискане сякаш от газове в различни части на червата, наподобяващо притискане на натъртено място, придружено от подобно притискане в различни части на мозъка; и главоболието, и коликата изчезват веднага след отделяне на газове; главоболието и коликата се връщат с връщането на газовете, което го прави раздразнен; газовете имат зловонна миризма.

(Южният полюс премахнал болезненото неспокойство в корема и главоболието в рамките на един час.)

Събужда се през нощта със силна колика; тя е вид непрекъснато, непоносимо силно притискане в ямката на стомаха и хипохондриума, издигащо се към гърдите и усилващо се до ямката на гърлото, където дишането заплашва да се спре (това състояние скоро се облекчило чрез поставяне на ръцете върху гърдите със силна воля — вид само-месмеризъм); спазмът намалял, и покой и сън били възстановени чрез силно, но лесно отделяне на газове.

Къркорене в корема, сякаш голямо количество газове е задържано, причиняващо извиващо усещане, което се издига към ямката на стомаха и причинява оригвания.

Силни режещи бодежи при ходене на открит въздух, в средата на хипогастриума, отдолу нагоре.

Бодежи в дясната лумбална област.

Бодежи в лявата слабина отвътре навън, в областта на горния спинозен израстък на илиума (веднага).

Режеща болка в лявата слабина, в областта на коремния пръстен, с усещане за слабост в тази област.

Отпуснато състояние на коремния пръстен, увеличаващо се ден след ден; херния заплашва да излезе, особено при кашляне.

Болезнена болка в коремния пръстен при ходене.

Пробивна болка над левия коремен пръстен отвътре навън, сякаш херния ще излезе.

Ингинална херния.

Изпражнения :

Дърпаща, почти дизентерична болка в хипогастриума рано сутрин, последвана от трудно изхвърляне на много гъсти фекалии.

Кръв излиза с изпражненията два пъти дневно.

Остро притискане в ректума.

Жилещо-щипещо усещане в ректума.

Болезнено-притискаща болка в ректума (не в ануса) след полунощ, по време на дрямка, продължаваща часове и изчезваща след пълно събуждане.

Пикочни органи :

Тъмна урина.

Секрецията на урина намалява през първите часове, но се увеличава след изтичане на двадесет и четири часа.

Обилни отделяния на урина.

(Отпуснато състояние на шийката на пикочния мехур от един часа на обяд до осем часа вечерта; урината капе неволно.)

Полови органи :

Непрекъсната пареща болка в рафето на препуциума след уриниране.

Сърбящо парене на вътрешната повърхност на препуциума, принуждаващо човек да се чеше нощем в леглото.

Остри бодежи в левия тестис при кръстосване на бедрата.

Нощна неволна емисия.

Прекомерна ерекция, с прекомерно желание за прегръдка и семенна емисия.

Отпускане на пениса и намалено желание за прегръдка.

Стягаща болка в десния тестис.

Остро дърпане и рязане в тестиса.

Менструацията, която е трябвало да се появи веднага, се появила след двадесет часа, увеличила се в рамките на двадесет и четири часа над обичайното количество, което било по-малко от необходимото, докато количеството станало нормално, без вторични симптоми (лечебен ефект).

Дихателни органи :

Суха кашлица, причиняваща болезнена суровост в гърдите, особено през нощта след затопляне в леглото, след като преди това е бил простуден.

Мъчителна и спазматична кашлица при заспиване, пречеща на съня.

Задушаваща, спазматична кашлица около полунощ.

Желанието за кашляне е разположено в най-фините и най-отдалечени бронхиални разклонения, където нищо не може да бъде отделено чрез кашлица; слюзта, която се изхвърля, се секретира в по-горна област; гъделичкането остава същото, тъй като е разположено по-надолу; затова кашлицата е много уморителна и мъчителна; дори главата се разтърсва, и цялото тяло се затопля, след което настъпва общо изпотяване до сутринта, когато кашлицата намалява.

Непрестанно (не гъделичкащо) дразнене, предизвикващо кашлица вечер в леглото веднага след лягане, кашлицата е кратка и суха; дразненето не се намалява моментално от кашлицата, както при други видове кашлица; това непрестанно дразнене може да бъде премахнато само чрез потискане на кашлицата, дори чрез твърда, решителна воля.

Бил принуден да диша спазматично с дълбоки и прекъсващи вдишвания, сякаш дишането му се спира; едновременно усещал желание да вдиша колкото се може повече въздух и бил покрит с пот по цялото тяло.

Моментни силни пристъпи на кашлица; три или четири.

При ходене на открит въздух кашлицата става много по-лоша и придобива задушаващ характер.

Гръден кош :

Внезапно притискане на гърдите, с тревога.

Сърбеж на зърната.

Няколко силни удари на сърцето.

Парежи или остри бодежи в областта на сърцето.

Парежи бодежи, първо в областта на гръдните мускули, после в страната на гърдите, и накрая в предната част на дясната гръдна половина.

Притискане в областта на сърцето (веднага).

Остри бодежи в левите мускули на гърдите при движение на ръката.

Бодежи в лявата страна на гърдите.

Крамповидна свиваща болка през гърдите, причиняваща треперливо, тревожно дишане, особено вдишванията, при навеждане напред върху ръцете и гледане през прозореца.

Тревога и гадене в областта на гърдите.

При ходене на открит въздух си въобразява, че топлина навлиза в гърдите и преминава през фаринкса.

При ходене на открит въздух усеща жилене в лявата страна на гърдите.

Непрекъснат бодеж в лявата страна на гърдите вечер.

Гръб :

Пукане или прашене в шийните прешлени, особено в атласа, по време на движение.

Болка като натъртена в средата на гръбнака при извиване назад.

Къркорене и пълзящо усещане между лопатките.

Потрепване в задните лумбални мускули.

Болка като натъртена в лявата раменна става както при движение, така и в покой, безболезнена при допир.

Горни крайници :

Треперене на ръката, чиято длан е докосната от магнита.

Крамповидно усещане в ръката, сякаш е „заспала“.

Лявата ръка е много по-тежка от дясната.

Горната част на ръката, която не е докосната от магнита, е много тежка.

Сърбеж над лакътя, състоящ се от фино жилене и парене, не намалява при чесане, сякаш комар го е ухапал там; чесането причинява парене.

Потрепване в засегнатата горна част на ръката (ръката и кракът му се стрували мъртви).

Усещане за скованост в лакътната става.

Чуваемо пукане в лакътната става при движение (веднага).

Приятно усещане в ставата на ръката, сякаш тя почива след голяма умора.

Тежест в горните крайници, сякаш вените съдържат олово (веднага).

Усещане за тежест в ръката, която докосва магнита.

Силна студенина в ръката, над която е бил движен магнитът (при жена в магнитен сън, след докосване със северния полюс).

Жилеща болка в ръката чак до рамото, особено в дългите кости на предмишницата.

Болезнена болка в дясното рамо при ходене на открит въздух.

Усещане в ръката и дланта сякаш са „заспали“ (веднага).

Бодежи в предмишницата близо до китковата става.

Притискане в левия радиус вечер, сякаш след удар.

Притискане и дърпане в китковата става, с неспокойство в предмишницата, принуждаващо го да сгъва ръката непрекъснато.

Скованост и ригидност в десните тарзални и карпални стави през нощта в леглото.

Треперене на ръката, която докосва магнита, и на стъпалото от противоположната страна.

Болезнен и почти парещ сърбеж на гърба на средната фаланга на малкия пръст, сякаш мястото е било измръзнало; мястото е болезнено при допир.

Фини, чести жиления в засегнатото място и върха на всеки пръст; най-лошо вечер след лягане.

Дърпане в пръстите отдолу нагоре, с пълзене в пръстите веднага; след това се чувствал малко отчаян.

Болка в ставите на пръстите, сякаш са били разтегнати при прегъване.

Бръмчене в пръста, който е в контакт с магнита.

Потрепвания в пръста, който е в контакт с магнита, след това простиращи се в ръката, с вид тежест в ръката.

Бодежи в мускулите на дланта на лявата ръка при ходене на открит въздух.

Пръстите „заспиват“.

Пълзене във върха на левия показалец.

Потрепване в палеца, който е докоснат от магнита, сякаш има пулсации в палеца.

Долни крайници :

Натъртена болка в тазобедрените стави, < при допир.

Разкъсване, с притискане и усещане за стягане в някои части на мускулите на бедрото при ходене или седене.

Разкъсване с притискане в външната страна на коляното надолу до външния глезен.

Болезнено усещане в кожата на прасеца при ходене.

Парещи пулсиращи бодежи в прасеца.

Голяма отпадналост на долните крайници.

Левият крак „заспива“ след седене, при ставане, и особено при стоене.

Умора и изтръпване на долните крайници, сякаш са „заспали“, без мравучкане.

Прекомерна слабост на долните крайници при ходене, сякаш ще се счупят.

Дърпане в двете колена и в десния долен крайник.

Бодежи в предните мускули на дясното бедро, отгоре надолу.

Възбуждащ сърбеж на лявото бедро, по предната и вътрешната повърхност, но повече по предната.

Бодежи в сухожилията на лявото бедро, към сгъвката на коляното.

Ригидно опъване в задколянните мускули при ставане от седнало положение, сякаш са твърде къси.

Безболезнено бръмчене в левия крак, с усещане за тежест, сякаш кракът е „заспал“.

Болка в горната част на пръстите, сякаш са станали болезнени от ходене.

Болезнено притискане в мазолите, които преди това били безболезнени, при леко натискане на стъпалата.

Болезнена болка в петата.

Периодична болка в петата, като притискане.

Силно притискане около глезена на язвения крак.

Внезапни ланциниращи болки в петите, големия пръст и прасеца при седене.

Болезнено пълзене в пръстите на десния крак.

Възбуждащ сърбеж под пръстите на левия крак.

Сън :

Прекомерно спазматично прозяване с болка в ставата на лявата челюст, сякаш е на път да бъде изкълчена.

Sopor: няколко пъти бил нападат от внезапно усещане, сякаш трябва да затвори очите си и сякаш ще изпадне в приятен сън; непреодолимо усещане, което заплашвало внезапно да го лиши от съзнание.

Вечер изпаднал в дълбок сън; всички крайници се чувствали парализирани или натъртени.

Постоянна сънливост през деня.

Дълбок сън към сутринта.

Спал по гръб през нощта.

Тя пее вечер по време на сън, събужда се от пеенето си, спомня си, че не трябва да пее, заспива отново, пее втори път и пак се събужда от пеенето си.

Ярки, но невинни и безстрастни сънища за събития; не може да ги запомни при събуждане.

Похотливи сънища през цялата нощ.

Около полунощ сънува, че пада от височина; това я стряска и причинява треперене на цялото тяло.

Около полунощ сънува убийство, което я кара да плаче и да вика.

Видяла човек насън, а на следващия ден видяла този човек в действителност за първи път.

Има ярки сънища през цялата нощ за предмети, които не са неприятни, но нямат връзка помежду си; при събуждане не може да си спомни нито един.

Не може да заспи два часа през нощта.

В два часа сутринта е наполовина буден, вътрешното му съзнание е много силно, паметта му е много ярка и умът му е изпълнен с идеи; съставя в най-добър стил на чужд език, който нито говори, нито пише свободно, сякаш е в магнитен сън; но при събуждане не може ясно да си спомни какво е мислил.

Внезапно се събужда вечер след заспиване, със силен тласък в мускулите на главата и шията, сякаш главата е била избутана назад.

Събужда се около полунощ от силно притискане през корема, точно над пъпа, оставащо непроменено при движение, покой или смяна на положението.

Силна болка във фаринкса вечер в леглото, както когато човек е преглътнал твърде голям залък; болката преминала при обръщане на лявата страна.

Мята се в леглото през нощта, наполовина буден.

Събужда се през нощта с много неприятна топлина на цялото тяло и трябва да се открива от време на време, устата му е суха, без жажда.

Неспокоен сън; мята се и леглото му се струва твърде топло.

Топлина през нощта, сякаш ще избие пот.

Много парна нощна пот, без топлина.

Събужда се през нощта, чувствайки се много топъл; чувства се още по-топъл след изпиване на чаша студена вода.

Чести тръпки през нощта в леглото и тласъци в ръцете, причиняващи подскачане.

Често събуждане сякаш от уплаха.

Често се събужда през нощта с пареща топлина на цялото тяло и понякога е принуден да се открива.

Треска :

Студенина със прозяване рано сутрин.

(Студенина през целия ден, по цялото тяло, но особено по гърба.)

Усещане за студенина или хлад по цялото тяло, сякаш е облечена твърде леко или сякаш е настинала, без тръпки; веднага след това имала малко разхлабено изхождане, последвано от притискане.

Треперене по цялото тяло в момента, когато северният полюс бил докоснат с върха на езика.

Усещане за студенина във върха на пръста, който е бил в контакт с магнита, придружено с капки пот по пръстите на тази ръка и по гърба на ръката (веднага).

Пот в дланите, ръцете са хладни.

Хладна пот по цялото тяло.

Към сутринта е покрит с силно, но не неприятно миришеща, парна, лека пот.

Пот около два часа сутринта, по цялото тяло, дори по лицето, най-много по гърдите, с изключение на косата на главата и онези части на окосмената част, върху които е лежал; само по време на сън; потта изчезва напълно при събуждане и не е придружена от жажда.

Топлина в лицето.

Вечер кръвта нахлува в главата и лицето се чувства горещо, придружено от студенина в долните крайници, особено стъпалата.

Топлина в едната буза, придружена от усещане за вътрешна топлина, раздразнителност и разговорливост.

Усещане за топлина в стъпалата.

Усещане за топлина по цялото тяло, с бърз и силен пулс, без външна топлина; дори ръцете са студени, въпреки че му се струват горещи, без жажда.

Огнена зачервеност на лицето, притискане, по-силен пулс.

Топлина по цялото тяло вечер, с тревога, която го кара да се движи насам-натам.

Топлина, особено по гърба и по цялото тяло, с тревожен, неспокоен вид.

(Треска: студенина в кръста, по гърба, от обяд до вечер, без видима студенина и с голяма жажда; в девет вечерта има много топлина в лицето, без жажда; след полунощ тя е покрита с обилна зловонна пот, продължаваща до сутринта и изчезваща при ходене.)

Треска: чести приливи на топлина следобед, само в главата, с червено, горещо лице (за две или три минути); придружено от дърпане в главата.

Треска: в три часа следобед се появява малко парещо място на стъпалото за една минута, изчезва внезапно и е последвано от внезапна топлина в главата, с зачервяване на бузите и пот по лицето за няколко минути.

Треска: чести тръпки в гърба, продължаващи няколко минути, последвани от също толкова кратка топлина, разпространяваща се от гърба към главата, вените на ръцете се изпълват, без пот.

Прилив на влажна топлина по цялото тяло (веднага).

Кожа :

Бодеж в стеатома.

Пълзене по кожата.

Пареща болка в съществуващия херпес.

Пълзящ сърбеж, като от муха или бълха, завършващ с усещане за болезненост, първо от вътрешната, после от външната страна на крайниците, вечер в леглото и сутрин след събуждане.

Общи симптоми :

Непрекъснати разкопавачи бодежи в различни части, ставащи по-остри и болезнени, колкото по-дълбоко проникват в плътта.

Стрелкащи тласъци в частта, докосната от магнита (веднага).

Треперливо, вибриращо, изтръпващо усещане.

Усещане сякаш кръвта нахлува в мястото, докоснато от магнита, сякаш кръвта ще излезе там.

Потрепване в съседните части.

Потрепване и биене близо до частта, докосната от магнита.

Опъващо усещане в съседните части.

Натъртена болка в съседните части, сякаш човек е носил тежък товар.

Пълзене в съседните части, сякаш ще „заспят“.

Треперливост по цялото тяло, особено в стъпалата.

Тремор в частта, докосната от магнита (веднага).

Нервност с треперене, неспокойство в крайниците, голямо подуване на корема, тревога, загриженост и голяма нервна слабост.

Усещане за студенина в частта, която е била докосната от магнита.

Топло усещане в съседните части.

Дърпане в периоста на всички кости, както се усеща в началото на интермитентна треска (но без студенина или топлина).

В дясната страна на езика, в шията и през стъпалото усеща внезапно дърпане или движение напред-назад, и тласъци, наподобяващи бодежи.

Тежест в отделни крайници (с усещане сякаш силата им е увеличена).

Усещане за сухота и стегнатост в тялото, с липса на сила.

Много отпаднал, трябвало да си почива при ходене на открит въздух, и бил меланхоличен и отчаян.

Отпадналостта, натъртеното и болезнено усещане в крайниците били по-лоши на открит въздух.

Сутрин имало обща отпадналост с пот като от тревога; липса на апетит на вечеря; трябвало да легне; след това диария.

Сутрин тя се чувствала толкова отпаднала, че едва можела да се влачи, сякаш е потисната от задушна атмосфера.