

The Materia Medica

Nosodes

Henry Clay ALLEN

Copyright © Médi-T 2003

Magnetis polus australis

(Южен полюс на магнита)

Ум и настроение :

След ходене на открит въздух се чувства свадлив и раздразнителен.

След вечерна дрямка се чувства изключително раздразнителен и зле настроен.

Склонен е да подскача, когато бъде докоснат.

Липса на веселост; унил е, сякаш е сам, или сякаш е преживял някакво тъжно събитие, в продължение на три часа.

Плач веднага.

Отчаяние (първите часове).

Голямо обезкуражаване, недоволство от себе си.

Липса на желание за работа и раздразнено настроение.

Мълчалив, не е склонен да говори.

Иска да бъде сам, компанията му е неприятна.

Весели лица са му неприятни.

Силен гняв, предизвикан от малка причина; става треперлив и прибързан, и използва груб език.

Див, буен, груб, както в езика, така и в действията (сам не го забелязва); твърди нещата с насилие, ругае другите, с изкривено лице.

Усещане за топлина, постепенно увеличаваща се до горещина (при жена в магнитен сън, след докосване на южния полюс на магнита).

Голяма бързина на фантазията.

Сензориум :

Неустойчивост на ума; не може да фиксира мислите си; нещата сякаш трепкат пред сетивата му; мненията и решенията му са колебливи, което причинява вид тревожно и неспокойно състояние на ума.

Това умствено разстройство се премахва чрез докосване на металния цинк.

Световъртеж, сякаш е опиянен, сякаш е принуден да залита; известен световъртеж дори при седене.

Глава :

Прилив на кръв към главата, без топлина.

Тежест в главата, с вид пълзене или фино разкопаване в главата.

Фино пълзене в мозъка, като от множество насекоми, придружено от тежест в главата.

Пълзене във върха на главата, сякаш нещо тича там, и вид разкъсване.

Тласъци в двете слепоочия.

Болка в дясната страна на челото, съставена от разкъсване и биене.

Няколко биения над челото, придружени от разкъсваща болка.

Разкъсване на малко място в лявото слепоочие.

Дърпащо-разкъсваща болка в лявата част на мозъка, наподобяваща бавен, парещ бодеж.

Притискане в тилната област, на редуващи се места.

Главоболие, притискане на върха на главата или в едното слепоочие, силна, интензивна болка, както при катар, по-силна при изправено седене, още по-силна при разклащане на главата или при размишление, намалява при ходене и почти изчезва при навеждане на главата напред или назад (първите часове).

Главоболие в тилната област, най-силно в стоята, но изчезващо на открит въздух (първите часове).

Пълзене, смесено с жилене, в предната и средната част на челото, вечер.

Остра, заострена, болезнена болка в лявата страна на главата, с притискане отвътре навън; непрекъснат бодеж, придружен с притискане (облекчава се от северния полюс).

Проста и опъваща болка над целия мозък, започваща при ходене на открит въздух и бързо преминаваща в стаята.

Пулсиращо биене в дясната страна на главата при лягане.

Потрепвания в главата.

Спазматично свиващо главоболие в областта между веждите.

Определено място в окосмената част на главата е болезнено, сякаш е натъртено, още повече при допир.

Жлезист туберкул в тила внезапно се възпалява, кожата наоколо е болезнена, сякаш е рана, и най-лекият допир е неприятен.

Кожата на челото се чувства сякаш е изсъхнала и прилепнала към черепа.

Лице :

Усещане в лицето (и в останалата част на тялото), сякаш студен въздух духа върху него.

Тъпи бодежи в бузата.

Очи :

Бавен, парещ бодеж в ръба на клепача.

Воднисти очи от време на време.

Ерозивна болка сутрин и вечер, особено във външния ъгъл, и при докосване на клепачите, сякаш косъм е попаднал в окото — вид възпаление на ръба на клепачите.

Болезнена, пареща сухота на клепачите, особено забележима при движение, най-вече вечер и сутрин.

Подуване на мейбомиевите жлези на долния клепач сутрин, сякаш ще се образува ечемик, но болката е само болезнено-натискаща.

Парене във вътрешния ъгъл (сутрин).

Притискане и тъпо бодене в лявото око.

Спазматично свиване на едното око сутрин.

Кожата около очите е болезнена.

Когато държи магнита към окото, усеща лека студенина в окото за кратко време, но силен сърбеж в клепачите.

Очите се чувстват слепени сутрин.

Биене и сърбеж в окото.

Недостатъчно зрение: предметите изглеждат замъглени, също двойни, при докосване на тила.

Лека замаяност с желание да седне; предметите изглеждат забулени; след това стават много по-ясни и много по-ярки от преди, придружено от екстатично настроение.

В началото разширяването на зениците е по-лесно, а свиването им — по-трудно.

Уши :

Почти безболезнено дърпане зад ухото отдолу нагоре, простиращо се в главата, почти непрекъснато.

Разкъсващи болки в хрущялите на външното и вътрешното ухо, простиращи се почти до вътрешните кухини.

Шум в ушите, който усеща повече в горната част на главата.

Шум в ушите като движение на крило.

Усещане като свистене на вятър в ушите рано сутрин; усеща го чак до челото.

Възпаление на външното ухо, браздите на тази част придобиват вид на болезнени rhagades.

Понякога бодежи и звънене в ухото.

Болезнен тласък в ухото, сякаш частите му ще бъдат притиснати и разделени; вид оталгия.

Усещане сякаш студен вятър духа върху ушите.

Усещане сякаш топъл дъх духа върху външното ухо.

Две болезнени мехурчета от дясната страна на шията под ухото.

Челюсти и зъби :

Болка в субмаксиларната жлеза, сякаш е подута.

Кожата под брадичката е болезнена, сякаш е рана.

Зъбобол, < от топла напитка.

Разкъсващо потрепване в горната челюст към окото вечер.

Тъпа болка с изключително болезнени бодежи в кухи зъби.

Уста :

Единични бодежи в левия ръб на езика.

Усещане за подуване в езика и топлина в органите на речта.

Гърло :

Болезнено усещане в гърлото по време и между актовете на преглъщане.

Гнил мирис от гърлото рано сутрин (устата е чиста), неусетен от самия него.

Парене във фаринкса, вид стягане отдолу нагоре, с усещане за топлина.

Топлина в органите на речта, с трудност при говорене; усещане сякаш езикът е подут.

Натрупване на голямо количество водниста слюнка, изтичаща от устата при навеждане.

Апетит и вкус :

Лек апетит, без отвращение или ненормален вкус, общото здраве е добро.

Безразличие към ядене, пиене или пушене; храната му е вкусна, но няма желание за нея и се насища преди да започне да яде.

Безразличие към мляко, граничещо с отвращение, рано сутрин.

Храната и кафето имат горчив вкус.

Храната няма лош, но твърде слаб вкус.

Металически вкус, частично сладникав, частично кисел, ту в горната, ту в долната част на езика, с усещане за студенина, както от селитра.

Губи вкуса си, докато яде топла храна; вкусът се връща след хранене.

Бялото вино има парлив вкус; след глътка изпитва силно отвращение към него.

Вълчи глад, наред трескавата студенина.

Вълчи глад на обяд и вечер.

Липса на глад, веднага.

Гадене и повръщане :

Склонност към повръщане рано сутрин след събуждане.

Склонност към повръщане малко след вечеря.

Пристъпи на гадене при навеждане напред, привидно в стомаха.

Оригвания само на въздух.

Отделяне на газове след вечеря.

Стомах :

Болка в стомаха, както когато човек притиска натъртено място; след хранене тази болка постепенно преминава в червата.

Вид силна болезнена болка в ямката на стомаха, причинена от продължително умствено напрежение.

Корем :

Вид стискане, точно над пъпа.

Силно къркорене в корема.

Газова колика рано сутрин в леглото.

Щипане в корема, предизвикано от течение.

Газовете се изтласкват нагоре под късите ребра; газова колика в хипохондриума вечер.

Колика след вечеря: остро притискане тук и там в червата; при движение коликата става непоносима и преминава внезапно в покой без отделяне на газове.

Газова колика през нощта; части от газовете сякаш прескачат от място на място, което е болезнено и причинява неприятно къркорене или болезнено щипещо притискане отвътре навън на много места, лишаващо го от сън; кратки газове излизат понякога с болка, но не носят облекчение.

Газова колика рано сутрин след ставане; газовете се изтласкват към диафрагмата, причинявайки силно болезнени тъпи бодежи.

Дърпаща болка в дясната страна на корема, едва позволяваща му да ходи.

Разкъсваща колика, причинена от (четене?) и ходене, и успокоявана от седене, особено в епигастриума (рано сутрин).

Подуване на корема вечер непосредствено преди лягане, с коликоподобни болки.

Усещане за препълване в корема, докато е засегнат от задух.

Отделяне на голямо количество газове.

Няколко бодежи в лявата страна на корема.

Непрекъснат бодеж в корема към цекума, който не преминава, докато човек не се обърне на противоположната страна.

Усещане сякаш левият коремен пръстен е разширен и сякаш херния излиза; всяко покашляне причинява болезнено разширяване на пръстена.

Изпражнения :

Често желание за изхождане, причиняващо гадене; но тя не може да постигне нищо.

Внезапно желание за изхождане, което въпреки това се изхвърля трудно.

Режеща болка в корема със студенина, последвана от диария.

Неволно отделяне на течни изпражнения.

Постоянно свиване и стягане на ректума и ануса, позволяващо едва минимално отделяне на газове.

Твърдият изпражнения е смесен с нишковидна слуз.

Сърбеж на хемороидален тумор на ануса.

Сърбящо пълзене на ануса при ходене.

Няколко дълги бодежи в областта на десния бъбрек (веднага).

Пикочни органи :

Бодеж в гънката близо до половите органи.

Болезнено притискане в гънката близо до половите органи.

Отпускане на сфинктера на пикочния мехур (веднага).

Инконтиненция на урината.

Пареща болка в предната част на уретрата по време на уриниране, сякаш урината е кисела или парлива.

Мъжки полови органи :

Дърпане в семенната връв рано сутрин, когато тестисът виси надолу, сякаш е издърпан или разтегнат; тестисът е болезнен при допир.

Потрепване в семенната връв.

Бавно, фино, болезнено дърпане в семенната връв.

Разкъсване в семенната връв.

Спазматично придърпване на тестисите нагоре през нощта.

Разкъсващи, стягащи тласъци в тестисите; те се подуват.

Фин сърбеж в скротума.

Болка в пениса, сякаш няколко месести влакна са разкъсани или издърпани назад.

Червено петно, като пъпка, на короната на гланса и на вътрешната повърхност на препуциума, без усещане.

Глансът е червен и възпален, със сърбеж и опъване.

Кръв капе от сикотичната кондилома.

Температурата на половите органи се увеличава през нощта.

Пълзене и гъделичкане на гланса; семе сякаш е било изхвърлено без човек да го осъзнае.

Нощна емисия (при човек с хемиплегия); не се е случвала от години. (Бележка на Ханеман.)

След тази емисия парализата се влошила; болният крайник му се струвал мъртъв.

Емисия две нощи поред, с много говорене по време на сън.

През първите два дни половите органи били силно възбудени.

Силна възбуда на сексуалното желание след вечеря.

Импотентност: прегръдка с нормални усещания и ерекция; но в момента, когато семето трябва да бъде изхвърлено, сладострастното усещане внезапно се прекъсва, семето не се изхвърля и пенисът се отпуска.

Женски полови органи :

Менструацията, която вече е продължила обичайното време, продължава да тече още шест дни, само при движение, не и в покой; всяко отделяне на кръв е придружено от режеща болка в корема.

(Не от Ханеман. — Тази жена държала южния полюс, докосвайки едновременно средата на пръта. Южният полюс изглежда възбужда кръвоизлив, особено от матката, като първичен ефект; северният полюс изглежда действа противоположно.)

Менструацията, която е трябвало да се появи след няколко дни, се появила четири часа след докосване на южния полюс, но кръвта била светла и водниста.

Топлина и парене в пудендумата, с фини бодехи.

Дихателни органи :

Корица и кашлица с експекторация на зелена слуз и задух.

Няколко пристъпа на зловонна кашлица през нощта по време на сън, без да причиняват пълно събуждане.

Затруднено дишане по долното ребро.

Дълбоко вдишване, наподобяващо вид хлипане, придружено от неволно преглъщане (както обикновено при хлипане).

Задух в ямката на стомаха.

Вечер след лягане в леглото едва успява да се възстанови от задуха.

Притискане на гърдите, сякаш дишането е треперливо, и сякаш вдишаният въздух е охлаждащ (веднага).

Болка в двете страни на стернума, състояща се от притискане и дърпане, придружена от тревога, която не му позволява да остане никъде, сякаш е направил нещо лошо.

Гръден кош :

Притискане в долната част на долния край на стернума, с тревожност и спиране на мисълта (веднага).

Палпитация на сърцето.

Остри бодежи в дясната част на гърдите, спиращи дишането.

Притискане в лявата част на гърдите, причиняващо гадене.

Болезнена болка в гърдите следобед и вечер.

Тъпо притискане в лявата част на гърдите, както при движение, така и в покой.

Сърбящо жилене в двете зърна едновременно.

Няколко внезапни бодежи по повърхността на лопатката.

Под лопатката усеща фин, не напълно заострен бодаж (веднага).

Гръб :

Топлина, започваща в шийните прешлени и простираща се по цялата гръбначна колона.

Щипане в мускулите на гърба.

Гризане и парене в гърба.

Треперене от тила надолу по гърба.

Болезнена и едновременно пареща болка в кръста, както в покой, така и при движение.

Тъпи бодежи в кръста.

Болка, сякаш изкълчена, в сакроилиачната става, след това болка сякаш натъртена в тази част.

След ставане от седнало положение усеща скованост в кръста, хълбоците и коленете.

Силно парене и жилене над сакрума и между лумбалните прешлени, спиращо дишането при навеждане.

Горни крайници :

Непоносима болка, сякаш натъртена, през нощта в леглото, в бицепса на горната част на ръката, върху която той не лежи, особено при повдигане на ръката нагоре и назад, преминаваща веднага при обръщане на засегнатата страна.

Пълзене в лявата ръка, отгоре надолу, наподобяващо малки змии.

Усещане като къркорене и бълбукане надолу по лявата ръка (веднага).

Къркорене нагоре и надолу във вените на двете ръце, в продължение на няколко часа.

Бързо, болезнено потрепване в ръцете, отгоре надолу.

Жилещ сърбеж в горната част на ръката (между ставите), вечер преди и след лягане.

Усещане за изпълненост и подпухналост в ръката, сякаш артериите в ръката бият.

Болезнена скованост в лакътната става на ръката, която е докосната от магнита.

Усещане за студенина в лявата ръка, сякаш лед лежи върху нея, ръката има нормална температура.

Дърпащо-паралитична болка рано сутрин; първо в лявата ръка при повдигане, после в кръста при навеждане напред, след това в левия хълбок и в мускулите на лявото бедро и крак при изпъване на коляното.

Голяма отпадналост в дясната ръка вечер.

Усещане за тежест в предмишницата, сякаш човек е работил твърде много.

Болка в ръцете, сякаш кръвта в тях е била задържана; ту в едно, ту в друго място.

Скованост на лакътните стави (веднага).

Лявата ръка е много по-тежка от дясната, придружена от пълзене във върховете на пръстите.

Усещане в ръката, сякаш е била заспала.

Усещане сякаш ръката е заспала, със подуване на вените и по-бърз пулс (веднага).

Усещане като студен дъх, докосващ ръцете.

Усещане за студенина в ръцете, които въпреки това се чувстват топли за другите.

Болезнено дърпане в пръстите и ставите на пръстите.

Потрепване в пръстите, които са докоснати от магнита.

Болка в долната става на палеца, сякаш е изкълчена.

Потрепване в десния показалец, причиняващо видимо подскочане.

Върхът на пръста, който е докоснал магнита, става изтръпнал и нечувствителен.

Пълзене във върховете на пръстите.

Усещане за топлина и потрепване в пръста, докосващ магнита.

Биене в пръста, който е в контакт с магнита.

Биене във върха на палеца (веднага).

Язвена, биеща, жиеща болка в корена на ноктите.

Долни крайници :

Паралитична и натъртена болка в тазобедрените стави, когато лежи на засегнатата страна.

Бедрото и кракът лесно „заспиват“ сутрин при седене, не преминават скоро при ставане.

Дърпане с притискане в мускулите на бедрата, по-лошо при движение.

Паралитично дърпане вечер, от средата на бедрата надолу към стъпалата.

Жилещ сърбеж в бедрото вечер, също и в леглото.

Жилещо потрепване в мускулите на бедрото до перинеума.

Усещане за студенина в дясното бедро.

Дърпаща болка във външната страна на сгъвката на коляното.

Тъпа, натъртена болка в сухожилията на сгъвката на коляното; биене и потрепване, крайниците се свиват конвулсивно; най-силно при движение.

Силно дърпащо потрепване в задколянните мускули, придружено от натъртена болка; краката очевидно се свиват от болката, особено при движение.

При ходене тя усеща бодej в коляното.

Разкъсване с притискане в капачката (по-лошо при движение), и < при докосване на мястото.

Коленете се подкосяват при ходене.

Пукане в колянната става при движение.

Много болезнено дърпане в задколянните мускули, понякога придружено от болезнени потрепвания в прасците.

Тъпа болка в коляното след вечеря, болезнено и разкъсващо, < при докосване.

Крамповидна болка, простираща се от лявата тарзална става до отвъд коляното; изпъването не облекчава болката.

Биене в мускулите на краката при сядане след ходене.

Дърпане или разкъсване с притискане в тибията.

Крамповидна дърпаща болка в прасците.

Непоносимо болезнено потрепване в прасците, придружено от болезнено дърпане в задколянните мускули.

Краката болят, когато висят надолу при седене; биене в краката навсякъде.

Сърбящо-парещ, бавен бодej в страната на прасеца.

Дърпане или разкъсване с притискане в двете тарзални стави и глезените.

Бодeжи под глезените, последвани от дърпане в задколянните мускули и болезнени потрепвания в прасците.

Тарзалната става лесно се разтяга при неправилна стъпка.

Болка като изкълчена в тарзалната става при неправилна стъпка.

Крамп на ходилото при сгъване на стъпалото назад.

Бодeжи в ходилата, особено при движение.

Жилене в гърба на пръстите и в страните на стъпалата (вечер), сякаш са били измръзнали.

Болезненост на вътрешната страна на нокътя на големия пръст, сякаш нокътят е враснал в месото от едната страна; много болезнено дори при лек допир.

Щипане, причинено от обувките върху горната и страничната част на пръстите и близо до нокътя на големия пръст при ходене, както от мазоли.

Дърпане отпред назад в средните три пръста, само при ходене (на открит въздух).

Клинични случаи (както са в оригинала):

Miss —, 8 ноември 1878. В продължение на три седмици — болезненост в средната предна част на лявата подбедрица (където имала разширени вени осем месеца), при стоене или когато кракът виси надолу, премахната чрез поставяне хоризонтално; чести усещания като гореща вода, стичаща се надолу по засегнатата част, но само когато кракът е надолу; понякога пулсации там, когато кракът виси. *Magnetis Australis*, с.т., една доза. 11 юни 1879. Съобщава, че усещането за гореща вода никога не се е върнало, а болката напълно изчезнала за два дни. — Berridge.

Mr. C. страдал две години от враснал нокът; опитал трима от най-добрите лекари и безброй средства без облекчение. Преди година се подложил на болезнената операция — изваждане на нокътя от корен, но след три месеца той израснал отново и го измъчвал повече от преди. Взел *Magnetis Australis* 1m и след около пет седмици бил напълно излекуван. — Swan.

Mrs. D., нервно-сангвиничен темперамент, страдала пет години от враснал нокът на външната страна на левия голям пръст. През повечето време не можела да носи обувка на този крак и никога без силно увеличаване на болката или дори без да може да понесе тежестта на тялото. Всяка грешна стъпка водела до отделяне на кръв и гной. Външната страна на пръста била силно възпалена и подута, така че почти половината нокът бил скрит. Никакво лечение, дори изрязване на половината нокът, не давало повече от временно облекчение. Дадена една капка *Magnetis Australis* 1m. Облекчение последвало скоро. Пръстът изглеждал по-добре, бил по-малко чувствителен на натиск и тя можела да носи обувка без много болка. Подуването почти изчезнало в корена на нокътя, създавайки вид сякаш част е била изрязана. Дадени три дози от същото лекарство, една всяка вечер, и след няколко дни пръстът бил напълно добре. — Ballard.

Mrs. C. S., 31 г., блондинка, оплаква се от болка в лявата долна челюст, сякаш е изкълчена; по-лошо сутрин и при движение, усещане сякаш главата на костта е притисната и натъпкана в ямката. *Magnetis Articus* 1m, три дози, една всяка вечер, премахнали всички симптоми. — Conaut.

Млада омъжена жена бързо наддала тегло след раждане; това, заедно с неестествения натиск върху възглавничката на стъпалото, причинен от обувки с висок ток, довело до израстване на месо върху вътрешната страна на левия голям пръст над ръба на нокътя. Поради пренебрегване и неправилно локално лечение последвали улцерация и големи нездрави грануляции. Болката била толкова силна, че не можела

да използва крака. Magnetis Australis 1m всяка вечер в продължение на седмица. След десет дни пръстът бил добре и останал така. — Ostrom.

Сън :

Често прозяване (със студенина).

Безсъние и будност преди полунощ, без желание да заспи.

Голямо желание за сън на разсъмване, без да може да заспи.

Неспокоен, често се обръща от една страна на друга през нощта в леглото.

Често силно говорене по време на сън, с множество объркани сънища.

Подскача в съня; това го събужда.

Сънища за пожари.

Сънува, че кон го хапе в горната част на ръката и го рита в гърдите; при събуждане усеща болка във външната страна на гърдите.

Кара се и се бие в съня.

Сънува дълго време за един и същ предмет, без прекъсване, напрягайки ума си.

Раздразнителни сънища.

Бавен, свистящ издишване по време на сън преди полунощ.

Бавни, силни свистящи вдишвания след полунощ.

Бързо разклащане на ръцете и дланите по време на следобедната дрямка.

Необичайно биене в областта на сърцето.

Треска :

Неприятно усещане в периоста на дългите кости, както се усеща в началото на пристъп на треска и малария.

Изглежда предразполага към настинки.

Кратко треперене следобед.

Следобед често е нападнат от кратко треперене по цялото тяло; при ходене на открит въздух зрението ѝ се замъглява, а при стоене неподвижно има треперене и подскачане на мускулите на крайниците, неспособна да ги задържи неподвижни няколко минути, без да усеща студ; при сядане е нападнат от топлина в главата и лицето.

Студенина в стаята през целия ден, особено след вечерна дрямка.

Студенина на краката до коляното, с изкачване на топлина и кръв към главата.

Трепереща студенина, с усещане за студ, два часа, без жажда или действителен студ; последвана от голяма топлина, дори при ходене на открит въздух, с жажда и пот по челото и гърдите, особено в ямката на стомаха (веднага).

Усещане за студенина в лявата ръка, сякаш лед лежи върху нея.

Усещане за студенина в областта на коленете (веднага).

Треперене в прасците при пиене.

Усещане за студенина в двете ръце и лявата страна.

Силен сърбеж на гърба по време на студенина.

Усещане сякаш вятър духа в ухото по време на студенина.

Усещане за студенина по цялото тяло вечер (без треперене), без жажда (освен в началото на студенина), и без да е действително студено; едновременно е в лошо настроение, всичко му е неприятно, дори храната; два часа по-късно е покрит с топлина и пот по цялото тяло, без жажда.

Вътрешна студенина в засегнатата част.

Лявата ръка му се струва много по-студена, но има нормална температура или дори повишена (веднага).

Вътрешна суха топлина няколко часа след усещането за студенина, по време на разходка.

Увеличаване на студенина в бедрата, с усещане за студ за изследващия, и топлина в половите органи.

По време на студенина или усещане за студ е бил напълно топъл, но е бил принуден да легне и да се завие добре; устата му била много суха; след това бил покрит с обилна пот по цялото тяло, без да усеща топлина; напротив, усещал постоянно треперене по изпотените части, сякаш са покрити с гъша кожа; придружено от усещане сякаш вятър духа в ушите.

Събужда се сутрин с силно главоболие, топлина и редуваща се студенина, и не може да стане от леглото.

Увеличаване на вътрешната топлина, без жажда.

Топлина в лицето след хранене.

Топло усещане в областта, където е приложен магнитът.

Горещи ръце след полунощ, в леглото.

Топлина по цялото тяло, особено по гърба.

Пот по време на сън две сутрини поред.

Обща пот през нощта.

Жажда два дни, без топлина.

Голяма неприязън към открит въздух, дори когато не е студено; той прониква до костите и мозъка, придружено от плачливост и лошо настроение.

Усещане сякаш студена вода се излива върху главата до гърдите (веднага).

Малък, едва забележим пулс.

Неприятна, необичайна топлина, придружена от раздразнително настроение.

Прилив на топлина от една част на тялото към друга, в различни моменти, например от бедрото надолу към тибията.

Усещане сякаш кръвта подскача във вените, при лягане вечер в леглото.

Кожа :

Корозивен сърбеж вечер в леглото, по гърба и други части на тялото.

Сърбящо-жилещо, разкъсващо усещане тук или там вечер в леглото.

Фин сърбеж тук и там вечер в леглото и при събуждане, лесно преминаващ при чесане.

Сърбеж тук и там (също в седалището) вечер в леглото и болезненост след леко чесане.

При лек студ на въздуха носът, ушите, ръцете и краката му се чувстват студени и изтръпнали; в топла стая се чувстват горещи, с пълзене и сърбеж в частите (с жилене).

Общи симптоми :

Пълзящо усещане в лявата страна и лявата ръка (веднага).

Вид тревога в крайниците (веднага).

Щипане в месото тук и там.

Щипане в много външни части на тялото следобед.

Щипане и стискане в различни части на тялото следобед.

Болка в крайниците, както се усеща при твърде бърз растеж.

Стрелкащи болки тук и там, изчезващи веднага.

Потрепващо усещане във всяка част на тялото, както когато човек е тичал бързо и усеща тревожност и неспокойство.

Жилещо-парещи болки тук и там в тялото, особено във върховете на пръстите.

Натъртена болка във всички крайници, така че си представя, че лежи върху камъни, на която и страна да лежи.

Натъртена болка във всички стави рано сутрин в леглото и при ставане, дори в ставите на таза, с усещане за слабост в двата коремни пръстена, сякаш херния ще излезе.

Скованост на ставите.

Пукане на ставите при движение.

Бързо увеличаване на подвижността на всички мускули и бързина във всички движения; умът е спокоен.

Лекота на цялото тяло.

Слабост на краката при изкачване на стълби.

При ходене на открит въздух краката се чувстват натъртени и внезапно е нападнат от сън.

При разходка изпада в слабост, която се увеличава при седене.

Мързел и тежест на цялото тяло, придружени от усещане за тревога, сякаш е заплашен от парализа и сякаш ще падне, придружено от усещане за топлина в лицето и цялото тяло, смесено с треперене.

Не може да лежи неподвижно в никаква поза.

Голям прилив на кръв към мозъка рано сутрин в леглото.