

The Materia Medica

Nosodes

Henry Clay ALLEN

Copyright © Médi-T 2003

Pyrogen

(Продукт на сепсис)

Описание :

При сапремия или септицемия: пуерперална или хирургична; от птомаинова или канална газова инфекция; по време на дифтерия, тиф или тифус; когато най-добре избраното лекарство не успява да > или да подобри трайно.

Леглото се усеща твърдо (**Arn.**); частите, върху които лежи, са болезнени и натъртени (**Bapt.**); бърз декубитус (**Carb. ac.**).

Голяма неспокойност; трябва да се движи постоянно, за да > болезнеността на частите (**Arn., Bellis, Eup.**).

Език: голям, отпуснат; чист, гладък като лакиран; огнено червен; сух, напукан, артикулацията трудна (**Crot., Ter.**).

Вкус: сладникав; ужасно зловонен; гноеподобен; като от абсцес.

Повръщане: упорито; кафеникаво; като утайка от кафе; зловонно, стеркокарцеозно; с импактирани или обструктирани черва (**Op., Plb.**).

Диария: ужасно зловонна (**Psor.**); кафява или черна (**Lep.**); безболезнена, неволна; несигурна, при изпускане на газове (**Aloe, Olean.**).

Запек: с пълна инертност (**Op., Sanic.**); упорит от импакция, при трески; изпражнения големи, черни, с миризма на мърша; малки черни топчета, като маслини (**Op., Plb.**).

Фетус: или задържани секунди, разложени; мъртъв от ден, черно, ужасно зловонно течение; „никога добре оттогава“ — септична треска след аборт или раждане. За да се събуди жизнената активност на матката.

Лохии: тънки, едва, кафяви, много зловонни (**Nit. ac.**); потиснати, последвани от тръпки, треска и обилна зловонна пот.

Ясно съзнание за сърцето; чувства се уморено; сякаш уголемено; мъркащо, пулсиращо, трептящо, постоянно в ушите, предотвратяващо съня; сърдечна астенция от септични състояния.

Пулс ненормално бърз, несъразмерен с температурата (**Lil.**).

Кожа: бледа, студена, с пепеляв оттенък (**Sec.**); упорити, варикозни, зловонни язви при възрастни хора (**Psor.**).

Тръпки: започват на гърба, между лопатките; силни, общи, в костите и крайниците, отбелязващи началото на септична треска; температура 103 до 106; топлина внезапна, кожата суха и пареща; пулс бърз, малък, жилав, 140 до 170, следва студена лепкава пот.

При септични трески, особено пуерперални, **Pyrogen** е показал голямата си стойност като хомеопатичен динамичен антисептик.

Връзки :

Антидот: **Nux vomica** при влошаване от прекомерно действие на единична доза или при лоши ефекти от повторни дози; **Rhus, Eup. per.** при болки, неспокойност и костни болки.

Съвместими: **Arn., Bap., Rhus, Eup. per.** при тифоидни и други трески с мускулна болезненост, леглото се усеща твърдо. **Ars., Ech., Lach., Malar.** (растителният Pyrogen), **Ant. t., Bapt., Brom., Lyc., Phos.,** ветрилообразно движение на *alae nasi*. **Bry.,** кашлица < от движение и в топла стая. **Ipec.,** маточно кръвотечение (ако Ipec. се провали, макар да е добре подбрано). **Bap., Psor.,** зловонна диария. **Lept., Psor.,** черни изпражнения. **Opium, Plumb., Sanic.,** запек, твърди черни топки. **Nit. ac., Sec.,** тънки, зловонни лохии. **Phos.,** водата се повръща веднага щом се затопли в стомаха. **Bell., Melil.,** пулсиращо, пръскащо главоболие. **Carbo v., Ech., Psor.,** зловонни варикозни язви при възрастни хора. **Hep., Sil., Calc. sulph.,** склонност към обилна супурация. **Sulph., Psor.,** пациентът непрекъснато рецидивира след привидния симиилум.

Влошаване :

Движение, движение на окото; в топла стая; при изправяне от легнало или седнало положение (кашлицата се облекчава от изправяне; < при лягане, Clarke).

Подобряване :

Топлина, горещо къпане или пиене на гореща вода; стегнато бинтоване на засегнатата част; разтягане на крайниците; ходене, промяна на положението.

Ум :

Приказлива; може да мисли и говори по-бързо от всякога (**S**).

Раздразнителна (**S**).

Делир при затваряне на очите; вижда мъж в края на леглото.

Шепне; в съня.

Усещане сякаш тя покрива цялото легло; знае, че главата ѝ е на възглавницата, но не знае къде е останалата част от тялото.

Чувства, когато лежи на едната страна, че е един човек, а когато се обърне на другата — друг човек.

Усещане сякаш е претъпкана с ръце и крака.

Халюцинация, че е много богат; остава след треската.

Повишена бодрост на духа, въпреки че се чувства болен.

Голяма депресия.

Мърморещ делир.

Тревога, неспокойност.

Мърморещият делир започва рано, води до безсъзнание и смърт.

Признаците на инфекция са ужас, делир, зашеметяване.

Мозъкът активен през нощта, не може да спи, държи речи и пише статии.

Глава :

Клатушка се като пиян при изправяне сутрин (**S**).

Замайване при изправяне в леглото.

Болки в двата мастоида, < десен; тъпо пулсиране в мастоидната област (**S**).

Силно пулсиране на артериите на слепоочията и главата; всяка пулсация се усеща в мозъка и ушите, пулсирането се среща на върха на мозъка (**S**).

Безболезнено пулсиране по целия преден отдел на главата; звучи като излизаща пара (**S**).

Ужасно пулсиращо главоболие > от стегната превръзка.

Мъчително, пръскащо, пулсиращо главоболие с интензивна неспокойност (често придружено от обилно кръвотечение от носа, гадене и повръщане).

Усещане сякаш има шапка на главата.

Търкаляне на главата от една страна на друга.

Челото обляно в студена пот.

Пулсиране на каротидите и съдовете на шията; ясно, вълнообразно пулсиране от ключиците нагоре.

Дете с цереброспинален менингит било толкова болно, че в един момент изглеждало, че няма да се възстанови; имало автоматично движение на дясната ръка и десния крак; търкаляне на главата от страна на страна; това продължавало, докато я завъртало отляво надясно, така че краката да стигнат до възглавницата или да докоснат таблата; тя била изведена от това състояние с **Pyrogenium**.

Тъпо главоболие.

Церебралните симптоми обикновено не са тежки, но често има ниска форма на делир.

Замайване, главоболие.

Тежко главоболие, неприятно.

Сутрешно главоболие.

Пулсация, усещана в главата, безболезнено пулсиране.

Очи :

Лявото очно ябълко болезнено, < при гледане нагоре и завъртане на окото навън (**S**).

Изпъкнали очи.

Клепачите изглеждат сухи и задебелили, сякаш пълни с пясък; слюз, събираща се във вътрешните кантуси; слепени и с корички по ръбовете при събуждане сутрин.

Лепкави и възпалени очи.

Интензивна фотофобия, лежи със здраво притиснати юмруци в очите.

Фликтенуларен кератит, двете очи < от светлина.

Уши :

Силно звънене, като камбана, усеща се в ухото; звънене и бучене в дясното ухо < нощем.

Ушите студени.

Ушите червени, сякаш кръвта ще избухне от тях.

Звук като излизаща пара, пукащ, мъркащ звук.

Силно звънене в дясното ухо, траещо само няколко минути.

Нос :

Кървене от носа; събудил се, след като сънувал, че му тече кръв, и установил, че е така.

Кихане: всеки път когато извади ръцете изпод завивките; нощем.

Ноздрите се затварят последователно (**S**).

Студен нос.

Ветрилообразно движение на *alae nasi*.

Кихане нощем, ноздрите се затварят и редуват от страна на страна.

Гъсто, лепкаво течение от носа < дясно.

Лице :

Лице: парещо; жълто; много червено; бледо, хлътнало и обляно в студена пот; бледо, зеленикаво или хлорозно.

Ограничено зачервяване на бузите.

Хектична руменина следобед и вечер, появяваща се редовно в 3 или 4 ч. следобед.

И продължаваща до полунощ; след това лицето покрито с едри капки студена пот.

Лицето придобива изпито и тревожно изражение.

Уста :

Език: покрит бяло отпред, кафяв отзад; жълтеникавокафяв, лош вкус сутрин (**S**).

Език чист, гладък и сух; първо огнено червен, после тъмночервен и интензивно сух; гладък и сух; лъскав, блестящ като лакиран; сух, напукан, артикулацията трудна.

Език сух и без частица влага върху него.

Няма жажда, откакто е болен.

По-добър вкус в устата; език сух по средата.

Вкус: взел една доза **Pyrogen cm.** (Swan) следобед.

През вечерта ужасно зловонен вкус, сякаш устата и гърлото са пълни с гной, който продължил 24 часа; усещане като от спукан абсцес в устата.

Гаден, зловонен вкус сутрин, в продължение на много дни по време на доказването.

Език сух и кафяв.

Лош вкус в устата.

Лепкава слюнка.

Пастообразен, обложен език.

Гърло :

Дифтерия с крайно зловоние.

Отпуснато гърло.

Удължена увула.

Язви на сливиците.

Ларинкс :

Обикновено кашлица.

Кашляне при издишване.

Кашлица, придружена с ръждиви храчки.

Ларингит.

Кашлица всеки път, когато се движа или обръщам в леглото.

През нощта отхрачва жълти храчки.

Кашлицата силна след ставане.

Кашляне, изхвърляне на големи маси слуз от ларинкса.

Кашлица < от движение.

Кашлица повече в топла стая.

Кашлянето причинява болка в задната част на главата.

Парене в ларинкса и бронхите при кашляне.

Отхрачва жълти храчки през нощта.

Апетит :

Без апетит или жажда (19-ти ден).

Пълна загуба на апетит.

Голяма жажда за малки количества, но и най-малкото количество течност веднага се отхвърля.

Пиене на много гореща вода > жаждата и повръщането (куче).

Без апетит, но храната се приема свободно и се смила.

Лош апетит за закуска.

Без апетит, тъй като стомахът и червата се чувстват толкова пълни.

Без апетит за вечеря.

Необичаен апетит за шоколад.

Стомах :

Оригване на кисела вода след закуска.

Гадене и повръщане.

Повръщане: упорито; кафеникаво, като утайка от кафе; зловонно, стеркокарцеозно; с импактирани или обструктирани черва.

Повръщане и прочистване.

Повръща вода, когато стане топла в стомаха; повръщането >.

Позиви за повръщане; със студени крака.

Стомахът се чувства твърде пълен; < след хранене и > от чести кисели оригвания.

Гадене > от пиене на много гореща вода и от повръщане.

Повръщането не е рядко.

Гадене при първо изправяне.

Диспепсия.

Оригване на малко вода след закуска.

Стомахът и червата се чувстват твърде пълни, за да се яде.

Корем :

Усещане за пълнота и подуване на корема.

При лежане на лявата страна — бълбукащо или клокочещо усещане в хипохондриума, простиращо се назад към лявата страна на гръбнака.

Болка в пъпната област с преминаване на лепкаво, жълто, зловонно изпражнение.

Докато се вози в каляска — болка вляво от пъпа; < от пиене на вода; > от изпускане на газове.

Болезненост на корема толкова силна, че диша трудно и едва понася натиск над дясната страна.

Много силни режещи болки в дясната страна, преминаващи през гърба, < от всяко движение, говорене, кашляне, дълбоко дишане; > от лежане на дясната (засегната) страна; стене при всяко вдишване.

Голямо раздуване на корема, с висока температура; лохиално течение интензивно зловонно, като гнило.

Перитонит.

Нередовна дейност на червата.

Усещане за студ в корема.

Усещане за тежест в корема.

Асцит (болест на Bright).

Изпражнения и анус :

Фекална и тънка слуз, и накрая кървава диария и тенезъм (куче).

Две меки, лепкави изхождания, 8 до 9 ч. сутрин.

Неволно изпускане на изпражнение при преминаване на газове.

Обилни воднисти, безболезнени изхождания, с повръщане.

Изпражнение ужасно зловонно, като мърша.

Изпражнение много запечено, голямо, трудно, изисква голямо усилие; първата част топчета, последната част нормална, с ивици кръв; анусът болезнен след това.

Запек: твърди, сухи натрупани фекалии; изпражнение голямо, черно, като мърша; малки черни топчета като маслини.

Конгестия и капилярна стаза на гастро-интестиналната лигавица, отделяне на епител, кървава течност, раздуваща червата (куче).

(Пот около ануса премахната; фистула облекчена.)

Обикновено диария.

Нередовна дейност на червата.

Няма изхождане днес, много необичайно.

Лепкаво жълто изпражнение.

Преминаване на газове, понякога неволно.

Уринарни органи :

Урината оскъдна; отделена само два пъти за двадесет и четири часа.

Урина: жълта при първо отделяне; след престояване — мътна, със субстанция като портокалова кора; червен утайка по съда, трудно се премахва; утаява седимент като червен пипер с червеникав облак в съда.

Ставал три пъти през нощта да уринира.

(Болест на Bright.)

Урината съдържа албумин и цилиндри; ужасно зловонна, като мърша.

Чести позиви за уриниране при настъпване на треската.

Непоносим тенезъм на пикочния мехур; спазматични контракции, включващи ректума, яйчниците и широката връзка; [излекувано в случай на Yingling с **Pyrogen cm.** (и по-високи); следващият цикъл дошъл естествено и безболезнено, докато преди менструацията била болезнена и изключително зловонна].

Нередовно уриниране.

Нередовна дейност на бъбреците.

Болка в областта на бъбреците.

Уринирал само два пъти днес.

Много необичайно; обикновено няколко пъти на ден, нормално количество.

Урината натоварена с албумин.

Червен варовик по вътрешността на съда, трудно се премахва.

Седимент като червен пипер, който плава на дъното.

Мъжки полови органи :

Тестисите висят отпуснати; скротумът изглежда и се усеща тънък.

Женски полови органи :

Пуерперална треска, със зловонни лохии (излекувано).

Пуерперален перитонит с крайно зловоние; гнил мирис.

Частите силно подути (болест на Bright).

Менструация ужасно зловонна; като мърша.

Менструацията трае само един ден, след което кървава едва левкорей, ужасно зловонна.

Кръвотечение от яркочервена кръв с тъмни съсиреци.

Септицемия след аборт; фетус или секудини задържани, разложени и ужасно зловонни.

(Излекувал пролапс на матката, с чувство за притискане надолу > при задържане на главата и напъване като при раждане.)

Абсцес на левия яйчник, остро пулсираща болка, голямо страдание, с треска и тръпки (**Pyrogen cm.** (Swan) предизвикал огромен поток бял кремообразен гной с общо >).

Лохии: тънки, едва, кафяви или зловонни; потиснати, последвани от тръпки, треска и обилна зловонна пот.

Излекувал пролапс на матката, с чувство за притискане надолу, > при задържане на дъха и напъване, както при раждане.

Болка, започваща в маточната област и преминаваща нагоре към пъпа.

Беше обратното (болка като тирбушон); това моментално > при задържане на дъха и напъване, както при раждане; моментално > при притискане на ръцете към вулвата, после казваше, че трябва да отпусне, защото това я влошава.

Lillium преди това се беше провалил в случая.

Болка, започваща в пъпа или малко над него, и преминаваща надолу към матката, но по средата на корема се пресичаше от същия вид болка, започваща от матката и преминаваща нагоре, докато се срещнат по средата между пъпа и матката, след което постепенно изчезваше, докато не се появи нова; > моментално при придърпване на коленете към брадичката и обгръщане на ръцете около тях и здраво задържане.

Непоносим тенезъм на пикочния мехур, повече спазматична контракция, отколкото нещо друго; едновременно това състояние се отразяваше към ректума и силното желание за дефекация без възможност да се извърши включваше и яйчниците и широките връзки.

Nux vom. и **Lillium tig.** нямали никакъв ефект.

Силна тръпка; тъпо фронтално главоболие; неспокойна, бледа, тревожна.

Остри стрелкащи болки през корема.

Болката в главата силна; тя я стискаше с ръце сякаш е получила внезапен удар и извика: „О! главата ми“, стана много неспокойна, каза, че ще умре, и не искаше бебето, което много обичаше, да бъде близо до нея.

Лицето бледо, със зловонна лепкава пот; коремът чувствителен на натиск; лохиите и млякото спрели.

Жадна за чести малки глътки.

Пулс 140, слаб, малък; температура 103.

Pyrogen cm., 6 дози във вода, през половин час.

Тя се възстанови добре, макар и бавно.

Пуерперална септицемия.

Mrs. T. B., бледа, стройна, нежна, но в добро здраве; примипара; успешно родила на 10 април 1901. На 20-ти била с температура 102; лохиите оскъдни, бледи, зловонни; но тя се чувствала добре и нямала болка. Треската постепенно се увеличавала няколко дни, докато температурата достигнала 105 и 106, с пулс 120–130; въпреки това тя настоявала, че се чувства добре и не искала да легне. Няколко лекарства — **Bapt., Bell., Ech., Tar.** — били дадени без ефект. Накрая силна тръпка, последвана след няколко часа от друга, я изпратила в леглото и сестрата била извикана обратно. Даден бил **Pyrogen**. На следващия ден температурата 102; лохиите се появили отново в естествен цвят; коремната чувствителност изчезнала и за два-три дни напълно се изгубила. Тя се възстановила бързо.

Mrs. W. S. C., стройна жена; примипара; родила на 10 юни, инструментално. Силно перитонеално разкъсване, което било възстановено. На сутринта на третия ден имала тръпка; режеща спазматична болка в матката, която била подута и чувствителна; лохиите тъмни, обилни, съсирени; двете илиачни области чувствителни на натиск < лява страна. **Belladonna** не дала облекчение. Треската продължила да се покачва; лохиите по-тъмни, по-зловонни, съдържащи нишки и съсиреци. Мирисът и другите симптоми, показващи настъпваща сепса, довели до даване на **Pyrogen**, с много удовлетворяващи резултати и бързо възстановяване.

Carrie, 16 години, болна два-три месеца под алопатични грижи. Дъх, пот, хракки, менструация, урина и изпражнения ужасно зловонни, като мърша; отвращение до гадене от изпаренията, идващи от собственото ѝ тяло; болезненост на гърдите и корема; менструацията трае само един ден и след това кървава левкорей със същия мирис; пулс 106, с лоша кашлица, по-лоша при влизане в топла стая; голямо, месесто, бледо, зеленикаво или хлорозно лице; майката току-що починала от туберкулоза. **Pyrogen cm.**, една доза, и по-добре след десет часа, и на 12 ноември кашлицата,

мирисът и болезнеността почти изчезнали, пулс 80, език чист. **Sac. lac.**, и тя остава добре до момента на писане. — Wakeman.

Дихателни органи :

Свирене при издишване.

Кашлица: отхрачване на големи маси слуз от ларинкса; < от движение; < в топла стая; кашлица, парене в ларинкса и бронхите; болка в тилната област; боджежи в кръста, забелязвани само на стол; отхрачва жълти храчки през нощта.

Кашлица > при изправяне, < при лягане.

Отхрачване: ръждиви храчки; ужасно зловонни; кървави храчки.

Гръден кош :

Болка в десния бял дроб и рамото, < говорене или кашляне.

Пренебрегната пневмония: кашлица, нощни изпотявания, чест пулс, абсцесът се спускал, отделяйки много гной с вкус на материя (бързо възстановяване под **Pyrogen**, три дози).

Гръдният кош болезнен, с пурпурни петна по него.

Силна стягаща болка в долната част на стернума, понякога простираща се към ребрените стави и нагоре към гърлото, сякаш хранопроводът е в спазъм.

Екхимози по плеврата (куче).

J. A. W., 61 години. Стар войник, пълен с ревматични болки; много се оплаква.

7 април 1895. Пътувал двадесет и две мили в силна буря, студено и неприятно, на 5-ти. Веднага легнал. Горещи и студени вълни, < движение. Болки и болезненост навсякъде. Костите болят. Много неспокоен и нервен. Нетерпелив. Главата се чувства голяма, пълна и боли навсякъде, и надолу към шията; < кашляне. Назално течение обилно и течно. Белите дробове болезнени; < кашляне. Кашля много, малко отхрачване, < нощем.

Пулс 84. Червата не са се движили от 4-ти. Урина оскъдна. Изстива при движение. Когато първо се разболял и когато яздел в бурята, ноктите на пръстите на краката му се чувствали сякаш отлитат, първо един, после друг. Това усещане било много силно и неприятно.

Pyrogen cmm., три дози, през два часа.

В рамките на дванадесет часа болките изчезнали и той имал добра нощна почивка. Станал на следващата сутрин, чувствайки се „по-добре и по-свободен от болка, отколкото от четири месеца“. Много бързо и пълно излекуване. — Yingling.

Дишането бързо и повърхностно.

Болка в гърдите и може би ортопнея, от плеврални афекции.

Болка в областта на лявото зърно, сякаш в сърцето, което щяло да заболи.

Сърце :

Болка в областта на лявото зърно, сякаш в сърцето; увеличена дейност; пулс 120.

Сърцето уморено, както след дълго бягане; увеличена дейност < най-малко движение.

Никога свободен от уморено усещане около сърцето.

Всяка пулсация се усеща в главата и ушите; безболезнено пулсиране.

Усещане сякаш сърцето е уголемено; ясно съзнание за сърцето.

Усещане сякаш сърцето е твърде пълно с кръв.

Усещане сякаш сърцето изпомпва студена вода.

Силно, толкова упорито, че става много уморително.

Палпитация или увеличена дейност без съответно увеличение на температурата.

Палпитация < от движение; < лежане на засегнатата (лява) страна.

Силни удари на сърцето, чути от самата нея и от други.

Не може да спи от свистенето и мъркането на сърцето; когато заспи, има делир.

Сърдечна астения от септични състояния.

Екхимози по сърцето и перикарда (куче).

Палпитация < от движение > оставане в покой; пулс 160–170 в минута.

Уморено усещане около сърцето, както след дълго бягане; чувства сякаш би искала да го извади и да го остави да си почине; би било такова облекчение, ако спре да пулсира; температурата не е повишена.

Гръб и шия :

Болки в гръба в лумбалната област.

Бълбукащо усещане или клокочене в левия хипохондриум, простиращо се назад към лявата страна на гръбнака, усеща се при лежане на лявата страна.

Болка в кръста.

Слабост в гърба.

Бодежи в гърба при кашляне.

Пулсиране на съдовете на шията, издигащо се на вълни от ключиците.

Крайници :

Болки: в костите; по цялото тяло, както при силна настинка; с болезненост на плътта, главата се чувства твърда; > движение (**S**).

Студени крайници.

Изтръпване на ръцете, ръцете и краката, простиращо се по цялото тяло.

Автоматични движения на дясната ръка и десния крак, завъртащи детето от дясно наляво, докато краката достигнат възглавницата; повтаря се всеки път, когато бъде поставено правилно (цереброспинален менингит).

Горни крайници :

Болка в раменната става; отпред, преминаваща три инча надолу по ръката (**S**).

Ръцете и ръцете изтръпнали.

Ръцете студени и лепкави.

Суха екзема и лепкавост.

Суха екзема на ръцете.

Обилна ексудация в аксиларната област.

Болка в лявата раменна става, отпред, преминаваща надолу по ръката два до три инча, продължаваща до лягане.

Долни крайници :

Болка около коленете, дълбоко в костите, докато седи до горещ огън; > ходене.

При лягане — болка в капачката; > сгъване на крака.

Болка над лявото коляно, сякаш костта е счупена (**S**).

Болка над коленете в костите, > разтягане на крайниците.

Мравучкане в малкия пръст на десния крак, сякаш измръзнал.

Крака и крака подути (болест на Bright).

Изтръпване на краката.

Болки: в костите; по цялото тяло, както при силна настинка; с куцота и болезненост на мускулите; леглото се усеща твърдо; > движение < от движение.

Студени крайници; краката обляни в студена пот.

Изтръпване на ръцете, ръцете и краката, простиращо се по цялото тяло.

Отоци на краката, в случай на болест на Bright.

Болки в краката, сякаш в костите.

Кожа :

Mrs. I., 35 години, майка на две деца, подуване на прасеца; образувала се везикация върху горната част на левия крак, последвана от голяма язва, която в крайна сметка покрила целия крак. Докато болестният процес се разпространявал нагоре по крака, последователно се образували няколко абсцеса, подуването продължавало да се разпространява към хълбока. Около три инча под трохантера голям абсцес се разпространил в меките тъкани, отделяйки големи количества гной при отваряне.

Неспокойна, неспособна да лежи в едно положение; движението причинявало голяма болка, но движението давало >; трябва да бъде непрекъснато местена, всеки час или два всяка нощ, което доза **Rhus** не успяла да >. Краката, глезените и коремът много подути; урината оскъдна, с червен песъчлив седимент; постоянно усещане за препълване; много жадна, но неспособна да пие; гладна, но и най-малкото количество храна причинява препълване; много раздразнителна, хленчи като дете. Подуването и болката все още се увеличават; лицето и шията жълти, изтощени и набръчкани; температура 103, пулс 120. След като **Ars.**, **Rhus**, **Lyc.** и **Nux v.** не дали никакво >, **Pyrogen cmm.**, една доза, последвана от плацебо всеки час; започнало подобрене и продължило четири дни, когато започнала обилна, безболезнена, водниста, зловонна диария; дадена била още една доза **Pyrogen** и пациентката продължила към бързо възстановяване.

Кожата и конюнктивата стават жълтеникави.

Скоро след тръпката понякога се образува подкожен абсцес или се виждат обезцветявания и пустули по кожата.

Появява се жълтеница.

Лесно се образуват декубитални рани и кожата показва склонност към некроза при много лек натиск.

Често се появяват участъци от повърхностна гангрена, без провокация; еризипел.

Кожата бледа, студена, с земен пепеляв оттенък.

Упорити, варикозни, зловонни язви при възрастни хора.

Нерви :

Голяма нервност и неспокойност.

Не може да лежи дълго в едно положение без да се движи; но движението не дава облекчение.

Голяма слабост сутрин.

Залита при опит да ходи.

Нервна слабост, придружаваща възстановяване от септична треска.

Сън :

Сънувал, че има кръвотечение от носа, и при събуждане носът бил кървил по цялата възглавница.

Неспокоен сън, с стенания.

Неосвежаващ сън.

Нарушен сън.

Спал известно време; събудил се, за да се върти и мята във всякакви възможни положения.

Неспособен да спи от мозъчна активност и наплив на идеи.

Неспокойството > след сън.

Вика в съня, че тежест лежи върху нея.

Шепне в съня.

Буден от мъркането на сърцето.

Сънища: за различни неща; за бизнес; за своите пациенти и лекарството, което ги е излекувало.

Сънувал цяла нощ за работата от деня.

Може да лежи само няколко минути в която и да е поза.

Не може да спи до зори — мозъкът твърде активен, не може да държи очите си затворени.

Вика в съня сякаш от болка.

Треска :

„Във всички случаи на треска, започваща с болки в крайниците“ (**Swan**).

Трепери и започва да се движи неспокойно; температурата се покачва постепенно и постепенно спада (куче).

Тръпки, тичащи нагоре и надолу по гръбнака на последователни вълни; топлината не дава облекчение.

Температурата се покачва бързо до 104°F и спада бързо от сърдечна недостатъчност (куче, фатална доза).

Постоянна ужасна болка по цялото тяло; леглото се усеща твърдо, трябва да се движи често в търсене на меко място.

Понякога студенина и малко болки; малко треска.

След вечеря — болки по цялото тяло, студенина през нощта, леглото се усеща твърдо.

След като легне — студенина, зъбите тракат; събудил се в 10 вечерта в пот по горната част на тялото; > движение (**S**).

Чувства се горещ, сякаш има треска, но температурата е само 99°F, чувства се като 150°.

Чести позиви за уриниране веднага щом треската започне; урината бистра като вода.

Всеки втори ден — тъпа малария.

Потта ужасно зловонна, като мърша; отвращение до гадене от всяко изпарение, идващо от собственото ѝ тяло.

Студена пот по тялото; трески, причинени от: отравяне с канален газ; хирургична инфекция; дисекционни рани, кръвно отравяне или абсорбция на гной от медикаментозни локални приложения.

Делир при затваряне на очите; вижда мъж в края на леглото или в другия край на стаята; ръката студена и лепкава; коремът толкова болезнен, че едва може да диша; червата толкова болезнени, че не може да понесе натиск над дясната страна; < от изправяне в леглото; световъртеж при изправяне в леглото.

N. B., дете на 4 години, живеещо в къща, в която се подготвяла канализация. Няколко дни по-късно било нападнато в 2 сутринта от: повръщане и прочистване; изпражнения обилни и воднисти. Студени крайници, уши и нос; челото обляно в студена пот. Език силно обложен, жълтеникаво-сив; краищата на върха много червени. Голяма прострация. Голяма умствена и физическа неспокойност; пулс 140, малък и жилав; температура 99. Голяма жажда за малки количества, но и най-малкото количество веднага се отхвърля. По-късно през деня изпражненията ужасно зловонни, с мирис на

мърша; лицето бледо, хлътнало, обляно в студена пот. Език тъмночервен и свободен от сутрешното обложване, силна жажда, но водата < както повръщането, така и прочистването. След като **Ver.**, **Ars.**, **Carbo v.** и **Vap.** били дадени без подобрене, пациентът очевидно потъвал, пулсът невъзможен за броене; мислейки, че може би каналният газ е факторът, а чистият, огнено червен език насочил вниманието към лекуванията на Dr. Burnett с **Pyrogen**, били дадени две дози върху езика с бързо и трайно облекчение.

Miss E. B., 14 години, оплаквала се от умора, неспособност да ходи на училище. Температура 102, пулс 108, баща ѝ извикал лекар. Език ненормално червен, тънък бял налеп в основата. Лека епистаксис сутрин, който **Bryonia** >, но не повлиял треската. Тъй като нямало абсолютно никаква болка и много малко симптоми, била оставена няколко дни на плацебо. Открит бил канален газ като причина; **Pyrogen**, една доза, дала бързо възстановяване.

Склонност да говори цяла нощ по време на треската; студена пот по тялото; болка в кръста; желание за уриниране; урината оскъдна; говори сама; позиви за повръщане със студени крака; неспокойност > след сън; пурпурни петна по гърдите; вика в съня, че някой или тежест лежи върху нея; сърцето бие силно, с трудна дейност; усещане сякаш сърцето е твърде пълно с кръв; бие много силно, сърдечните звуци се чуват на разстояние от гръдния кош, винаги може да чуе сърцето си; не могла да спи от свистенето и мъркането на сърцето, когато заспивала — делир. Усещане сякаш има шапка на главата. Когато се събуди и я намери там, знае, че е добре, че не е в делир; > след повръщане; шепне в съня; шепне сама, ако я попиташ какво е казала — не отговаря; усещане сякаш покрива цялото легло; знае, че главата ѝ е на възглавницата, но не може да каже къде е останалата част от тялото.

Чувства, когато лежи на едната страна, че е един човек, а когато се обърне на другата — друг човек; усещане сякаш треската не протича еднакво във всяка страна, сякаш съществува като втори човек, или че има две нейни.

Студенина и тръпки през целия ден, които никакъв огън не може да стопли; седи до огъня и диша топлината от печката; студенина при отдалечаване от огъня; нощем, когато треската започне, усещане сякаш белите дробове са в огън и трябва да има свеж въздух, който скоро носи облекчение.

Усещане сякаш е претъпкан с ръце и крака; когато се обръща в леглото, те все още го притискат; щом треската започне, започва да уринира; може да каже всеки път кога треската идва заради този позив за уриниране. Урината бистра като изворна вода. Много силна болка в дясната страна; ножоподобни болки, преминаващи към гърба; < от всяко движение, кашляне, говорене или дълбоко дишане; > от лежане на засегнатата страна; стене при всяко вдишване; зачервяване на лицето и ушите, сякаш

кръвта ще избухне от тях. След като треската отmine, остава халюцинацията, че е много богат и има голяма сума пари в банката, и това е последното, което го напуска.

Не мога да спомена **Pyrogen** без да се развълнувам, заради чудесните резултати, които съм имал от него при кръвно отравяне. При всякакъв вид септична инфекция, пуерперална или травматична, **Pyrogen** прави чудеса, когато симптомите съответстват. Подобен е на **Anthracinum** в някои отношения.

Стара жена, умираща от гангрена, заразила една от сестрите; сестрата имала тръпки, висока треска и червени линии, тичащи нагоре по ръката по хода на лимфните съдове. **Pyrogen** бързо премахнал целия процес. — Boger.

Палмарната повърхност на лявата предмишница била разкъсана до костта от циркуляр.

Била превързана с лепенка, поставена толкова стегнато, че трябвало да бъде премахната след 24 часа, заменена с друга и поставени няколко шева; но цялата ръка започнала да се подува, станала много болезнена, постепенно се влошавала осемнадесет дни, през които пациентът имал малко сън. Цялата ръка и предмишница били огромно подути, почти черни на цвят и заплашвала гангрена. Решена била ампутация.

В този момент хомеопатичен лекар намерил, освен горните симптоми, пациента делириозен и възбуден; не можел да лежи, защото леглото било твърде твърдо, нито да отпусне ръката върху нещо, защото всичко, върху което я поставял, също се усещало твърдо. **Pyrogen 50m**. След няколко часа спял спокойно, температурата спаднала и болката намаляла. Подобрението било бързо и стабилно до пълно възстановяване.

Леко повишение на температурата, силна тръпка, последвана от изпотяване. Тръпките обикновено са силни и понякога се появяват с регулярността на малария.

Пулсът става слаб и бърз.

Пулсът се усеща в главата и ушите, безболезнено пулсиране.

Треска от интермитентен тип, с обичайните придружаващи симптоми: загуба на апетит, неспокойност, жажда.

Тръпките спират след първите няколко дни, но температурата обикновено остава ремитентна.

Пуерперални трески.

Тифозна треска.

Трескавост.

Пиемия.

Септицемия.

Парене в лицето.

Кръвта пулсира през всяка част на главата и тялото, усеща я дори в пръстите.

Студенина през цялата нощ.

Общи :

Не може да лежи повече от няколко минути в едно положение, > промяна.

Слабост сутрин, залита при опит да ходи (S).

Болки по цялото тяло, леглото се усеща твърдо.

Голяма мускулна слабост; бързо възстановяване за няколко часа (куче).

Неспокойност, въртене в леглото, стенания.

Болки в крайниците и общо неразположение.

Скоро след първоначалната тръпка се появява болка и подуване на една или повече стави.

Особена сладникава миризма около пациента, както при диабет.

Внезапен пристъп на плеврит при човек с оторея.

Може да се подозира пиремия.

Обща отпадналост.

Нервност.

Слабост.

Малария, болки в крайниците, особено в краката и гърба, с главоболие, страдание в стомаха, като тежка маса.

Неспокойност при започване на движение и по време на движение.

Неспокойни и стенещи, хора умиращи, особено от скарлатина или дифтерия, често им позволява да се възстановят.

Голяма нервност и неспокойност, иска да бъде покрит или люлян.

Голяма неприязън към миене.

Плаче при миене.

Не иска да спи в легло, а иска да бъде държана в скута и леко люляна; буди се, когато движението спре или при опит да бъде положена.

Влошаване :

Неспокойност > когато започва да се движи (**Rhus < когато започва да се движи**).

Подобряване :

От силно люлеене на стол.