

The Materia Medica

Nosodes

Henry Clay ALLEN

Copyright © Médi-T 2003

Secale cornutum

Синоними :

Ergota (Ergot или Argot, фр., петльов шпор) ; Ergot of rye ; Spurred rye ; Secale clavatum ; Mater secalis ; Seigle ergot (фр.) ; Mutterkorn ; Kornmutter (нем.).

Характеристики :

Подходящо за жени с тънък, изпит, слаб, кахектичен вид; раздразнителен, нервен темперамент; бледо, хлътнало лице.

Много стари, немощни, слаби хора.

Жени с много отпусната мускулна тъкан; всичко изглежда отпуснато и отворено; липса на действие, съдове отпуснати; пасивни кръвотечения, обилен поток от тънка, черна, водниста кръв; кръвните клетки са разрушени.

Хеморагична диатеза; най-малката рана причинява кръвене седмици наред (**Lach., Phos.**); отделяне на саньозна течна кръв със силна склонност към гниене; мравучкане в крайниците и голяма слабост, особено когато слабостта не е причинена от предишна загуба на течности.

Левкорей; зелена, кафява, зловонна.

Фурункули: малки, болезнени, със зелено съдържимо, узряват много бавно и се лекуват по същия начин; много изтощаващи.

Лице: бледо, изпито, пепеляво, хлътнало, хипократично; изпънато, със хлътнали очи; сини кръгове около очите.

Неестествен, вълчи апетит; дори при изтощаваща диария; жадува киселини, лимонада.

Диария: обилна, водниста, гнилоствна, кафява; изхвърляна с голяма сила (**Gamb., Crot.**); много изтощаваща; безболезнена, неволна; анусът широко отворен (**Apis, Phos.**).

Енуреза: при стари хора; урината бледа, водниста или кървава; урината потисната.

Парене във всички части на тялото, сякаш искри от огън падат върху пациента (**Ars.**).

Гангрена; суха, сенилна, < от външна топлина.

Големи екхимози; кръвни мехури; често начало на гангрена.

Колапс при холерни заболявания; кожата студена, но не може да понесе покриване (**Camph.**).

Кожата се усеща студена на допир, но пациентът не може да търпи покриване; ледена студенина на крайниците.

Менструация: нередовна; обилна, тъмна, течна; с притискащи, родилни болки в корема; непрекъснато отделяне на водниста кръв до следващия цикъл.

Заплашващ аборт, особено в третия месец (**Sab.**); продължителни, притискащи, напъващи болки.

По време на раждане: болките нередовни; твърде слаби; отслабващи или спиращи; всичко изглежда отпуснато и отворено, но без експулсивно действие; припадък.

Следродилни болки: твърде дълги; твърде болезнени; контракция тип „пясъчен часовник“.

Потискане на млякото; при тънки, изпити, изтощени жени; гърдите не се изпълват правилно.

Пулс малък, бърз, стегнат и често интермитентен.

Проверяващи :

1. Mrs. L. M. Hayes, с 200-тата потенция. Тази проверяваща знаеше потенцията, но не и лекарството. Била напълно убедена, че при 200-тата потенция никакво лекарство не е способно да произведе лечебни симптоми у здрав човек, и упорствала да повтаря експериментите си, за да потвърди или опровергае предишни резултати. Взела на 4 ноември шест капки през ден за една седмица. На 17 ноември взела шест капки два пъти дневно за една седмица. На 5 януари

взела петнадесет капки всеки ден за една седмица. На 1 март взела петнадесет капки всяка сутрин за три дни.

2. Miss R. C. Wilder, взела шест капки, 30-та потенция, сутрин на 5, 8, 12 и 15 ноември.
3. H. B. Reynolds, взел една драхма от 2-ра потенция, в повторни дози.
4. J. S. Campbell, взел няколко дози от 2-ра потенция.
5. F. W. Rogers, взел една драхма от 200-та потенция, доза два пъти дневно за две седмици.
6. Mrs. M. T. Hathaway, повторни дози от 200-та потенция.
7. D. M. Finley, 100-та потенция; повторил доказването четири пъти с резултати всеки път.
8. Miss H. M. Swathel, взела 200-та потенция от 1 март до 23 април, два или три пъти дневно. Взела 100-та потенция от 2 май до 15 май, веднъж или два пъти дневно.
9. G. D. Green, взел 2-ра потенция за две седмици.
10. C. S. Erswell, взел 100-та потенция, една драхма, в дневни дози за две седмици.
11. E. H. Pond, взел 30-та потенция.
12. E. C. Watts, взел 30-та потенция ежедневно за една седмица.

От март 1880 лекарството било дадено на седемдесет и двама доброволци, както следва:

Втора потенция — на 16 проверяващи.

Трета потенция — на 4 проверяващи.

Шеста потенция — на 17 проверяващи.

Тридесета потенция — на 13 проверяващи.

Шестдесета потенция — на 5 проверяващи.

Стотна потенция — на 6 проверяващи.

Двеста потенция — на 8 проверяващи.

„Празна“ потенция — на 3 проверяващи.

„Празните“ били дадени на тези, чието здраве при преглед не било сметено за достатъчно добро, за да гарантира надеждно доказване; само един от тях (млад мъж, който по-късно починал от албуминурия) получил или върнал някакви резултати.

Спазени правила :

Доколкото е възможно, всеки проверяващ е бил прегледан относно здраве и лични качества; и разпитван или кръстосано разпитван относно записаните резултати.

Проверяващите били инструктирани да следват правилата, изложени от Dunham за доказване на лекарство.

Никой не знаел какво приема.

Ботаника :

Adam Lonicer от Франкфурт, около средата на XVI век, е първият ботанически автор, който споменава Ergot, и скоро след това Thalius говори за него като използван „ad sistendum sanguinem“.

През 1623 Caspar Bauhin го споменава под името **Secale luxurians**, а през 1639 английският ботаник Ray напуска за неговите лечебни свойства.

Истинската природа на Ergot — дали е продукт на болестен растителен живот или самостоятелно растение — дълго време е била източник на голямо разнообразие от мнения. Но според най-новите авторитети **Secale cornutum** принадлежи към разред **Thallophyta** — клетъчни или невъзлови растения. Това е най-ниският разред на растителното царство и е разделен на два класа: **Algæ** и **Fungi**, което се основава на наличието на хлорофил в първите и отсъствието му във вторите.

Те не произвеждат диференциация на корен, стъбло или лист. В най-ниските членове на групата няма полово размножаване; в по-високите половото съединение може да бъде единична спора, маса от спори или плодник, в който се намират спори.

De Candolle и Fries през 1816, и L  veille през 1827, чрез своите изследвания добавили много към нашите знания за вътрешната структура на Secale, но останало за L. R.

Tulsane през 1853, чрез неговата забележителна монография *M  moire sur l'Ergot des Glumac  es*, да изясни много спорни точки в образуването, растежа и развитието на този гъбен организъм, и тази монография все още се цитира от почти всеки автор като най-доброто произведение по темата.

Въпреки това Fluckiger и Hanbury поддържат, че истинската природа на Ergot не е окончателно установена дори от продължителните и забележителни изследвания на Tulsane.

Формиране :

Hamilton обобщава противоречивите възгледи, поддържани от различни автори, както следва:

- a. „Някои смятат Ergot за гъба, растяща между глумите на житните треви, на мястото на яйчника (затова Léveille го нарича *Spacelia segetum*).“
 - b. „Някои смятат Ergot за болестно състояние на яйчника или семето.“
 - c. „Някои предполагат, че обикновени болестотворни причини (като влага, комбинирана с топлина) са достатъчни да породят това болестно състояние на зърното.“
 - d. „Някои приписват болестта на нападение от насекоми или други животни.“
 - e. „Някои, недоволни от досега предложените причини за болестта, се задоволяват да заявят, че Ergot е болест, но без да уточняват обстоятелствата, които я предизвикват.“
- Fluckiger и Hanbury заявяват: „Че тъканта на семето на ръжта, в процеса на развитие, не претърпява трансформация, а просто се разрушава.“

Нито по външна форма, нито по анатомична структура Ergot проявява каквото и да е сходство със семе, въпреки че развитието му се случва между времето на цъфтеж и момента, когато ръжта започва да зрее. Той е смятан за напълно оформена гъба и като такава е наречен от De Candolle *Sclerotium Claves*, а от Fries — *Spermoëdia Clavus*.

Докато Ergot остава в класа, не настъпва допълнителна промяна; но поставен върху влажна почва, се появяват интересни явления.

На определени места малки, кръгли участъци от кората се сгъват назад и постепенно изхвърлят малки бели главички. Те нарастват, докато външните слоеве на съседната тъкан постепенно губят своята твърдост и стават меки и по-скоро гранулирани, като същевременно клетките, от които са съставени, стават празни и разширени. Вътрешните клетки на Ergot запазват своите маслени капки непроменени.

Главичките придобиват сивкаво-жълт цвят, преминаващ в пурпурен, и накрая след няколко седмици се изтеглят към светлината на тънки, блестящи дръжки с бледо виолетов цвят. Дръжките често достигат един инч дължина с дебелина около половин линия.

Fluckiger допълва: „Ergot от ръж, събран от мен през август, поставен върху почва в градинска саксия и оставен на открито през зимата, започна да развива *Claviceps* на 20 март.“

Hering го нарича неопределена гъба и поради съмнителното положение, което дълго е заемал в научния свят, го класифицира, не без основание, като „Нозод“; и когато трябва да се реши съмнителен въпрос в Материя Медика, мнението на почитания и научен Hering заслужава внимание.

Нозод, казва той: „Е общият термин, даден на алкохолните екстракти от болестни продукти, погрешно наричани изопатични лекарства. Най-полезните и напълно доказани са **Hydrophobinum** и **Psorinum**. Към тези „Нозоди“ принадлежат **Ustilago maidis**, **Secale cornutum**, картофената гъба, амбратата от китовите, **Anthracin**, **Vaccinin**, **Variolin** и др. Подигравателните забележки на Trinks и други през 1826 срещу **Sepia** и невежествената опозиция срещу **Lachesis** са потънали в забвение през следващите десетилетия. Всички осъдителни забележки срещу **Hydrophobinum**, **Psorinum** и други „Нозоди“ ще срещнат същата съдба. Можем да си позволим да чакаме.“

Приготвяне :

За хомеопатична употреба Ergot от ръж трябва винаги да се приготвя пресен, тъй като се изяжда от малък акар, който унищожава вътрешността на зърното, оставяйки само черупка.

Ergot, съхраняван повече от година, трябва винаги да бъде отхвърлян по тази причина.

Медицинска история :

Сред писанията на древните не се намира ясно упоменаване на Ergot.

През 1089 френският историк Sigebert споменава епидемия в следния пасаж:

„Година на мор, особено в западните части на Лотарингия, където много хора станаха гнилоствни, вследствие на това, че вътрешностите им били погълнати от огъня на Св. Антоний. Крайниците им били изгнили и станали черни като въглен. Те или загивали мизерно, или, лишени от своите гнилоствни ръце и крака, били оставени за още помизерен живот. Освен това много недъгави били засегнати от контрактура на сухожилията.“

Епидемична болест в Хесия през 1596 първа привлякла вниманието на медицинската професия към Ergot като причина. Rathlaw, холандски акушер, го използвал през 1747, но едва тридесет години по-късно — 1777 — есетата на Desgranges, и особено тези на

Stearns и Prescott в Съединените щати, направили известни неговите лечебни свойства.

На употребата на ръжено брашно, повече или по-малко примесено с Ergot, се приписва страховитата болест, известна в съвременната медицина като ерготизъм, но в ранни времена под множество имена: *Morbus spasmodicus*, *Convulsivus Malignus*, *Epidemicus vel Cerealis*, *Convulsion Raphania*, *Ignus Sancti Antonia*. Сега има малко съмнение, че ужасните епидемии, случили се във Франция през X век и в Испания през XII век, са били причинени от Ergot.

Fluckiger и Hanbury казват: „През 1596 Хесия и съседните области били опустошени от ужасна напаст, която медицинският факултет на Марбург приписал на наличието на Ergot в житните култури, консумирани от населението. Същата болест се появила във Франция през 1630; във Voightland, Саксония, през 1648, 1649 и 1675; отново в различни части на Франция през 1650, 1670 и 1674. Фрайбург и околността били посетени от същата болест през 1702; други части на Швейцария през 1715–16; Саксония и Лужица през 1716; много други области на Германия през 1717, 1722, 1736 и 1741–42. Последната европейска епидемия се появила след дъждовния сезон на 1816 в Лотарингия и Бургундия и се оказала много фатална сред бедните.“

От време на време се появявали множество монографии, даващи повече или по-малко точни описания на различните епидемии, предполагаемо причинени главно от Ergot и други примеси във Франция, Германия и Швейцария. През 1825, година преди заминаването си за Южна Америка, Hering събрал тези монографии и ги оставил на Trinks, който ги допълнил чрез свой асистент и ги публикувал. Те съставляват първите 80 от 170-те авторитета в енциклопедията, взети от Hartlaub и Trinks. По-късните добавки са предимно токсикологични и клинични.

Dr. R. B. Johnstone от Pittsford, N.Y., пише:

„През 1883–84, по време на строежа на железницата West Shore, бях повикан да лекувам много от италианските работници за обрив, който се появяваше на различни места по тялото, но обикновено по раменете, шията и вътрешната повърхност на горните ръце. В повечето случаи беше само от дясната страна, но ако беше от двете, винаги беше по-лошо отдясно. Обривът започваше като малка точка, като убождане от игла, която скоро придобиваше вид на пъпка и накрая ставаше пустулозна и голяма колкото малък грах. Понякога се появяваха като големи фурункули (половин инч в основата), с тъмносин оттенък, преминаващ към нормалния цвят на кожата на инч или повече от центъра. Бяха изключително болезнени при допир, с болка, парене и сърбеж; по-добре от леко разтриване, по-лошо от чесане, по-лошо от топлина. Малките изсъхваха без цикатрикс, но големите се пълнеха бавно с ярко жълт гноеподобен материал или понякога кървава водниста течност, оставаха отворени

дни наред, с изключително болезнени ръбове и основа, и накрая отделяха гъста, мръсна, зловонна серозна течност. Бяха много лениви по характер и оставяха видима cicatricis. Хладен въздух облекчаваше сърбежа и паренето, но не болката. **Secale, Lachesis, Causticum** бяха основните лекарства. Научих, че италианците ядат много ръжен хляб, направен от много бедно и евтино брашно, докато други националности (които не ядат ръжен хляб) не страдаха изобщо. Приписах обрива на отравяне с Ergot в хляба; и ако пациентът се явеше без преводач, обикновено давах **Secale**, което лекуваше около седем от десет случая.“

„H. G. K., мелничар от Pittsford, N.Y., ми съобщи, че не може да мели ръж дори за кратко време. При влизане в ръжена мелница усещал стягане в гърлото, голяма трудност в дишането; затруднено вдишване; издишване, придружено от болезненост по целия гръден кош; тежест в гърдите; болезненост в гърдите; междуребрени болки; убождане на езика.

„Горните симптоми са характерни за мелене на ръж; при мелене на пшеница не се появяват. Той също съобщава, че в две ръжени мелници в Рочестър познава много хора, които страдат от същите симптоми, с добавка на обрив, особено по шията, гърдите, зад ушите и около кръста. Обривът е пустулозен, силно сърбящ и отделя жълт секрет. Един човек бил принуден да се откаже от меленето на ръж заради многото фурункули и карбункули. Напълно се възстановил след смяна на професията. Почти всички ръжени мелничари имат уголемени стави на пръстите и лоши зъби.“

Дневник на Mrs. M. F. Hathaway :

6 март 1885. — Взимала по едно прахче (**Secale 200**) всяка сутрин и вечер преди лягане, три дни, след това само вечер, една седмица.

9 март. — Усещане за болезнено място в задната част на основата на езика, ляво, сякаш се появява „афта“; не се усещаше през деня и изчезна след няколко дни.

10 и 11 март. — Леко фронтално главоболие и известна умствена обърканост, но не много неприятни. Болезнено място в основата на езика, дясно.

13 март. — Появили се петна с болезнено, натъртено усещане около и под лявото коляно. При оглед се открила подута зона с размер на половин долар, пурпурночервена. Към вечерта се появили три или четири подобни петна по-надолу по крака, около горната част на обувката, толкова болезнени, че едва понасяла допира на обувката, придружени от силен сърбеж, но били толкова болезнени, че не можела да ги чеше, и при допир предизвиквали отпадналост и гадно усещане.

14 март. — Главоболието и объркаността по-изразени, главно във фронталната област. Три или четири петна се появили на десния крак под коляното, със силен сърбеж и същото натъртено усещане.

15 март. — Появил се обрив под формата на обрив или малки пустули по лицето, главно отляво, много болезнени и чувствителни на допир. Започвали като фини точки, като убождане от игла или ужилване от насекомо, и постепенно нараствали до малки пустули с размер на грахово зърно. Усещали се като петната по краката, със същото болезнено, натъртено усещане в кожата на лицето и шията. Имало двадесет и осем малки пустули отляво на лицето и шията.

18 март. — Обривът се появил на лявото рамо, няколко малки пустули в група, със същата характерна болезненост. Спряла лекарството. Тъпо, тежко главоболие във фронталната област и очите; силно пулсиране. Преди менструацията (четири или пет дни) се наблюдавала тъмно оцветена левкорей, не много обилна, но придружена от умора и неприятно усещане в таза.

5 април. — Обривът по лицето, шията и раменете постепенно изчезнал, но оставил обезцветени, екхимозирани петна и участъци като остатъци от старо натъртване за няколко седмици, особено по долната част на крака.

18 април. — Менструацията се появила навреме, много обилна през първите три или четири дни, придружена от доста болка и неприятно болезнено усещане в таза (много повече от обичайното), но необичайно количество болка седмица преди менструацията. Потокът по-тъмен, много по-обилен (преди обилен само един ден) в продължение на четири дни. Значително съсирване. Потокът продължил десет дни, нещо което никога не се е случвало преди. Световъртеж през целия менструален период, с склонност да пада напред.

Била нападната по време на лекции от палпитация, която продължила почти целия следобед. Усещала сърцето да трепти и да прекъсва. Пулс 108 и 110. Силно пулсиране на каротидите, отпаднало няколко часа. Никога преди не е имала палпитация. Главоболие; пълно, пулсиращо, пръскащо, като главоболие от **Glonoine** (доказвала е Glonoine), само че не толкова болезнено при разклащане на главата.

Ум :

Тъп, полусънлив статус.

Нарушена способност за мислене.

Делир: тих; блуждаещ.

Мания: с склонност да хапе; със склонност да се дави.

Неудобство и депресия.

Страх от смъртта.

Тревожност, тъга, меланхолия.

Голяма тревога; обезумял от безпокойство.

Апатия, безразличие.

Постоянно стенание и страх от смъртта.

Голяма тревога и затруднено дишане.

Прекомерна тъга, постепенно преминаваща в веселост; говори и действа глупаво; ярост, последвана от непрекъснат дълбок сън.

Паралитични психични заболявания; държи се презрително и саркастично към близките си; блуждаещ говор и халюцинации; апатия и пълно изчезване на сетивата.

Смее се, пляска с ръце над главата си, изглежда извън себе си.

След спонтанен аборт.

Паметта отслабва.

Забравя имената на приятели, които среща ежедневно.

Объркване на ума.

Неприятни предчувствия.

Очаквани нещастия, сякаш ще загуби нещо много ценно.

Усещане за опиянение при събличане преди лягане (трети ден и няколко последователни вечери).

По време на цялото доказване изпитвах повдигнато настроение, чувствах се лек и възбуден.

Сензориум :

Безсъзнание, с тежък сън, предшествано от мравучкане в главата и крайниците.

Намаляване и загуба на сетивата — зрение, слух и др.

Всички сетива вцепенени.

Съзнанието изглежда продължава до последния дъх, и точно преди смъртта сякаш пациентът ще се подобри.

Зашеметяване; ступор.

Световъртеж: постоянно увеличаващ се; със зашеметяване и тежест в главата; залитане, неспособност да стои изправен; особено чувство на лекота в главата, особено в тилната област; като от опиянение; несигурна походка.

Тежест в главата и мравучкане в краката.

Усещане за опиянение при събличане.

Вътрешна глава :

Пулсации в главата с замайване, не може да ходи.

Болка и объркване най-вече в тилната област.

Конгестия към главата и гърдите.

Главоболие; хемикрания отляво.

Световъртеж през целия последен менструален период; склонност да пада напред.

Главата тежка.

Остра жилеща болка, преминаваща нагоре през лявото око към челото и лявата страна на главата; идваща на пристъпи.

Тъпо, тежко, понякога притискащо главоболие, най-силно отлясно; < в топла стая, но не > на открит въздух.

Тъпа болка от двете страни на главата, над и пред ушите, по-лоша в топла стая.

Понякога пулсиращо, и продължило с различна сила три седмици след спиране на лекарството.

Понякога полулатерално, предпочитащо дясната страна и челото.

Чувства се потисната; тъпа, тежка; боли всяка нощ; будеше ме нощем; > от закуска и упражнения.

Не можех да спя заради ужасното потискащо главоболие, простиращо се от тилната област нагоре през главата към очите.

Силна болка в тилната област, челото, слепоочията, зад очите < от натиск върху тила.

Главоболие < на открит въздух и при първо влизане в топла стая; като след яздене в студен северен вятър през зимата, когато при влизане в топла стая главата боли ужасно.

Повече или по-малко тъпо главоболие през цялото доказване, особено в челото и очите.

Главата пълна, пулсираща, пръскаща, като главоболие от **Glonoine**, макар не толкова болезнено при разклащане на главата.

Непрекъснато супраорбитално главоболие (развило се след седмица доказване).

Болка от челото към очите; парене в очите; без възпаление; болката пронизва очната ябълка назад.

Външна глава :

Косата пада.

Извиване на главата напред-назад.

Скалпът болезнен.

Скалпът болезнен; толкова чувствителен, че не може да понесе движение на косата.

Усещане сякаш косата е разделена на ново място или притисната от фиба.

Косата изглежда в корените сякаш луковиците са уголемени.

Скалпът леко розов на неправилни петна; появили се пъпки по скалпа; малки, много болезнени на допир, със слабо парене.

Очи и зрение :

Фотофобия.

Замъглено зрение; мъгливост пред очите.

Катаракта.

Двойно или тройно виждане.

Сини и огнени точки, летящи пред очите.

Болка в очите с усещане сякаш се въртят спазматично.

Бодежи в очите; натиск върху очните ябълки.

След епидемия от ръжната болест се появил необичайно голям брой катаракти при млади хора, двадесет и трима от които постепенно ослепели (петнадесет мъже и осем жени), придружени от главоболие, световъртеж и шум в ушите; от катарактите две били твърди, дванадесет меки и девет смесени.

Катаракта сенилис.

Супурация на роговицата; < от топли апликации.

Ретинитис диабетика.

Дилатация на зениците.

Потисната секреция на сълзи.

Инжекция на конюнктивата.

Очите хлътнали, заобиколени от синкав ръб.

Парализа на горните клепачи от въглищен газ.

Неподвижно състояние на клепачите след лицев еризипел.

Очите изглеждат фиксирани, диви, стъклени; втренчен поглед.

Пустулозна конюнктивит и блефарит.

Екзофталм с струма.

Екзофталмичен гуша.

Уши и слух :

Прекомерна чувствителност на слуха, дори най-лекият звук отеква в главата и я кара да потръпва.

Объркан слух; глухота.

След хорей.

Пеене в ушите и затруднен слух.

Бучене и шум в ушите, с периодична глухота.

Нос и обоняние :

Кихане.

Носът се усеща запушен, но воднисто течение изтича от него.

Носът запушен отляво, сякаш със солиден тап.

Кървене от носа: кръв тъмна, тече непрекъснато, с голяма прострация, малък, нишковиден пулс; при стари хора или пияници; при млади жени; от слабост.

Пасивен сутрешен епистаксис от лявата страна, яркочервен.

Сутрешно кървене от носа, нещо много необичайно; само отляво, пасивно, но яркочервено.

Носът запушен отляво, сякаш със солиден тап, но не много течение.

Носът болезнен на допир външно и вътрешно.

Кървене от носа не много обилно, повтарящо се няколко последователни дни.

Кървене от носа при всеки опит да го избърше.

Лице :

Лице: изпито, бледо, земно; хлътнало, хипократично, пепеляво; подуто; свито, обезцветено, със хлътнали очи, сини кръгове около очите; risus sardonicus; изкривено; бледо, тревожно.

Мравучкане в лицето.

Мускулни потрепвания обикновено започват в лицето и след това се разпространяват по цялото тяло, понякога усилващи се до танцуване и подскачане.

Спазматично изкривяване на устата и устните.

Чело горещо.

Тетанус на челюстта.

Устните смъртно бледи или синкави.

Потиснато, пълно с кръв по време на треска.

Лице и шия се усещат горещи, сякаш пълни с кръв и готови да се пръснат.

Зъби и венци :

Разхлабване на зъбите.

Скърцане със зъби.

Кървене от венците.

Трудно никнене на зъби; голяма слабост; повръщане на всичко прието; голяма жажда; бледо лице; очи замъглени, хлътнали; суха топлина, с бърз пулс; неспокойност и безсъние.

Вкус и език :

Език: гъсто покрит с жълтеникаво-бяло, сухо, лепкаво вещество; обезцветен, кафяв или черенкав; смъртно блед; студен и ливиден; чист, с сух, червен връх; червен връх и ръбове, центърът покрит.

Леко, но неприятно затопляне на езика през деня.

Спазъм на езика, изтласкващ го от устата, принуждаващ го между зъбите и правещ речта неясна.

Слаба, заекваща, неясна реч, сякаш езикът е парализиран.

Покрит жълтеникаво-кафяво по средата, страните чисти.

Вечер (втори ден) болезнено място на задната част на езика, ляво, сякаш се появява „афта“.

Вечер на третия ден същото болезнено усещане на езика, но отрядно.

Това не се усеща изобщо през деня.

Уста :

Кървава или жълтеникаво-зелена пiana на устата.

Повишена секреция на слюнка; пtiализъм.

Много кисела течност в устата.

Плюене на кръв.

Зловонен дъх.

Речта трудна, бавна и слаба, с усещане при всяко движение сякаш трябва да се преодолее съпротивление.

Сухота в устата.

Суха, но рядко жадна.

Парещо, сухо усещане, не облекчено от пиене.

Солен вкус.

Заеква неразбираеми думи между зъбите; речта трудна и заекваща; речта бавна и слаба, с усещане при всяко движение сякаш винаги има съпротивление за преодоляване.

Гърло :

Сухота на мекото небце, гърлото и хранопровода, с жажда.

Парене в гърлото с силна жажда.

Болезнено мравучкане в гърлото и върху езика.

Гърлото болезнено отляво, болката се изкачва към ухото.

Фоликуларен фарингит; изхвърляне на малки фоликуларни екsudати.

Дифтерия: загуба на сила; бърза загуба на чувствителност; изтръпване на крайниците; болезнено мравучкане и пълзене по езика; суха гангрена; апатия; разширени зеници; парещи болки в засегнатите части; заекваща реч; липса на всякаква реакция.

Силно парализиран както при преглъщане, така и при говорене; едва може да приема храна без голям риск от задушаване; речта сведена до шепот; не може да понася топлина или покриване и отхвърля всички покривки.

Следдифтеритна парализа.

Болезненост със сухота и усещане за стягане, по-добре при преглъщане; симптомите по-лоши сутрин.

Суровост, сухота и стягане в гърлото, без болка.

Гърлото болезнено отляво, болката се изкачва към ухото.

Гърлото отдясно червено, болезнено, с усещане сякаш е изградено от опънати и твърди влакна, леко дрезгаво.

По-късно гърлото се усеща стегнато, главно отдясно; дясната страна и задната част на гърлото възпалени, червени и „сковани“, известна болка при преглъщане.

(Не съм склонна към десностранно възпалено гърло, почти всички мои пристъпи от този вид са ограничени в лявата страна.)

Апетит, жажда, желания, отвращения :

Вълчи, ненаситен апетит, дори когато умира от изтощаващи изхождания.

Глад като след дълго гладуване.

Отвращение към храна, особено към месо и мазни неща.

Жажда: през всички стадии на треската; неутолима; за киселини.

Голяма жажда и сухота в устата и гърлото, с парене и мравучкане на езика.

Желание за: кисели неща; лимонада.

Хълцане, оригване, гадене и повръщане :

Оригвания: с неприятен вкус; кисели, безвкусни, но със субективна неприятна, емпирематична миризма; празни.

Гадене: склонност към повръщане; болезнени позиви; постоянно, < след хранене.

Прекомерно гадене и слабост, с много малко повръщане на тъмнокафява течност като утайка от кафе.

Повръщане: на храна; на жлъчка; на слуз; на зелена, зловонна, водниста течност, безболезнено и без усилие, с голяма слабост; веднага след хранене; на лумбрици; на кръв; черно повръщане.

Хематемеза, пациентът лежи неподвижно; голяма слабост, но без болка; коремът мек.

Скробикулум и стомах :

Чувствителност на епигастриума.

Тревожност и натиск в ямката на стомаха, с голяма чувствителност на допир.

Силна тревожност и парене в ямката на стомаха.

Болка в ямката на стомаха.

Силен натиск в стомаха, сякаш от тежест.

Топлина и усещане за препълване.

Парене в стомаха.

Болезнено стягане на епигастриума.

Голямо страдание и потиснатост в стомаха.

Жлъчно повръщане, с крампи в стомаха; парене в стомаха, простиращо се нагоре по хранопровода; глава отпусната върху гърдите, лице бледо, жълтеникаво, глас слаб, пулс малък.

Кардиалгия.

Пристъпи на силен натиск и стягане в областта на стомаха, простиращи се към гръбнака, изключително болезнени и последвани след половин час от повръщане на безвкусна течност или съдържанието на стомаха; след това настъпва интервал от няколко часа; по време на пристъпа областта на стомаха се усеща свита и при перкусия дава тимпаничен звук; има три до четири пристъпа дневно.

Кървене от стомаха; лежи неподвижно с голяма слабост, но без болка; лице, устни, език и ръце смъртно бледи; кожа покрита със студена пот, пулс чест, нишковиден; потиснатост; коремът мек, без болка.

Хематемеза.

Хематемеза; пристъпите предшествани от болки в епигастриума и гадене, болката отива към лявата страна при натиск върху епигастриума; ясно изпъкване в левия

хипохондриум, с болка; кръвта червена, без частици храна, и когато се събере в съд, изглежда повече като кървава серозна течност, отколкото чиста кръв, със зловонна миризма; количеството не е много голямо; честа студенина нощем, последвана от обилна пот; силата не е много намалена; апетитът и сънят добри.

Оригвания; с мирис на изгорен рог.

Апетитът много увеличен; бях много гладна, срамувах се да ям толкова, колкото ми се искаше.

Усещане сякаш съм обядвала с нарязано зеле.

Гадене след ставане от масата.

Усещане за прекомерна пълнота, ферментация, много газове.

Газове, клокочещи през стомаха и червата.

Уморено усещане, вид потиснатост и тежест под стомаха, присъстващо през голяма част от доказването.

Хипохондрий :

Уголемяване на черния дроб.

Възпаление и гангрена на черния дроб; остри болки в чернодробната област; език гъсто покрит с кафяво, лепкаво вещество; парене в гърлото; неутолима жажда; голяма слабост, но без болка; крайниците студени и покрити със студена пот.

Парене в слезката; тромбоза на коремните съдове.

Корем :

Раздуване на корема; тимпанит; метеоризъм.

Газове с клокочене.

Болезнена чувствителност и клокочене, с постоянна гадене и объркване на главата.

Склонност към колики, диария и подуване на корема.

Болка в долната част на корема, пречеща на изправена поза, дори принуждаваща го да лежи свит в леглото.

Колики с конвулсии.

Болка в корема с парене в стомаха.

Болки в хипогастралната област.

Болка в кръста като от фалшиви родилни болки.

Постоянно притискане надолу в долната част на корема.

Парене в корема.

Студено усещане в корема и гърба.

Силна пулсация в областта на пъпа.

Бучки и възли в корема; при заболявания на матката.

Аневризма на мезентериалната артерия при жени.

Коремът много раздути.

Раздуване на корема; много газове, сякаш скоро ще последва диария.

Спазматично потрепване на тънките черва близо до сигмоидната извивка, сякаш са вързани с връв, която се дърпа прекъснато.

По-лошо вечер, и по-добре от натиск и лежане на засегнатата страна.

Това продължи около три седмици.

Червата се усещаха слаби, болни, отпаднали, както през лятото след прекомерна консумация на плодове; без болка, но горещи и сухи вътрешно.

Червата не боляха и сякаш биха се облекчили от топлина, сухота и неприятното усещане, ако можех да изпия достатъчно вода, за да достигне до тях, което не можех да направя.

Нито пиенето на вода, нито клизма дадоха облекчение.

Изпражнения и ректум :

Диария: много изтощаваща, злокачествена; много зловонна; неволна, обилна, водниста, гнилоствна, кафява; изхвърляна с голяма сила; много изтощаваща; потисната урина; болезнена, с голяма прострация; безболезнена, с мравучкане и изтръпване в крайниците; гнилоствна, зловонна, коликвативна; пациентът не иска да бъде покрит или близо до топлина, предпочита въздух или да бъде ветрян; внезапни пристъпи; при деца — белезникави, воднисти изхвърляния; хронична при прехранени деца, голяма прострация; през август; големи неусвоени изпражнения или воднисти, понякога жълтеникави, също зеленикави, с силно изхвърляне, придружени от отделяне на газове; паралитична слабост на сфинктера на ануса с неволни изхвърляния.

Изпражнения: жълтеникави; зеленикави, кафеникави; воднисти и флокулентни; безцветни, воднисти; обилни; чести; гнилоствни; изхвърляни на струя; неволни; воднисти, слюзести, тънки, маслинено зелени; зловонни, воднисти; фетидни, тъмни; тънки, неволни; воднисти, жълтеникави или зеленикави, изхвърляни бързо с голяма сила и дори неволно; безболезнени, без усилие и с голяма слабост.

Преди изпражнение: режеща болка и клокочене в корема.

По време на изпражнение: режеща болка; голяма изтощаемост; студенина.

След изпражнение: изтощение.

Пет до десет минути след приемане на най-малкото количество храна — силна колика, която я кара да се сгъва и да вика; болката започва между областта на стомаха и пъпа, разпространява се към страните и останалата част на корема и надолу към сакралната област, придружена от силни позиви и тенежъм, последвана от тънко, слюзесто, жълтеникаво изпражнение с известно облекчение; четири до пет такива пристъпи следват един след друг; после облекчение до следващото хранене; четири до пет изхождания през нощта; сравнява болките с родилни; голяма жажда; дебело слюзесто покритие на езика; нарушен сън; прострация. Диария.

Неприятна пълнота в корема, с преходни щипещи болки в горната част на корема като от газове; нощем — силни режещи болки в целия корем; неспокойно тревожно въртене, с кратки, неосвежаващи дрямки; през нощта анусът плътно затворен, „сякаш заключен“; сутрин — чести кратки воднисти изхождания, на струя, предшествани от режещи болки в корема.

Изпражнения жълтеникаво-бели, слюзести, неусвоени, изтичащи неволно, < на разсъмване.

Диария.

Безкрайна диария през лятото, устойчива на всичко, особено при скрофулозни деца; гнилоствна, зловонна, коликативна; холерни симптоми, със студена лепкава пот; пристъпи на отпадналост в 3 сутринта (не неспокойната тревога на **Arsenicum**).

Коликативна диария.

Холерина с повече повръщане, отколкото гадене.

Cholera infantum; обилни неусвоени изпражнения, воднисти и много зловонни, изхвърляни на пристъпи и последвани от силна прострация; бледо лице, хлътнали очи, суха топлина, бърз пулс, неспокойност и безсъние; голяма неприязън към топлина и покриване.

Cholera infantum.

Световъртеж, крампи или дърпане в прасците, клокочене в корема, гадене, бързи последователни изхождания, кафеникави или безцветни, бърза прострация, студенина на крайниците, език леко покрит.

Обилни изтощаващи изхождания, силни болезнени крампи в краката, пръстите на краката, ръцете и пръстите, които се раздалечават или извиват назад; крампи в стомаха; суха, набръчкана, студена кожа; цианотичен цвят.

Холера.

Cholera infantum; cholera morbus; холера asiatica.

Пациентът студен, почти без пулс, със спазматични потрепвания на мускулите в различни части на тялото; раздалечава пръстите; очите хлътнали, чертите изпити; много спазматично гадене, макар не много повръщане; кожата груба, набръчкана, суха, сякаш няма влага в системата; потисната урина; мравучкане или пълзене по цялото тяло; изпражнения обилни, воднисти, изхвърляни с голяма сила; студен е, но не може да понесе покриване.

Холера.

Отвращение към топлина или покриване, с ледена студенина на крайниците.

Диария след холера.

Холера *asiatica*, с колапс, хлътнало, изкривено лице, особено устата; усещане за пълзене като от мравки.

Парализа на ректума: анус широко отворен.

Кървене от червата.

Запек.

Запек; сухи, тъмни, отделени, но трудни за изхвърляне.

Няма желание за дни; усеща сякаш ректумът е пълен.

Чести изхождания; светли, меки.

Диария: изпражнения малки, оскъдни.

Почти всеки път при уриниране през деня — малко изхождане.

Постоянно желание за изхождане.

Пикочни органи :

Задръжка на урина; урината бледа или кървава; отделяне на гъста черна кръв от бъбреците; замъгляване на зрението.

Скарлатина.

Диабет; голяма обща отпадналост; тежест в крайниците; загуба на сила; изтощение; гангрена; кожа суха и повяхнала; фурункули; петехии; треска с неутолима жажда; намалена сила на сетивата; сухота в устата; патологично силен апетит; кардиалгия; запек; диария; водниста урина; увеличено количество урина.

Хематурия при момче, страдащо от супурация на жлезите на шията след скарлатина; урината също много албуминозна; анасарка; голяма жажда.

Пасивно кръвотечение; кръвта тънка; липса на кръвни клетки вследствие на разтваряне; или безболезнено отделяне на гъста черна кръв вследствие на бъбречно заболяване; студенина на тялото; студена пот на челото; голяма слабост.

Хематурия.

Потисната урина; при въвеждане на катетър се отделя една гил тъмна, сливово оцветена урина, която изглежда пълна с песъчлив седимент и излъчва много неприятна миризма.

Неуспешни позиви за уриниране.

Ischuria paralytica.

Парализа на пикочния мехур.

Енуреза: при стари хора; бледа, водниста или кървава урина.

Пикочен седимент, изглеждащ като бяло сирене.

Кървава, албуминозна урина.

Отделяне на гъста черна кръв от пикочния мехур; заболявания на бъбреците.

Урината увеличена по количество, по-светла, отделяна по-често, особено нощем.

Млечна при престояване кратко време.

Натиск в пикочния мехур нощем.

Мъжки полови органи :

След лекота в тилната област — силно дърпане в семенната връв, причиняващо усещане сякаш тестисът се изтегля към ингвиналния пръстен.

След сексуален излишък — палпитация на сърцето.

Слаба памет след изтощителен коитус; импотентност.

Клонично спазматично стеснение на уретрата.

Женски полови органи :

Матка и десен яйчник силно конгестирани, много чувствителни на допир.

Болка в яйчниците и матката.

Болки в матката от експулсивен характер.

Продължителни притискащи и напъващи болки в матката при тънки и изпити жени.

Парещи болки в силно раздута матка, която се усеща твърда и болезнена на допир.

Гнилостен процес в матката; коремът раздути, не много болезнен; течение от влагалището — кафеникаво, зловонно; язви по външните гениталии — обезцветени и бързо разпространяващи се; гореща пареща треска, прекъсвана от треперещи студени тръпки; пулс малък, понякога интермитентен; голяма тревога, болка в ямката на стомаха, повръщане на разложено съдържимо; зловонна диария; потисната секреция на урина; кожата покрита с петехии и милиарни обриви или показва обезцветени, възпалени места с тенденция към некроза; пациентката лежи или в тих делир, или става дива от тревога и постоянно желание да излезе от леглото. Метрит.

Метрит; склонност към гнилост; възпаление, причинено от потискане на лохиите или менструацията; отделяне на тънка черна кръв, вид саньозен секрет, с мравучкане в краката и голяма слабост. Метрит.

Рак и гангрена на матката.

Маточни язви — усещат се като изгорени; отделяне на гнилостна, кървава течност.

Матката, преди това нормална, се спуснала така, че почти се показвала; била гореща и болезнена; ос отворен колкото среден пръст; силно желание за уриниране; родилни болки, облекчавани само от мокри превръзки или натиск върху корема; продължило три дни; не пометнала, въпреки че ос останал отворен; след това матката постепенно се издигнала, болките намалели и след пет-шест дни ос се свил; достигнала до осмия месец, когато пометнала.

Матката на около инч от долните лабии; мембраната около нея твърда, докато останалата част от вагиналната лигавица много отпусната и събрана на гънка в долната част.

Частичен пролапс на матката осем месеца след форцепсно раждане; дизурия; усещане за тежест над пубиса, сякаш съдържанието на корема ще падне напред.

Пролапс от три месеца; чести силни режещи болки в корема; понякога гадене.

Ужасно притискане надолу, дърпащо усещане в долната част на корема, така че животът ѝ е почти непоносим; на всеки четири-пет дни обилно, гъсто, жълто течение от влагалището; затруднено уриниране; ревматизъм.

Хистералгия.

Кървене от матката; привидна смърт на новородено дете.

Непрестанна метроррагия.

Маточно кръвотечение, когато матката е препълнена; с болки в сакрума, простиращи се надолу по бедрата и притискащи към долната част на корема при бременна жена; обилен, продължителен поток; разкъсваща, режеща колика; студени крайници и студена пот; слабост; кръвотечение < от най-леко движение; кръвта тънка и черна, черни съсиреци или кафява течност със зловонна миризма; черна течна кръв.

Жена, 45 г., преминала нормално раждане преди седем години; пометнала преди две години; кръвотечение продължило пет месеца под алопатично лечение, с обостряне по време на менструация; след прекъсване за седем месеца кръвотечението започнало отново с кратки интервали; силна анемия; хлътнали черти; кожа студена и суха; пулс малък и бърз; език силно обложен; загуба на апетит; главоболие; от пет дни — десет до дванадесет безболезнени изхождания дневно, слузести, воднисти, понякога зловонни; тънки, черни, зловонни кървави течения.

Слаба и силно изтощена; кожа отпусната; лице много бледо и хлътнало, с изражение на страдание; лигавици бледи и студени; ръце и крака без нормална топлина; сърдечна дейност ускорена; дишане кратко и потиснато; пулс много малък, 120; корем раздути; ос матки много отворен, с вдлъбнати и подпухнали ръбове, отпуснат и мек; влагалище чувствително и студено; мануален преглед причинява голямо безпокойство и кръвотечение; силно главоболие, ограничено в една точка; пулсации в слепоочията; шум в ушите; световъртеж при най-малко движение; отслабена нервна система с извънредна възбудимост; много пъти дневно, особено нощем — крампи в прасците и спазматични потрепвания на крайниците, причиняващи изтощение; остава няколко часа в леглото като парализирана; храносмилане и сън частично нарушени; кръвотечението продължава; дори в легнало положение и при повдигане на таза няма намаляване на голямото количество черни съсиреци, които постоянно излизат, докато най-малкото движение увеличава изтичането значително.

Хронично пасивно кръвотечение.

Маточно кръвотечение, потокът пасивен, тъмен и може да бъде зловонен; мравучкане или пълзене по цялото тяло; държи пръстите разперени; иска да ѝ разтриват крайниците; накрая лежи безсъзнателна и студена.

Метроррагия; отпуснато състояние на тялото; потиснато, тревожно настроение; необичайна сънливост през деня; изхвърляне на тънка черна кръв при най-малко движение; общо усещане за прострация; намалена телесна температура; дървено, изтръпнало усещане в долните крайници.

Маточно кръвотечение; не желае да бъде покрита, иска прозорците да са отворени, въпреки че стаята е много студена и повърхността на тялото като на труп.

Безболезнено кръвотечение при слаби, кахектично болни жени или такива, живели дълго в тропически климат.

След последното раждане менструацията твърде рядка и много нередовна; последния път доста обилна вследствие на необичайно усилие; нощем сънувала, че се качва по стълби с тежък товар и внезапно излязъл съсирек кръв и кръвта започнала да тече на струя; събудила се уплашена и открила, че кърви силно; на следващата сутрин силата много намалена; устни и цялото тяло, дори езикът — смъртно бледи; пулсът неуловим; чести припадъци; периодични болки с изхвърляне на съсиреци и между тях постоянно изтичане на тънка ярка кръв.

Прекомерно менструално течение на всеки две седмици, продължаващо седем до девет дни; последните четири седмици — непрекъснато; много слаба и тънка; силни болки в кръста и маточната област; притискащи болки като при раждане.

Менструация: твърде обилна и твърде продължителна; с разкъсваща и режеща колика, студени крайници, студена пот, голяма слабост и малък пулс; или с силни спазми.

Менструална кръв: тънка и черна, със съсиреци или кафява течност със зловонна миризма.

Менструална колика; болките толкова силни, че често причиняват спазми; маточната област много чувствителна на допир; висока температура; болките > когато потокът се появи.

Менструална колика; бледо лице; студени крайници; студена пот; малък, потиснат пулс; разкъсващи, режещи болки в корема.

Менструация нередовна; на всеки четири седмици за три до четири дни — обилно тъмночервено течение, с притискащи, родилни болки в корема; запек; натиск в

тилната област; след това — непрекъснато отделяне на водниста кръв до следващия цикъл.

Потисната менструация с болка.

Гангрена на цялата вагинална лигавица; при разтваряне на лабиите тази мембрана се вижда с тъмносив цвят, излъчваща характерната миризма.

Вагината гореща или хладна.

Течение от влагалището почти черно, течено и много зловонно.

Левкорей: при тънки, изпити жени, с пролапс на матката; зелена, кафява, зловонна; като сметана, от слабост и венозна конгестия.

Язви по външните гениталии, обезцветени и бързо разпространяващи се.

Остри болки в лявата яйчникова област седмица преди менструацията.

Менструацията седмица по-рано (преди винаги била точно навреме).

Поток яркочервен и съсирващ се; много съсиреци.

Зловонен мирис; студена трупна миризма.

Преди менструацията (четири или пет дни) се наблюдава тъмно оцветена левкорей, не много обилна, но с много неприятно усещане в таза.

Менструацията се появи много обилна, продължи десет дни, но само първите три-четири дни била много обилна, придружена от много болка и неприятно болезнено усещане (повече от обичайното), и тъпо главоболие през цялото доказване, особено в челото и очите.

Катаменията настъпили навреме.

Потокът лесен, обилен, безболезнен и напълно без съсиреци.

Изхвърлена мембрана.

Периодът приключи (петия ден), напълно без дискомфорт.

При втория период потокът бил с добър цвят, по-скоро течен, с няколко съсиреци.

Непрекъснато движение го спряло на втория ден, но не се появили болки в гърба, главоболие или други неприятни симптоми.

Следващият период се появил навреме „с малко предупредителни симптоми“, но с усещане през целия ден, сякаш трябва да стоя неподвижно, иначе потокът ще се спре.

Изхвърлена мембрана.

След четири дни менструацията приключила.

(През пролетните месеци на последните две години съм изхвърляла мембрани по време на месечния период, но никога преди в последователни месеци.)

Потокът обикновено е придружен от неприятни усещания и винаги е силно съсирен.

Левкорей седмица преди менструацията, течение като белтък на яйце (много пъти дневно), променящо се точно преди менструацията в жълтеникаво, зловонно течение; дразнещо; облекчава се от измиване на частите със студена вода.

След менструацията — остри болки в матката и тазовата област, с дърпащо, притискащо надолу усещане и болка през кръста.

Гениталните органи се усещат сякаш пълни с гореща кръв, притиснати до краен предел.

Повърхността не гори, но се усеща сякаш кръвоносните съдове са изпълнени с гореща кръв.

Матката пролабирала; областта болезнена на допир.

Това състояние продължило седмици.

Менструацията седмица по-рано, твърде обилна и, което е много необичайно, придружена от много притискаща, напъваща болка.

Втория месец — четири дни по-рано, потокът по-тъмен от обичайното и зловонен, но не съсирен; продължава два дни повече и е твърде обилен, но не отслабващ.

Световъртеж по време на менструацията, с болка и тежест в таза седмица преди менструацията.

Необичайно количество болка и тежест в таза седмица преди менструацията.

Потокът по-тъмен, много по-обилен (преди обилен само един ден), но този път продължил четири дни.

Значително съсирване.

Бременност. Раждане. Лактация :

Задържано развитие на плода.

Кървене по време на бременност.

Заплашващ аборт: особено в третия месец; с обилен поток от черна, течна кръв; фалшиви родилни болки с кърваво течение; при слаби, кахектично болни жени, с бледо, тревожно лице, пулс почти изчезнал, страх от смърт; конвулсивни движения.

Изключително силни болки, почти без прекъсване; изглежда сякаш е в последния стадий на раждане, но при преглед ос е с размер на половин долар, дебел и леко ригиден.

Изключително силни притискащи родилни болки, но ос е само колкото монета от десет цента; хистерични конвулсии.

При около седем и половина месеца бременност — родилни болки, въртящи се и неясно прекъсващи; ос отворен, колкото шилинг; тъпа болка и тежест в главата; унилоост.

Склонност към аборт в третия месец; имала пет аборта, въпреки че оставала в леглото веднага щом забременее; някои родилни болки с кърваво течение; успяла да стигне до термин.

След вдигане на тежък товар в шестия месец — силни болки в стомаха, корема и кръста, усещане за притискане надолу; силни движения на плода; студени крака; изтръпване и мравучкане в краката; пулс малък, слаб.

След аборт — трудна контракция на матката; тънко, черно, зловонно течение.

Задържана плацента след аборт, особено при ранни месеци; зловонни течения; пациентката студена и почти без пулс от загуба на кръв; маточните контракции много слаби или продължителни тонични.

В осмия месец — силни конвулсии с пана на устата, последвани от променливи спазми; безсъзнание и клонични спазми, < при всяка болка; при връщане на съзнанието — тъпо фронтално и тилно главоболие и непрекъснати маточни болки.

Преждевременно раждане.

По време на бременност: чести и продължителни напъващи болки, особено при тънки, недохранени жени; крампи в прасците.

Маточни болки — продължителни, но неефективни.

Усещане за постоянен тоничен натиск в маточната област; причинява голямо страдание; желае свеж въздух; не обича да бъде покрита.

Контракция тип „пясъчен часовник“.

По време на раждане: продължителни притискащи и напъващи болки; болките нередовни; твърде слаби; отслабващи или спиращи; всичко изглежда отпуснато и отворено, без действие; припадъци.

Силата на матката отслабена от твърде ранни или неправилни усилия.

Тънки, изпити жени, кожа набръчкана, суха и груба, жълтеникаво лице, слаби при раждане; болките сякаш напълно липсват; матката отпусната; притискане в сакралната област, вид продължително напъване в корема.

Докато главата преминавала през долния отвор, внезапно била нападната от силни конвулсии, продължили три-четири минути, последвани от ступор с стридорозно дишане и неспокойно стенание като от болка.

Раждането спира, започват потрепвания или конвулсии.

Пуерпериални конвулсии с опистотонус.

Задържана плацента, с постоянно силно притискане надолу в корема или с отпуснато усещане на частите.

След раждане — бледа, слаба; матката раздута, парещи болки в нея, твърда, болезнена при най-малък допир; отделяне на черна, съсирена или кафява, водниста, зловонна кръв; пулсиращи, разкъсващи болки в бедрата, простиращи се до пръстите; болка < от движение; силни пулсации в областта на пъпа, осезаеми с ръка; пулс слаб и бърз; често прозяване.

Следродилно кръвотечение, с отпусната матка, временно облекчено от компресия; болките силни, < когато детето суче.

Следродилни болки — твърде дълги и твърде болезнени.

Силни следродилни болки с кръвотечение от неправилни контракции; само надлъжните влакна се свиват, оставяйки бразда по средата, сякаш матката е разцепена отгоре надолу.

Спиране на лохиите с треска; възпаление на матката; по-късно абсцес, отворил се през влагалището.

Лохии: тъмни, много зловонни; оскъдни или обилни; безболезнени или с продължително притискане надолу; потиснати, последвани от метрит; внезапно променят характера си и стават мръснокафяви или шоколадови, със зловонна миризма; пациентката става тъжна, меланхолична и се страхува от смърт; твърде продължителни.

Треска с чести воднисти изхождания.

Пуерпериална треска.

Силна склонност към гнилоост; отделяне на саньозна кръв, с мравучкане в краката и голяма прострация; потисната урина; зловонна диария; глас кух, с трудно дишане, слаб и неясен; пареща треска, прекъсвана от треперещи студени тръпки; не желае да бъде покрита; студени крайници; студена пот по цялото тяло; гангрена.

Потискане на млякото; млякото не потича от гърдата.

Липса на мляко с много жилещи болки в гърдите.

При жени силно изтощени от венозно кръвотечение; тънки, изпити жени; гърдите не се изпълват правилно.

Тънки, изпити деца с набръчкана кожа; спазматични потрепвания, внезапни писъци, трескавост.

Отпуснат корем.

Подпомага изхвърлянето на чужди тела от матката.

Омъжена жена, 25 г., със силна болка в тазовата област; силно притискане надолу; мъчителен ректален и везикален тенезъм; неспокоен сън; висока температура; силно обложен език.

Диагностициран субперитонеален хематоцеле.

Туморът бързо нараствал, с повишена температура; пулс 130–150; език сух, тъмнокафяв; корички по зъбите; вагинални секрети зловонни; често и силно уриниране; слузеста дизентерия с повишен тенезъм; лице изразяващо силно страдание. Под действие на **Secale** туморът се изхвърлил през ректума — голямо количество тъмна, гъста кръв — пациентката постепенно се възстановила.

Глас и ларинкс. Трахея и бронхи :

Глас: кух, дрезгав, с затруднено дишане; слаб и неясен; слаб, неразбираем, заекващ.

Удебеляване на лигавицата на дихателните пътища.

Белите дробове по време на студени тръпки се усещат сякаш дишането вее въздух.

Дишане :

Дишане: бавно; затруднено и тревожно; потиснато; стенещо; постоянно въздишане; хълцане.

Понякога кръв се отхрачва при силни усилия за дишане.

Белите дробове по време на студени тръпки се усещат сякаш дишането вее въздух върху напълно суха повърхност; само по време на студени тръпки.

Остри болки през лявата гръдна половина, особено при ходене.

Кашлица :

Твърда, дрезгава кашлица, с малко експекторация.

Конвулсивна кашлица; обилна пот; безсънни нощи; склонност към колики; диария; подуване на корема; емфизем.

Бронхит.

Плюене на кръв, със или без кашлица.

Вътрешна гръдна област и бели дробове :

Крамп в гърдите.

Болки над почти цялата предна част на гръдния кош, < от кашляне и движение.

Експекторация на тъмна, пенеста, по-скоро вискозна кръв, изкашляна с лека кашлица, достигаща до една чаена чаша за четири часа; петно с размер на монета от един шилинг вдясно от зърното, тъпо при перкусия, с бронхиално дишане и мукозен хрип над тази област.

Сърце, пулс и циркулация :

Палпитация; горещо чело; склонност към сън; спазматични удари от дясната половина на гърдите към дясната ръка и крак; на пристъпи на всеки два-три часа; по-често нощем, след всяко хранене; по-малко на открит въздух; студенина и изтръпване на дясната ръка, с мравучкане в четвъртия и петия пръст; загуба на мускулна сила и усещане в ръката; след сексуален излишък.

Палпитация на сърцето; с стегнат и често интермитентен пулс.

Пулс: често непроменен дори при силни пристъпи; обикновено бавен и стегнат, понякога интермитентен или потиснат; леко ускорен при топлина; малък; празен, слаб; нишковиден при кръвотечения.

По време на цялото доказване — палпитация на сърцето (нещо, което никога преди не съм имала); усещах сърцето да трепти и да прекъсва.

Палпитация почти целия следобед.

Силно пулсиране на каротидите; отпадналост няколко часа.

Бях нападната по време на лекции от палпитация, която продължи около осем часа.

Пулс 108 и 110.

Шия и гръб :

Тумори на шията, отделящи жълт гной.

Леко, пълзящо усещане в гръба, сякаш мек въздух преминава през него.

Мравучкане в гръба, простиращо се към пръстите на ръцете и краката.

Болка в кръста.

Бодеж в гръба.

Внезапно „заклещване“ или „изкривяване“ в гръба.

Болки в сакрума с притискане надолу, сякаш част ще бъде изтласкана навън, < при движение.

Твърда, дрезгава кашлица, с малко експекторация; болки почти по цялата предна част на гърдите, < от кашляне и движение; от няколко години — чувствителност на долните шийни и горните гръдни израстъци, със скованост на шията; < от всяко усилие или напрежение върху гръбнака; натиск върху болната част на гръбнака причинява болка там, както и през гърдите, с дразнене за кашлица.

Бодежи в горните гръдни прешлени (между раменете), постоянни при седене, прекъсващи при стоене, понякога простиращи се към ръцете, < от натиск върху прешлените; често мравучкане през всички крайници; понякога ригидност и спазматично изпъване на пръстите, така че за няколко минути не може да шие; често натиск и подуване под епигастриума; болка в гръба < при шиене.

Силна болка в гръба, особено в сакралната област; анестезия и парализа на крайниците; конвулсивни потрепвания и удари в парализираните крайници; болезнена контракция на флексорните мускули; парализа на пикочния мехур и ректума.

Миелит.

Миелитис дифуза.

Параплегия, предшествана от крампи и мускулни болки.

Трудна, залитаща походка; пълна неспособност за ходене, не поради липса на сила, а поради особена неспособност за извършване на леки движения с крайниците и ръцете; контракция на долните крайници, поради която пациентът залита; треперене

на крайниците, понякога придружено от болки; мравучкане на ръцете и краката; прекомерно усещане за топлина, с отвращение към топлина или покриване.

Болест на гръбнака с *gressus vaccinus*.

Мускулите на шията сковани, болезнени.

Раменните лопатки и ключицата болезнени, сякаш изкълчени или извити.

Гърбът боли; усеща се слаб, особено в сакрума.

Остри, променливи болки във всички части на тялото.

Горни крайници :

Ръцете изтръпват.

Груб обрив по цялата ръка.

Спазматични потрепвания на ръката, с флексия на ръката в китката или на предмишницата.

Изтръпване и нечувствителност на ръцете и ръцете.

Парене в ръцете.

Ръцете смъртно бледи.

Студенина и изтръпване на дясната ръка с мравучкане на безименния и малкия пръст.

Загуба на усещане по гърба на пръстите.

Загуба на мускулна сила и усещане в ръката.

Пръстите конвулсивно извити към дланта, обхващайки палеца.

Контракция на пръстите.

Пръстите извити назад или спазматично абдуцирани.

Левият палец спазматично изтеглен към гърба на ръката, последван след няколко минути от крампи и флексия на останалите пръсти към дланта; ръцете се усещат изтръпнали като кадифе; на следващия ден и двете ръце били засегнати и след няколко дни се появило мравучкане и бодежи в краката, последвани от тежест в тях, < след ходене, обикновено появяващо се при седене, докато крампите в ръцете винаги се появяват след употребата им.

Загуба на усещане в върховете на пръстите.

Изтръпване на върховете на пръстите.

Пълзящо усещане в върховете на пръстите, сякаш нещо живо се движи под кожата или сякаш пръстите са изтръпнали, като от натиск върху ръката.

Особено жилещо усещане в върховете на пръстите; чувствителни към студ.

Болезнено подуване на пръстите.

Силни болки в върховете на пръстите.

Гангрена на пръстите; сенилна гангрена.

Променливи болки, първо през ръцете от един пръст към друг, после през китката.

Китката отслабена, така че било болезнено да се вдигат тежести.

Усещане за парене на лявата ръка, сякаш раздразнена с кайенски пипер; топла след разтриване.

Тъпа, спазматична болка от рамото към лакътя по медианния нерв, по-лошо отядасно и сутрин.

Долни крайници :

Чукаща, разкъсваща болка в двата бедра, усилваща се при движение.

Краката тежки и уморени.

Мравучкане в краката.

Пълзящо усещане в предната бедрена и задната тибиална област.

Влачене на краката при ходене, сякаш стъпалата се влачат по земята.

Ревматични болки в ставите.

Крампи в прасците и ходилата, нарушаващи съня нощем и затрудняващи ходенето при бременни жени.

След пристъп от холера — крампи в прасците и усещане за изтръпване и мравучкане в пръстите на краката.

Крамп в прасците.

Парене в ходилата.

Краката сякаш са заспали и сковани.

Пръстите на десния крак спазматично извити нагоре, непрекъснато през деня и понякога нощем, причинявайки особена накуцваща походка; този крамп не е придружен от болка, а от много уморително усещане, правещо ходенето, особено

качването и слизането по стълби, много трудно; сухожилията по гърба на ходилото към пръстите напрегнати като жици, а съответните мускули на крака — по-големи и по-твърди от нормалното; понякога леко усещане за студ в гърба и особено бърмчащо (формикационно) усещане в гръбнака.

Подуване на краката с черни петна.

Начало на сенилна гангрена; подуване и ливиден цвят на десния крак, простиращ се до малеолите; кракът студен; силни, неописуеми болки.

Сенилна гангрена започваща в големия пръст на десния крак и бавно разпространяваща се; кракът ливиден и подут; всички симптоми сочат към пълната му загуба.

Суха гангрена на крака с постоянни силни, парещи, разкъсващи болки.

Силни болки в ходилата и пръстите; черно петно на плантарната повърхност на петата; пръстите ливидни, сини, студени; парещи болки; кракът подут; ходенето невъзможно.

Сенилна гангрена.

Обилна, зловонна и корозивна пот на краката, омекотяваща и избелваща ходилата и бързо разрушаваща чорапи и обувки; продължаваща два месеца при момиче на осемнадесет години.

Мравучкане в пръстите на краката.

Гангрена на пръстите.

Променливи болки през глезените и коленете.

Краката толкова слаби, че отказват при ходене.

Коленете толкова слаби, че едва достига върха на стълбите.

Краката внезапно „отказват“.

Отпадналост, слабост, тежест, треперене на крайниците.

Крайниците студени; покрити със студена пот.

Формикация; бодежи; мравучкане; изтръпване; нечувствителност на крайниците.

Спазматични болки; дърпане и пълзене в крайниците.

Парене в ръцете и краката.

Мъхесто усещане в крайниците.

Крампи в ръката и пръстите на краката.

Болезнени потрепвания в крайниците нощем.

Най-силни конвулсивни движения на крайниците, появяващи се няколко пъти дневно; между пристъпите пръстите изтръпнали и често контрактурирани.

Внезапни периодични контракции на крайниците, с напрегната болка.

Контракции на ръце, крака, пръсти и пръсти на краката.

Гангрена на крайниците; крайниците внезапно стават студени, оловносиви и губят всякакво усещане.

Параплегия.

Вътрешната болка много < от топлина, било на леглото или на въздуха; малко > при излагане на по-хладна атмосфера, макар и тогава едва поносима; болката постепенно се разпространява от пръстите към краката и бедрата, и от пръстите към ръцете и раменете; настъпва гангрена.

Най-малката болка липсва в гангренозния крайник при убождане или рязане, макар движението често да не е напълно загубено.

Пълна нечувствителност на върховете на пръстите на ръцете и краката.

Студена гангрена на крайниците.

Истински антракс, бързо преминаващ в гангрена.

Ръцете и краката подути с гангренозен, черен и супуриращ обрив.

Болка с известно подуване без възпаление, последвана от студенина, син цвят, студена гангрена и смърт на крайника.

Крайниците стават студени, бледи и набръчкани, сякаш са били дълго време в гореща вода.

Болели са ме много.

Няма сила в крайниците или между раменете.

Радвам се да седна; твърде слаба да говоря; уморена.

Покой. Положение. Движение :

Трябва да лежи свит на две в леглото; болка в корема.

При седене: бодежи в прешлените, постоянни; не може да се навежда напред или назад без да губи равновесие.

Държи ръцете с широко разперени пръсти.

При стоене: боджите в прешлените прекъсващи.

Неспособност да стои изправен: световъртеж.

Всяко усилие: чувствителността на шийния израстък <.

Движение: кръвотечение <; световъртеж; след родилни болки <; болки в гърдите <; болки в сакрума <; разкъсване в бедрата <.

При ходене: тежест в краката >; невъзможно при гангрена.

При всеки опит да ходи — коленете се подгъват под него.

Не може да ходи; световъртеж.

Нерви :

Хиперестезия на кожните нерви, особено на гръбнака.

Усещане за болезненост в корема; образуване на големи бучки и подувания в корема; дясната ръка много слаба, особено пръстите, така че не може да държи нищо; не може да шие с тази ръка; при поставяне на отворена ръка до тялото и отдръпването ѝ настъпва спазъм — пръстите се разперват и не може да затвори ръката; бързи редувания на топлина и студ в ръцете и краката; крампи в краката; ледена студенина на коленете; треперене на дясната ръка и ръката при хранене, трябва да използва лявата; усещане за студ в стомаха, > за кратко от топли напитки; хроничен запек.

Парене: във всички части на тялото, сякаш искри от огън падат върху тях.

Невралгия, причинена от натиск на раздути вени върху нервен ствол.

Спазматични потрепвания.

Нередовни движения на цялото тяло.

Спазматично изкривяване на крайниците, облекчено от изпъване.

Изражението на лицето се променя всяка секунда от непрекъснатата игра на мускулите; очите се въртят, зениците разширени, езикът се изтласква, главата се движи от страна на страна; ръцете в непрекъснато движение с най-различни жестове; грабва предмети вместо да ги взема, не може да държи нищо сигурно; торсът също в непрекъснато движение; урината не може да се задържи; пулс малък, слаб, бърз; сърцето бие бурно; апетит слаб; червата лениви; болка в тилната област; усещане за мравучкане в крайниците; отслабена памет; речта трудна, прибързана; без облекчение нощем; залита из къщата почти цяла нощ.

Хорея, свързана с менструални нарушения.

Мускулните потрепвания обикновено започват в лицето и се разпространяват по цялото тяло, понякога се усилват до танцуване и подскочане.

Спазми с разперени пръсти.

Конвулсивни удари и потрепвания в парализирани крайници.

Болезнени контракции на флексорните мускули.

Тетанични спазми, с пълно съзнание, последвани от голяма отпадналост.

Конвулсии.

Тонични спазми.

Епилептиформени спазми; епилепсия.

Оплаква се от голяма слабост, запек, тежест в епигастриума, мравучкане в краката и крампи; нощем, докато спи, получава епилептиформени пристъпи, за които не знае нищо на следващата сутрин, освен че се чувства много изтощена и има постоянна тежест в главата.

След аборт — спазми с пълно съзнание, след това голяма отпадналост; тежест в главата и мравучкане в краката.

Конвулсии, появили се първо след уплаха като малко момиче, връщащи се след всяко раждане.

Потрепване на отделни мускули, въртене на главата напред-назад; изкривяване на ръцете и краката; затруднено и тревожно дишане.

Изтръпване на крайниците; парализа на някои части; болезнено мравучкане (като пълзене на мравки) на езика.

Парализа след спазъм и апоплексия, с бързо отслабване на засегнатите части и неволни изхождания от червата и пикочния мехур.

Внезапно паднал на земята, но без загуба на съзнание; при всеки опит да ходи коленете се подгъват; особено десните; при седене не може да се навежда напред или назад без да губи равновесие; ръцете леко слаби, усещането за допир не е засегнато; обща отпадналост; трудна реч; склонност към плач; оплаквания от главоболие и болка в лумбалната област; лош сън; урината и изпражненията изтичат неволно; няма изхождане няколко дни; понякога затруднено дишане.

Парализа на долните крайници при жена след климактериума; твърд, чувствителен тумор в една от гърдите се развивал няколко години, но последните една-две години бързо нараснал и станал много болезнен; след продължително приложение на

жълтеникав мехлем туморът бил отстранен; около месец след спиране на мехлема се появило особено изтръпване в големите пръсти, което се разпространило към целия крак и глезена; краката изглеждали големи и тежки и можели да се движат само чрез движение на целия крайник; походката влачеща, сякаш краката се влачат при повдигане; леко изтръпване в ръцете.

Парализа с бързо отслабване, с отпускане на сфинктерите.

Миелит и омекване на гръбначния мозък.

Треперене; нестабилност на цялото тяло.

Неспокойност; крайна слабост и прострация.

Загуба на способността за волево движение.

Припадъци от диария, в 3 сутринта.

Колапс от холероподобни заболявания, със студена кожа, но неспособност да понесе топлина.

Сън :

Често прозяване.

Склонност към сън; сънливост; дълбок, тежък сън, ступор.

Сънят нощем нарушен от ужасни сънища.

Неспокойна и безсънна.

Нарушен от мъчителни сънища.

Заобиколена от опасности, постоянно опитва да избяга от злини.

Понякога семейството ми беше болно до смърт, или къщата в пламъци; друг път наливах вода от едно ведро в друго, за да го освободя от гущери и влечуги, които пълзяха по стените на съда и застрашаваха децата ми.

Нощ след нощ сънищата ми продължаваха в този характер.

Събуждах се, главата ми беше в такова страдание, не от болка, а от потиснатост.

Обръщах възглавницата и сменях положението си, за да се опитам да забравя сънищата, и след известно време отново заспивах, за да бъда събудена от друг, също толкова неприятен сън.

Това състояние на главата и съня продължи шест или седем седмици. (17 ноември до 5 януари).

Време :

В 3 сутринта: пристъпи на отпадналост.

На разсъмване: диария.

Сутрин: чести кратки изхождания.

През деня: топлина на езика; необичайна сънливост; пръстите на краката извити нагоре непрекъснато.

През нощта: анусът плътно затворен; крампи в прасците и потрепвания на крайниците; сънувала, че се качва по стълби; палпитация; пръстите на краката понякога извити нагоре.

Потрепвания в крайниците; залитане из къщата с хорей; язви <.

Температура и време :

Открит въздух: палпитацията по-малка.

Иска да бъде на въздух или да бъде ветряна: при диария.

Топли апликации: супурация на роговицата <; язви <.

Топли напитки: студът в стомаха <.

Не желае да бъде покрита: при диария; при маточно кръвотечение.

Топлина: не може да я понесе и отхвърля всички покривки при следдифтеритна парализа; при диария не желае да бъде близо до топлина; отвращение към топлина при холера; вътрешната болка много <; гангрена <.

Мокри превръзки: > родилни болки.

Студ: язви >; гангрена >.

Треска :

Неприятно усещане за студ в гърба, корема и крайниците.

Кожа студена, с треперене.

Студена повърхност на тялото, особено крайниците.

Силна, но кратка студена тръпка; скоро последвана от вътрешна пареща топлина, с голяма жажда.

Студенина с жажда.

Силно треперене, последвано от силна топлина, с тревога, делир и почти неутолима жажда.

Интензивна, ледена студенина на кожата, с треперене; бледо, хлътнало лице.

Студени крайници, студена пот, слабост.

Студеният стадий предшестван от повръщане, последван от умерено изпотяване.

Силна и продължителна суха топлина, с голяма неспокойност и силна жажда.

Топлина с жажда и гореща кожа.

Пареща топлина, прекъсвана от треперещи студени тръпки, след това вътрешна пареща топлина, с голяма жажда.

Пот: по цялото тяло, освен лицето; обилна студена; студени крайници; от главата до ямката на стомаха; особено по горната част на тялото; студена, лепкава по цялото тяло; коливативна.

Изтощаваща пот, придружена от вечерна треска и тревожна кашлица.

Студена повърхност; хлътнало бледо лице и сини устни; не желае да бъде покрита; мравучкане в крайниците; държи ръцете с широко разперени пръсти; студена, лепкава пот; речта слаба, заекваща. *Агюе*.

Отвращение към топлина или покриване; може да се чувства студена, но не желае да бъде покрита.

Голяма склонност към тифоидни състояния.

Интермитентна.

Студено усещане от най-малко движение в леглото нощем, не > от покриване.

Студенина по цялото тяло, особено раменете и гърба, но без треперене.

Държи крайниците свити близо до тялото, твърде студени, за да бъдат изпънати; болят, но са твърде студени, за да бъдат изпънати.

Крайниците и цялото тяло болят сякаш са уморени и схванати, особено бедрата и коленете.

Затопля се около 5 сутринта, тогава ръцете, гърдите и гърбът влажни от пот.

Студена тръпка в 11 сутринта, продължаваща три часа.

Студени тръпки пълзят нагоре и надолу по гърба между раменете, разпространявайки се към крайниците.

Студени тръпки в гърба нагоре и надолу по гръбнака.

Треската последвана от голяма потиснатост на лицето и главата.

Постоянно желание за свеж въздух, макар ходенето да влошава главоболието, особено над очите и през челото.

Лека сутрин.

Ръцете, гърбът и гърдите влажни от пот около 5 сутринта.

Силна студена тръпка от 4 сутринта до 10 сутринта, в кръста, по гръбнака; по време на студената тръпка — стрелкащи болки главно в краката и ръцете; много жажда по време на студената тръпка, малко жажда по време или след треската; лека пот; сухота в устата; постоянно желание за пиене; силно гадене; повръщане на голямо количество жлъчка; повърхностна конгестия; вените на крайниците много пълни.

Мъж, 67 г., страда от емфизем и астма; сърдечни усложнения с хипертрофия и слаб, бърз, неравномерен пулс; < при качване по стълби и ходене.

От две-три години — пристъпи на силна студенина, появяващи се нередовно, последвани от голяма умора два дни.

Ръцете и краката ставали бледи и студени, с интензивно усещане за умора; известно пулсиране в главата, която изглеждала топла; след няколко часа крайниците отново се затопляли, оставайки само умора.

Температурата нормална по време на пристъпите; артериосклерозата вероятно поради напрежение на артериите и последваща анемия.

Aconite, Arsenic, Cedron, Chin. sulf. давали само временно облекчение; **Secale** излекувало. — Tessier.

Пристъпи. Периодичност :

Внезапни пристъпи: диария.

Редуване: топлина и студ в ръцете и краката.

Пет до десет минути след приемане на най-малкото количество храна — силна колика.

На всеки два или три часа: пристъпи на палпитация.

Няколко пъти дневно: конвулсивни движения на крайниците.

В продължение на няколко седмици: мравучкане в върховете на пръстите.

На всеки две седмици: прекомерно менструално течение; продължаващо седем до девет дни.

В продължение на две седмици: обилна корозивна пот на краката.

В продължение на четири седмици: потокът е непрекъснат.

През август: диария.

През лятото: безкрайна диария.

В продължение на няколко години: чувствителност на шийния израстък.

Локализация и посока :

Дясно: яйчник конгестиран; петно на гръдната страна тъпо при перкусия; спазматични удари от половината гръден кош към ръката и крака; студенина на ръката; пръстите на крака извити нагоре; подуване и ливиден цвят на крака; гангрена в големия пръст; ръката много слаба; треперене на ръката и ръката.

Ляво: хемикрания; носът запушен; гърлото болезнено; изпъкване в хипохондриума; палецът спазматично изтеглен към гърба на ръката.

Усещания :

Сякаш опиянена при събличане; сякаш очите се въртят спазматично; сякаш твърд тап в носа; сякаш езикът е парализиран; сякаш има съпротивление при говорене; сякаш тежест в стомаха; областта на стомаха сякаш свита; анусът сякаш заключен; сякаш тестисите се изтеглят към ингвиналния пръстен; матката сякаш изгорена; сякаш съдържанието на матката ще падне напред; сякаш мек въздух пълзи през гърба; сакрумът сякаш ще бъде изтласкан; сякаш нещо живо пълзи под кожата; сякаш пръстите са заспали; сякаш крайниците са били дълго време в гореща вода; сякаш искри от огън падат върху различни части на тялото; в лумбалната област; сякаш мишки пълзят под кожата.

Болка: в тилната област; в очите; в ямката на стомаха; в епигастриума; в долната част на корема; в корема; в хипогастралната област; в кръста; в яйчниците и матката; в сакрума, надолу по бедрата и в долната част на корема; над предната част на гърдите; в кръста; в сакрума.

Мъчителни болки: в гръбнака.

Силни болки: в гърба; в върховете на пръстите.

Остра болка: в чернодробната област.

Силни болки: в стомаха; в корема и кръста; в ходилото и пръстите.

Режещи: в корема.

Разкъсващи болки: в двата бедра; в ходилото.

Пулсиращи, разкъсващи болки: в бедрата.

Разкъсващи, жилещи болки: в крайниците.

Щипещи болки: в корема.

Напъваща болка: в матката.

Бодежи: в горните гръдни прешлени.

Бодежи: в очите; в краката.

Бодеж: в гърба.

Внезапно заклещване: в гърба.

Пулсации: в слепоочията.

Крампи: в прасците; в краката, пръстите, ръката и пръстите; в гърдите.

Крампи: в стомаха.

Крампи, натиск: в стомаха.

Ревматични болки: в ставите.

Напрегната болка: в крайниците.

Дърпащи болки: в прасците.

Дърпане: в крайниците.

Дърпане: силно в семенната връв; в корема.

Жилене: в гърдите.

Парене: в гърлото; на езика; в ямката на стомаха; в слезката; в корема; в матката; в ръцете; в краката.

Болезненост: на гърлото; в корема.

Чувствителност: на епигастриума; на долните шийни и горните гръдни израстъци.

Потиснатост: на стомаха.

Болезнено стягане: на епигастриума.

Болезнени потрепвания: в крайниците.

Потрепване: под кожата.

Пулсации: в главата.

Натиск: в очните ябълки; в ямката на стомаха; в тилната област; в маточната област.

Тежест: в главата; в епигастриума.

Лекота: в главата.

Особено жилещо усещане: в върховете на пръстите.

Мравучкане: в лицето; в гърлото и езика; в краката; на езика; в крайниците; по цялото тяло; в четвъртия и петия пръст; в гърба; в пръстите на краката.

Пълзене: на езика; в върховете на пръстите; в крайниците; по цялото тяло; между кожата и плътта; в горната устна; около устата.

Формикация: в лицето; в венците; в крайниците; в върховете на пръстите; по цялото тяло.

Леко пълзящо усещане: в гърба.

Мъхесто усещане: в крайниците.

Сухота: на мекото небце, гърлото и хранопровода; на устата.

Изтръпване: в крайниците; на краката; на дясната ръка; на върховете на пръстите.

Студено усещане: в корема и гърба; в крайниците; на тялото; на дясната ръка; в стомаха.

Тъкани :

Разрушава активността на гръбначния мозък; конвулсивни потрепвания и удари, болезнени контракции, тетанични прояви; пълна парализа, с повишена рефлексна активност; най-мъчителни гръбначни болки; особено в сакралната област; парализа на пикочния мехур и ректума; склонност към гангрена; бързо отслабване.

Разтваряне на кръвните клетки; кръвта тънка; пасивни кръвотечения.

Анемично състояние, от изтощителни болести или изкуствено обедняване; кръвта е тънка и не се съсирва.

Тромбоза на коремните съдове.

Невралгия, причинена от натиск върху нерви от раздута вена.

Тумефакция на жлезите.

Лимфни тумори.

Колапс от холероподобни заболявания.

Бързо отслабване на парализирани части.

Злокачествен пустул.

Емфизематозни подувания.

Пасивно кръвотечение; кръв тъмна и червена, при слаби и кахектично болни, придружена от мравучкане в крайниците и прострация; желание за въздух; не желае да бъде покрита; желае крайниците да бъдат изпънати; кожа студена.

Ревматизъм (*peliosis rheumatica* на Schoenlein) обикновено при кахектично болни, с пурпура; засяга ставите, особено на долните крайници; тромбоза на коремните съдове.

Язви: кървящи; почерняващи; усещащи се като изгорени; безболезнени; жилещи; причиняващи сърбеж; гной зловонен; < нощем, при допир, от външна топлина; > от студ.

Гангрена: от анемия; външни травми, приложение на пиявици или горчица; > от студ, < от топлина; суха, при стари хора.

Суха гангрена на крайниците, частите са сухи, студени, твърди и нечувствителни, с равномерен черен цвят и без зловоние; големи екхимози, кръвни мехури по крайниците, ставащи гангренозни, черни супуриращи мехури; крайниците стават бледи, студени, набръчкани или оловносиви, губят всякаква чувствителност.

Допир. Пасивно движение. Травми :

Допир: ямката на стомаха много чувствителна; десният яйчник чувствителен; матката болезнена; язви <.

Натиск: върху корема > родилни болки; върху прешлените — бодещите <.

След вдигане на тежък товар: по време на шестия месец от бременността — силна болка в стомаха, корема и кръста.

Външни травми: гангрена.

Кожа :

Кожа суха и хладна.

Студена и суха; мътна, набръчкана, суха и нечувствителна; десквамация.

Формикация: с усещане сякаш мишки пълзят под кожата; по лицето, венците и други части на тялото; в крайниците с разкъсващи, жилещи болки, в върховете на пръстите, продължаваща няколко седмици, с частична загуба на чувствителност; по цялото тяло.

Пълзене: по цялото тяло; между кожата и плътта; и потрепване под кожата.

Силно пълзене и жилене по цялото тяло, особено в горната устна и понякога около устата.

Кървави мехури по крайниците, ставащи гангренозни.

Фурункули, малки, болезнени, със зелено съдържимо, узряващи много бавно и заздравяващи по същия начин; много изтощаващи.

Карбункул; обширни екхимози.

Петехии и милиарни обриви.

Purpura hemorrhagica.

Кахектична жена с груба кожа; пустули с тенденция към гангрена.

Варикозни язви и разширени вени при стари хора.

Язви почерняват, обилно повръщане на смес от гъста, черна, катранена, жлъчна или лъскава материя.

Вяла язва, ихорозна, зловонна гной, > от студ.

Обща десквамация при скарлатина.

Пустули при вариола с ненормален вид, или се изпълват с кървава серозна течност, или изсъхват твърде рано.

Няколко болезнени пъпки, големи колкото главичка на карфица, постепенно увеличаващи се до големината на грахово зърно или повече, появили се по лицето, по-лошо отдясно; накрая — цирей, много червен, болезнен, подут, на дясната буза близо до залавянето на масетерния мускул.

Разболя ме, лежах в леглото, толкова ужасно болезнено; цялото лице конгестирано и подуто.

Отдели много зелен гной, накрая зелен „кор“ (ярко зелен), и остави дълбок белег, който заздравяваше дълго.

На седмия ден се появиха няколко петна с болезнено, натъртено усещане около и под коляното, големи колкото половин долар, с пурпурночервен цвят; после три-четири подобни петна по-надолу по крака, около обувката, толкова болезнени, че едва понасях натиска на обувката.

Силно сърбяха, но бяха толкова болезнени, че не можех да ги чеша, а при допир предизвикваха отпадналост и прилошаване.

Първо се появи на левия крак, после три-четири на десния.

С тях се появи обрив по лицето, много болезнен и с усещане като петната по краката, само че по-малки, но със същото натъртено усещане.

Започваха като фини точки, като убождане от игла или ужилване от насекомо, и постепенно се увеличаваха до малка пустула, голяма колкото грахово зърно.

Когато петната изчезваха, оставяха син (екхимозен) белег за няколко седмици, особено по краката.

Веднага след това същите петна се появиха по раменете, три-четири в група, със същото болезнено, натъртено усещане.

Същите характерни петна се появиха шест седмици по-късно в друго доказване — общо двадесет и осем — особено чувствителни на допир, придружени от отпадналост и гадене.

Някои завършват с пустули.

Общи симптоми :

Много остри, променливи болки в различни части на тялото и скованост на гърба и шията, сякаш мускулите са подути близо до тилната област.