

The Materia Medica

Nosodes

Henry Clay ALLEN

Copyright © Médi-T 2003

Thyroidin

Описание :

Thyroidin. Thyroid Extract. A Sarcod. Тритурация на прясната щитовидна жлеза от овца или теле. Потенциране на течен екстракт от жлезата.

Ум :

Остър ступор, редуващ се с неспокойна меланхолия; понякога не може да бъде накарана да говори, лежи на пода с ригидни крайници; друг път плаче и се съблича; понякога опасна и хомицидна, обгръща шията на други пациенти толкова силно, че почти ги задушава (в този случай лудостта е била първична, а микседемът вторичен; и двете състояния били премахнати).

Проявява повишена живост, карайки се с друг пациент за дребно различие в мнение.

Депресия.

Раздразнителност и мрачно настроение отстъпват на жизнерадост и оживление.

„Всички напреднали случаи на микседем показват някакво умствено отклонение, което води към деменция, обикновено с налудности, най-често под формата на подозрителност и преследване.

Понякога се наблюдава истинска лудост под формата на мания и умопомрачение.“

Делириум на преследване (наблюдаван в три случая, един фатален, вследствие прием на **Thyro.** таблетки за намаляване на затлъстяване).

Внезапна остра мания при микседем, напълно възстановена психически и физически под **Thyr.**.

Умствено отклонение, започнало три години преди появата на микседема, с пристъпи на голяма агресивност, редуващи се с депресия и мрачно настроение.

Състояние на идиотизъм; ужасни кошмари.

Възбудено състояние, продължаващо през целия ден, непрекъснато грухтене и особен смях.

Много възбудена; възбудата последвана от значителна депресия.

В продължение на няколко часа в състояние, което може да се нарече само хистерично.

Дълбока депресия.

Раздразнителна и злобна.

Станала мърмореща.

Гневна.

Имала уплахи.

Глава :

Световъртеж.

Усещане за лекота в мозъка, почти без да достига до замайване.

Силно замайване и главоболие за двадесет и четири часа.

Събудил се около 4 сутринта с остро главоболие и силни болки в гърба и крайниците, продължили три дни и го принудили да остане на легло.

Откакто взел първата щитовидна жлеза [общо пет жлези, на интервали], имал странно усещане в главата, със световъртеж и сърцебиене при навеждане.

Главоболие (с фебрилни симптоми); изчезва при спиране на лечението, появява се отново седем дни след подновяване.

Фронтално-коронално главоболие след прием на един таблет четири последователни дни.

(Постоянно главоболие, болки в тилната област и върха на главата).

(Главоболие при акромегалия).

Главоболие.

Главоболие и болки в корема.

Нов растеж на коса (много случаи).

Черни косми растат сред побелелите.

В един случай на склеродерма и един на микседем косата паднала трайно.

В случай на микседем пациентът загубил цялата коса на главата и лицето и имал гъст растеж по ръцете и гръдния кош; под **Thyr.** косата на главата и лицето израснала отново, а тази на ръцете и гърдите паднала.

Очи :

(Изпъкване на очните ябълки — екзофталмичен гуша).

Оптична неврит (при пет души, четири от тях жени, лекувани за затлъстяване; без други симптоми на тиреоидизъм).

Акомодативна астенопия.

Уши :

Влажни петна зад ушите заздравяват (случай на псориазис).

Хиперпластичен медиален отит със склероза и загуба на подвижност на слуховите костици (бързо подобрение в няколко случая).

Лице :

Зачервяване: с гадене и болки в кръста; загуба на съзнание, тонични мускулни спазми; незабавно; с повишаване на температурата и болки по цялото тяло; внезапно става задъхан и посинял.

Припадък, със силно зачервяване на горната част на тялото и болки в гърба.

Подуване на лице и крака.

При лупус на лицето — стегнато усещане, топлина и яркочервено възпаление — премахнати.

Парещо усещане на устните със свободна десквамация.

Уста :

Езикът става гъсто покрит.

Фебрилен и жаден.

Голяма жажда.

(Улцериран участък по букалната повърхност на лявата буза близо до ъгъла на устата.)

Гърло :

(Усещане за пълнота.)

Гуша, екзофталмична — излекувана.

Гушата намалена.

Стомах :

Загуба на апетит.

Повишен апетит с подобро храносмилане.

Оригвания.

Диспептични оплаквания.

Гадене, със зачервяване и болки в кръста.

Гадене, леко повръщане.

Леко гадене, появяващо се при мисъл за него.

Гадене скоро след прием на жлезата.

В пет случая пациентката (жена) повърнала щитовидната жлеза.

Винаги усещала гадене след инжекциите.

Усещане за слабост и гадене (след няколко инжекции).

Чувства се уморена и болна.

Гастро-интестинално разстройство и диария.

Корем :

Повишени газове, последвани по-късно от подобрене.

Главоболие и болка в корема.

Изпражнения :

Диария, с гастро-интестинално разстройство.

Облекчение на запек с по-естествени изхождания.

Запек.

Пикочни органи :

Повишено отделяне на урина.

Повишено уриниране, обикновено с бистър, светложълт секрет.

Лека следа от албумин в урината.

Албуминурия.

Diabetes mellitus; причинен и излекуван.

Женски полови органи :

Повишено сексуално желание.

Шест дни след започване на лечението менструацията, която липсвала повече от година, се появила отново и продължила обилно (в няколко случая на микседем със или без лудост).

Менструация обилна, продължителна, по-честа, ранна аменорея.

(Болезнена и нередовна менструация.)

(Постоянна болка в левия яйчник и голяма чувствителност.)

Изглежда бледа и се чувства болна.

Болка в долната част на корема, главоболие и гадене (при момиче на шестнадесет години, вероятно менструален опит, провокиран от **Thyr.**; менструален поток не се появил).

Действа като галактогон, когато млякото е недостатъчно; когато недостатъкът е свързан със задържане на менструацията, може да я потисне.

(Пуерпериална лудост с треска.)

(Пуерпериална еклампсия.)

Дихателни органи :

Лек пристъп на хемоптиза, последван от кашлица и признаци на фтиза в върха на левия бял дроб.

(Гласът става ясен.)

Дремеща фтиза; активира болестта в пет случая.

Сърце и пулс :

Смърт, с всички симптоми на ангина пекторис.

При опит да върви нагоре по хълм — внезапна смърт от сърдечна недостатъчност.

Докато се навеждала да си обуе обувките — „припаднала“ и починала за половин час.

В един случай, след усилие по-голямо от обичайното, „внезапно станала силно задъхана и посиняла, сякаш умира“, < от почивка в легнало положение и стимуланти.

Два припадъчни пристъпа.

Чести припадъци.

Понякога се оплаквала от усещане за слабост, не непременно след инжекциите.

Един пациент показал необикновени симптоми след инжекцията; кожата станала толкова синкава, че почти черно-синя.

Дегенерация на сърдечния мускул при животни.

Систоличният сърдечен шум бил по-слаб след лечението, отколкото преди.

Усещане за слабост и гадене.

Сърцебиене при навеждане.

Слабост на сърдечната дейност.

Тахикардия и лесна възбудимост на сърцето, продължаващи няколко дни след спиране на храненето.

Пулсът се повишил до 112.

Релаксация на артериолите.

(Бърза пулсация, с невъзможност да лежи в леглото.)

(„Скачане“ в областта на сърцето.)

Гръб :

Зачервяване, гадене и болки в кръста, продължаващи няколко минути.

Пробождащи болки в лумбалната област.

Силно болезнено усещане в гърба и крайниците, продължило три дни.

Зачервяване на горната част на тялото и болки в гърба.

(Болки в гърба.)

Горни крайници :

След инжекция — до голяма степен загубила способността да използва ръцете си за два дни; повторило се по-късно, продължило няколко часа.

Чувствала се странно и неспособна да повдигне ръцете си (след инжекция, друг случай).

Ръцете по-малко сковани и болезнени (псориазис).

Долни крайници :

Мравучкане в краката.

Появил се оток на краката, след това спаднал и продължил да се появява и спада в продължение на месец.

Болка в краката.

Непълна параплегия.

Подуване на лице и крака.

Стъпалата често се лющят на големи люспи, оставяйки чувствителна повърхност.

Обилен поток течност от стъпалата (в случай на воднянка, излекувана от **Thyr.**).

Треперене на крайниците; тремори.

Силно болезнено усещане в гърба и крайниците, продължило три дни.

Болки в ръцете и краката, със неразположение.

Кожата на ръцете и краката се лющи.

(Акромегалия, субективни симптоми.)

Общи симптоми :

Неразположение > при лежане в леглото.

Навеждане = сърцебиене.

Почивка в легнало положение > силна задуха с посиняване, усещане сякаш умира.

Микседематозните пациенти винаги са студени; ефектът от лечението е да ги прави по-малко такива.

Загуба на съзнание и общ тоничен мускулен спазъм за няколко секунди.

Припадъци (много случаи).

Тремори, треперене на крайниците, пълна загуба на съзнание.

(Тетания.)

Епилептиформен пристъп, след който бил в безсъзнание един час; на следващия ден се чувствал по-добре и по-топъл.

Неразположението било толкова голямо, че отказала да продължи лечението.

Агитация.

Непълна параплегия.

Хистеричен пристъп.

(Хистеро-епилепсия с аменорея.)

Нервна и хистерична, трябвало да има сестра да я наблюдава.

Чувства се уморена и болна.

Пробождащи болки.

Болезнени болки (много случаи).

Болезнени болки по цялото тяло.

Дифузни болки.

Болезнени болки в различни части на тялото.

Болки по цялото тяло.

Твърдо подуване на мястото на инжекцията, последвано от абсцес с бавно развитие.

Микседемът премахнат (много случаи).

„Серия от абсцеси, резултат от инжекциите, но вероятно произхождащи от случаен абсцес, напълно независим от тях.“

Образувал се малък абсцес.

Повишена супурация в случай на лупус.

Наддала един stone (≈ 6.35 кг).

Загубила огромно количество тегло (много случаи на микседем).

Бързо наддаване на плът и сила.

Анемия и слабост.

Инфилтрацията бързо се абсорбира (псориазис).

Хора с кожни заболявания могат да понасят много по-големи дози от тези с микседем.

(Акромегалия, главоболие и субективни симптоми.)

(Фрактури отказват да заздравеят.)

Особена кахексия, по-опасна от самия микседем.

Сифилис, вторичен, третичен.

Кожа :

Зачервяване на кожата.

Кожата станала толкова ливидна, че почти синьо-черна.

Кожата се е лющила свободно, но не е имало потене или диуреза.

Псориазис: обривът се разширил и увеличил.

(Псориазис: зачервяването и сърбежът намалени; обривът се отделя и се излющва на големи люспи, гневният, възпален вид напълно изчезнал.)

Влажни петна зад ушите заздравяват.

Ръцете по-малко сковани и болезнени; подуването намаляло.

Коричките се отделили, оставяйки бледочервена кожа; обривът вече не толкова болезнен.

(Симетричен серпигинозен обрив; тъмночервен; ръбовете повдигнати и удебелени.)

Лупус: стегнато усещане, топлина, яркочервено възпаление — премахнати; супурацията увеличена.

Екзема: раздразнението на кожата значително намалено.

Разпръснати пустули на екзема узряват бързо или абортират.

(Екзема при никнене на зъби.)

(Сифилитичен псориазис.)

(Rupia.)

Склеродерма.

Лющене на кожата, започващо от краката и разпространяващо се по цялата повърхност; кожата след това станала сравнително мека и гладка.

Лющене на кожата на долните крайници, с постепенно изчистване (екзема).

Кожата на ръцете и краката се лющи.

Сън :

Постоянна склонност към сън.

Събудил се около 4 сутринта с остро главоболие.

Ужасните кошмари изчезнали.

Безсъние.

Възбудено състояние; не можела да спи.

Треска :

Зачервяване: с гадене; със загуба на съзнание.

Винаги се чувствала гореща и имала усещане за болест след инжекциите.

Чувствала се по-добре и по-топла.

Зачервяване на горната част на тялото и болки в гърба.

Температурата никога не се повишила над 99°F, но се чувствала фебрилна и жадна.

Температурата се повишила до 100°F и останала там няколко дни; пулс 112.

Повишаване на температурата; диафореза.

Обилно изпотяване при най-малко усилие.