

The Materia Medica

Nosodes

Henry Clay ALLEN

Copyright © Médi-T 2003

Ustilago

Ум :

Униние на духа следобед.

Много тъжна, често плаче; изключително изтощена от сексуална злоупотреба и загуба на семе; сънят неспокоен.

Не можеше да понесе да вижда или да говори с когото и да било.

Раздражителност при задаване на въпрос или молба да повтори нещо.

Денят изглеждаше като сън.

Меланхолия; униние; потиснатост и отпадналост в топла стая.

Отвращение към топлина или < от топлина като цяло.

Частична или пълна загуба на контрол върху функцията на зрението и гълтането.

Голяма раздражителност, умствена слабост и депресия.

Глава :

Пристъпи на световъртеж, понякога с двойно виждане, понякога бели петна заличават всичко; по-късно пристъпи на световъртеж с вътрешна топлина.

Световъртеж в климакса с твърде честа и обилна менструация.

Главоболие: през цялата сутрин; в 7 сутринта; вечер <, във фронталната област; < при ходене.

Нервно главоболие от менструални нарушения при нервни жени.

Фронтална болка; сутрин, преди обяд, със смъдене в очите; през целия ден, с болезнено напрежение в очните ябълки и с пълнота в главата сутрин; с дискомфорт в епигастриума.

Скалпът сух, главата конгестирана, с косопад.

„Scale-head“ — воднист серум, изтичащ от скалпа.

Мравучкане в левия слепоочен участък.

Косопад.

Пукане, разпукващо конгестивно усещане в главата и различни части на тялото.

Нагоре прииждане на кръв с разпукване в главата.

Световъртеж от такива причини, особено в климакса.

Усещане за пълнота с тъпо притискащо главоболие < при ходене.

Главоболието и световъртежът изглеждат рефлексни от овариално или маточно състояние.

Фронтално главоболие, < при ходене.

Силно фронтално главоболие, сякаш челото ще се разцепи.

Остри, прехвърчащи болки във фронталната област, конгестия на мозъка.

Болка на върха и страната на главата; климакс.

Падане на косата и ноктите; пълна алопеция, без нито един косъм на главата.

Главоболие в слепоочията.

Очи :

Пристъпи на потрепване в очите, изглежда сякаш се въртят в кръг и хвърчат от един предмет към друг.

Постоянно воднисто течение от очите и носа с периодични тръпки.

Спазми, с изчезване на зрението и усещане, че главата се върти.

Болезненост в очите и сълзотечение.

Болезненост и смъдене в очните ябълки, с обилна секреция на сълзи.

Горещо усещане при затваряне на клепачите.

Слабост на очите.

Сълзотечение на открит въздух.

Клепачите слепени сутрин.

Зрение на петна, танцуващи напред-назад.

Нещата се въртят пред очите, изглеждат двойни; появяват се бели петна, които заличават всичко останало.

Тъпа болезненост в дясната очна ябълка.

Уши и слух :

Постоянна тъпа болка в лявото ухо, причинена от разпространение от възпаления тонзил.

Нос :

Цирей в дясната ноздра.

Сухота в ноздрите преди обяд, със сухо усещане в кожата.

Ярка епистаксис, > от натиск.

Ринит, горчив вкус, неприятна миризма, забележима и за самия пациент.

Сухота в ноздрите, сякаш е настинал.

Болки в корена на носа, простиращи се към кантите и нагоре и навън към всяка вежда.

Лице :

Внезапна бледност на лицето при седене и вечер.

Парене на лицето и скалпа от конгестия.

Приливи на топлина; лицето става червено и горещо.

Зъби :

Понякога хлабавост на зъбите.

Болезненост през целия ден в кариозните горни първи и втори молари, които са болели и преди.

Опадане на зъбите (при животни).

Уста :

Езикът обложен сутрин.

Мравучкане в езика, с усещане сякаш нещо притиска корените му нагоре, със сухота в ноздрите.

Слюноотделяне: тънко, горчиво; обилно.

Вкус: меден; сутрин; слюзест, меден.

Слюзест вкус; слюзест вкус с парещ дискомфорт в стомаха.

Гърло :

Тонзилите конгестирани, възпалени.

Левият тонзил увеличен, конгестиран, тъмночервеникав; десният болезнен при преглъщане в 14 ч.; левият болезнен в 21 ч.; на следващата сутрин конгестията на левия се разпространява по Евстахиевата тръба и причинява болка в ухото.

Ланцинации в десния тонзил (фаринксът бил донякъде възпален при приемане на лекарството); на следващия ден фаринксът по-горещ и чувствителен към движение.

Грапавост на фаринкса.

Сухота на фаринкса, с пареща сухота в стомаха; затруднено преглъщане.

Сухота на фаринкса със затруднено преглъщане, усещане за буца зад ларинкса; по-късно чести усилия за преглъщане, с усещане сякаш нещо е заседнало във фаринкса; след това раздразнение на фаринкса и при преглъщане усещане за буца в ларинкса.

Парене в хранопровода при сърдичния отвор.

Апетит :

Апетит: желание; слаб.

Жажда през нощта.

Загуба на апетит, последвана от „кучешки“ глад.

Стомах :

Оригвания: на кисела течност; на кисела храна.

Режеща болка в стомаха.

Болка в стомаха; често следобед; при пълно вдишване.

Болка в епигастриума с дърпаща болка в ставите на пръстите.

Парене в стернума и кардията.

Дискомфорт в стомаха преди обяд; следобед, < от вечеря.

Хематемеза: пасивна, венозна, придружена от гадене, което се > от повръщане.

Слабо, празно, „изчезнало“ усещане в стомаха.

Парене в хранопровода и стомаха; разпространява се към яйчниците, сърцето, лицето и скалпа.

Припадъчно усещане в епигастриума, с болка в областта на черния дроб и червата.

Повтарящи се фини, остри режещи болки в епигастриума.

Постоянен дискомфорт в областта на стомаха.

Парещ дискомфорт в стернума и стомаха, придружен от фини невралгични болки в същата област, продължаващи около три минути; появяват се на всеки десет или петнадесет минути в продължение на няколко часа; остра режеща болка в стомаха.

Корем :

Периодични режещи болки в пъпната и хипогастралната област в 18 ч., < в 20 ч. от запечено изхождане; след това тъпа болка в целия корем.

(Болка сякаш червата са вързани на възли.)

Болка: в десния лоб на черния дроб; в пъпа; в пъпа преди нормално изхождане; в левия слабинен участък при ходене.

Дърпаща болка в десния хипохондриум през целия ден.

Дискомфорт в пъпа и десния хипохондриум.

Тъпи болки в корема през целия следобед, последвани от сух, твърд изпражнение; фини режещи коликообразни болки на всеки няколко минути през целия ден, > от твърдо запечено изхождане, последвано от тъп дискомфорт в червата.

Изпражнения :

Нормално изхождане в 4 ч. сутринта.

Редки изпражнения в 4 ч. сутринта, с болка и къркорене в корема.

Светла диария.

Мек изпражнения, на следващия ден сух, на бучки; два дни по-късно черен, сух, на бучки.

Запек: черни, сухи, на бучки изпражнения.

Пикочни органи :

Тенезъм на пикочния мехур и инконтиненция на урината.

Напъване, урината светла, увеличена.

Без желание, но с неспокойство.

Урина: увеличена; оскъдна, червена; кисела, тъмна; оскъдна и тъмна.

Често уриниране, с болка в меатуса при преминаване на последните капки.

Мъжки полови органи :

Сперматорея след онанизъм; емисии всяка нощ; говоренето за жени причинява емисия; много тъжен; често плаче; казва, че не може да прекрати навика, няма контрол над себе си, когато възбудата се появи; знае, че това бързо го убива; не може да работи, толкова е изтощен.

Гениталиите отпуснати.

Ерекции: при четене в 4 ч.; често през деня и нощта.

Скротум отпуснат и студена пот по него.

Болка в тестисите, < в десния; болка в тестисите, понякога невралгична; на пристъпи, понякога причиняваща припадъчно усещане.

Понижено желание.

Хроничен орхит, раздразнителен тестис.

Еротични фантазии.

Семинални емисии и непреодолима склонност към мастурбация.

Непреодолима склонност към онанизъм; чести емисии; изтощен, отпуснат, с лумбална болка.

Униние; раздразнителност.

Раздразнителна слабост и отпуснатост на мъжките полови органи, с еротични фантазии и семинални емисии.

Женски полови органи :

Жълта и зловонна левкорей.

Чувствителност на левия яйчник, с болка и подуване.

Парещ дискомфорт в яйчниците.

Интермитентна невралгия на левия яйчник; увеличен, много чувствителен на допир.

Матка: хипертрофирала; пролабирала; шийката чувствителна, гъбеста.

Менструация: твърде оскъдна, с овариално раздразнение; твърде обилна и твърде ранна; кръвта съсирена; сякаш всичко би излязло навън.

Между периодите — постоянни страдания под лявата гърда по ръба на ребрата.

Съдовата система на яйчниците е най-силно засегната, причинявайки конгестия, увеличаване и силно раздразнение, с овариалгия, дисменорея и особено менорагия.

Изтичане на тъмна кръв, силно съсирена, понякога образуваща дълги, черни, нишковидни съсиреци.

Изключителна болка по време на менструация; потокът много обилен и не спира напълно до следващия период; през повечето време прикована на легло.

Потискане на менструацията.

Викарна менструация от белите дробове и червата.

Постоянен болезнен дискомфорт в устията на матката.

Менструация, която току-що е спряла, се връща — ярко оцветена; болезненост и тежест в лявата страна преди потока, частично отзвучаващи с него.

Менструация обилна, яркочервена, не се съсирва лесно (при жена, която мислела, че е преминала климакса, тъй като не е имало течение повече от година); спира внезапно, както започва; без болка, само отпадналост и замайване.

Менорагия в климакса; активен и постоянен поток с чести съсиреци.

Бландна левкорей.

Аборт.

Недостатъчни родилни болки; ос мек; гъвкав, разширим.

Постоянно кръвотечение.

Пуерперален перитонит.

Лохии твърде обилни, частично течни, частично съсирени; продължителни болки с напъване; матката сякаш е стегната на възел.

Хипертрофия и субинволюция на матката с голяма атония.

Хеморагия: смесен характер, частично течна, частично съсирена.

Потокът е пасивен, бавен, продължителен.

Атонично състояние на тазовите органи; недостатъчни родилни болки, с разширим ос.

Метрорагия, със световъртеж по време на климакса.

Менорагия, с разместена матка.

Връзките на матката отпуснати; пролапс, с усещане за тежест, сякаш всички тазови органи ще бъдат изхвърлени.

Отпуснато, вяло състояние на тазовите органи; атонично състояние на матката; състояние на слабост, отпуснатост и атония.

Приливи на топлина и нарушения в циркулацията, подобни на тези при климакса или при преждевременно потискане на менструацията; яйчниците възпалени, раздразнителни, чувствителни и подути; парещ дискомфорт в двата яйчника.

Остри болки започват в яйчниците и слизат надолу по краката.

Болезнен дискомфорт, отнасян към матката.

Метрорагия след аборт, раждане или в климакса.

Изтичане на кръв при най-малък повод; след дигитален или механичен преглед; шийката подута, лесно кърви при допир.

Матката остава голяма след аборт или раждане; субинволуцията забавена.

Хеморагия яркочервена, но по-често тъмна, съсирена и нишковидна; следродилно изтичане от отпуснатата атонична матка.

Матката хипертрофирала, тежка, усеща се мека, гъбеста или водниста.

Оплаквания на родилка; обилни, изтощителни лохии.

Мляко недостатъчно или прекомерно; кърменето увеличава лохиалното течение.

Остра болка < в левия яйчник, с подуване; болките интермитентни; слизат бързо надолу по краката.

Оварит, постоянни болки в яйчника, остри болки, преминаващи бързо надолу по краката; яйчникът много подут и чувствителен, с оскъдна менструация.

Оварит; настинка след менструация; постоянна тъпа болка в десния слабинен участък и гърба, три-четири пъти на час; остри невралгични болки в яйчника; ходенето болезнено; червата лениви, много отпусната.

Овариално раздразнение, постоянна болка в левия яйчник, преминаваща надолу по хълбока, трябва да накуцва при ходене; болките остри и понякога слизат надолу по крака много бързо; на всеки няколко дни има значително подуване в левия слабинен участък; не може да понесе натиск върху яйчника.

Всеки ден от 12 ч. до около 16 ч. — постоянна болка от левия яйчник към матката; на всеки няколко минути болката в яйчника е изключително силна, режеща като нож; болка в десния яйчник и хипогастралната област, но всичко започва от левия яйчник;

яйчникът се напипва ясно в слабината, голям колкото кокоше яйце и много твърд; при натиск причинява силна болка; всеки ден мисли, че има треска с пристъп на болка, но без студенина; лека левкорей; загуба на апетит; запек.

Разместена матка с менорагия; шийката подута; кърви при допир.

Матка хипертрофирала, чувствителна; кръв ярка, прясна, без съсиреци.

Субсерозен или интерстициален фиброид на матката (два случая), фиброидът значително намален.

Шийката подута, кърви при допир.

В продължение на дни — изтичане на тъмна кръв с малки съсиреци; матката увеличена, шийката подута или разширена.

Хронична маточна хеморагия и пасивна конгестия.

Кръв тъмна, но толкова тънка, че едва оцветява пръстите.

Обилна менструация, потокът трае от десет дни до две седмици, първоначално много обилен, постепенно намалява; винаги < от движение; течение тъмно и почти безболезнено.

Менструация на всеки три седмици, с тъмни съсиреци; обилна, с изблик на яркочервена кръв при ставане от седнало положение или след уплаха; два дни преди менструацията — силна болка в гърба с остра болка през корема от хълбок до хълбок, последвана от експулсивни болки; болките намаляват след започване на потока и спират с него; между менструациите — тежка дърпаща болка в гърба при усилие; болка, стреляща нагоре по гърба от хълбоците към раменете; коремът чувствителен на допир; силно чувство за тежест; натиск в главата; усещане за стягане във върха на главата и чувство сякаш главата се повдига; световъртеж; разяждаща, албуминозна левкорей, < преди менструация; вълчи апетит; силна умора; пулс 80 и слаб; умствена депресия.

Склонност към обилна менструация; бездетна; голяма, месеста, отпусната, подпухнала, с много блед тен; склонна към (и преди е имала) воднянка от прекомерна загуба на кръв; обилна менструация, която според нея е главно вода и съсиреци; казва, че няма външен поток, когато лежи, но съсиреци и вода излизат от матката, когато стане; чувства такава пълнота в матката, че трябва да стане, за да се освободи от съсиреци; течението през нощта било ужасно; много отпаднала, едва може да говори.

Тежка менорагия през последните дванадесет години при всяка менструация, траеща седмица или десет дни, понякога повече; бледа, слаба, много нервна.

Обилно течение на тъмна, съсирена кръв с фетидна миризма, с болка и чувствителност в един или двата яйчника.

Дисменорея от конгестивен характер, с много овариално раздразнение; силна болка в яйчниците; матката и гърбът болят на всеки няколко минути; оскъдно, бледо течение, придружено от фалшиви мембрани; слаб апетит, силно обложен език.

Склонност към главоболия от появата на менструацията на 15-годишна възраст; главоболие главно на върха на главата; слаб апетит; болка в лявата гръдна област с известна кашлица; пълно потискане на менструацията през последните осем месеца; силна болка в гърба, не може да се вози в карета; болка в маточната област, особено над яйчниковата област, < в лявата страна; повръщане на слюз и кръв ежедневно; без сън; известна левкорей; истерична; без маточно разместване, но силна конгестия в тазовата област.

Потискане на менструацията без видима причина; неприятна кашлица; значителна експекторация; понякога и суха кашлица; пронизващи болки в гърдите, особено в лявата страна; нощни изпотявания; загуба на апетит; болка в яйчниците, особено в левия; обща слабост, главоболие; левкорей; хлорозна анемия, сякаш в първи стадий на туберкулоза.

Менструацията потисната през последните четиринадесет месеца; много раздразнителна и депресирана; неспокойствие в областта на стомаха; болка в яйчниковата област, особено в лявата; кожата гореща и суха; запек, изпражнения сухи и твърди; липса на апетит; пронизващи болки в гърдите, < в лявата страна; постоянна дрезгава кашлица; значителна експекторация; нощни изпотявания; обща изтощеност; голямо неспокойствие в долните крайници.

Лека левкорей.

Климакс; световъртеж, чести приливи; метрорагия.

Бременност. Раждане. Лактация :

Аборт: напъващи болки, сякаш всичко би излязло от нея; при отпуснати конституции; от обща атония на матката; с или без хеморагия.

Аборт многократно в третия месец; сега около три месеца бременна; през последните десет дни имала повече или по-малко хеморагия всеки ден, някои дни доста силна; не толкова през нощта; кръв преминава многократно през деня, в тъмни съсиреци.

Следродилни хеморагии от отпуснато, атонично състояние на матката.

Постоянно кръвотечение; на всеки няколко минути изхвърляне на голям съсирек яркочервена кръв, с напъващи болки.

Упорита хеморагия на кафеникава кръв, с липса на маточна контракция.

Час и половина след раждане започва силно кръвотечение.

Пасивна хеморагия след аборт, кръв на бучки, кръвотечение дни и седмици.

Силно кръвотечение две седмици след раждане; големи яркочервени съсиреци; без болка; много слаба.

Много обилно лохиално течение, много тъмно, почти черно.

Агалактия; хронично възпаление и индурация на гърдата.

Галакторея.

Подпомага изхвърлянето на чужди тела от матката.

Пуерперален перитонит, с постоянно кръвотечение; висока температура; секрецията зловонна; коремът изключително чувствителен и тимпаничен.

Пуерперален перитонит; аборт преди около два дни, около третия месец; постоянна треска, пулс 120; не може да понесе най-лекия натиск върху която и да е част от червата; около шест пъти днес имала остри, режещи болки в левия яйчник; кърви постоянно два дни; кръвта тъмна, не обилна, без напъващи болки; не може да се движи в леглото; принудена да лежи по гръб; постоянна тъпа фронтална болка; загуба на апетит, език обложен.

През последната година — световъртеж всеки ден, някои дни толкова силен, че трябва да легне; менструация на всеки три седмици през последната година; трае около десет дни и е обилна; кърви два пъти повече от преди; постоянен болезнен дискомфорт под лявата гърда; ревматични болки в раменете и гърба; много слаба, неспособна да работи.

Фиброиди и индурация на ос.

Изтичане на кръв от матката, яркочервена, частично течна, частично съсирена; пасивна конгестия на матката, така че има леко изтичане на кръв след всяко изследване; тъканите на матката се усещат меки и гъбести; ос разширен.

Дадено **Ustilago Im**, четири дози, за болезнен дискомфорт и силна чувствителност на маточния ос.

След двадесет и четири часа била излекувана, но имала следните симптоми, никога преди усещани от нея:

Главоболие в слепоочията.

Болки в корена на носа, простиращи се към кантите и нагоре и навън към всяка вежда.

Болка в задната част на шията.

Силни болки в костите по цялото тяло, особено в прасците, които били леко схванати.

Болка в двете рамене, особено при повдигане на ръцете.

Скованост в раменните стави при спускане на ръцете; при събуждане ръцете са изпънати над главата по време на сън.

Жажда за студени напитки.

Чувствала се студена външно, но не вътрешно.

Често уриниране, с болка в меатуса при преминаване на последните капки.

Гръден кош :

Спазматично разкъсващо усещане в горната част на лявата страна, преминаващо към шестото или седмото ребро, в 15 ч., при стоене или четене, < от дишане.

Болка в лявата инфраклавикуларна област сутрин.

Дърпаща болка в лявата инфрамамарна област, събуждаща ме в 3 ч. сутринта, > при обръщане по гръб от дясната страна.

Болезнен, парещ дискомфорт в стернума и под него в стомаха, с невралгични болки.

Опресия по срединната линия.

Стягане с болка.

Топлина и натиск.

Сърце :

Внезапна прехвърчаща болка от сърцето към стомаха, спираща дишането.

Пареща болка в сърдечната област.

Дихателни органи :

Усещане сякаш има буца зад ларинкса, което предизвиква постоянен стремеж за преглъщане.

Гръб :

Болка в гърба, простираща се до най-долния край на гръбнака.

Силна ревматична болка в лумбалната област, < при ходене; болезнен дискомфорт в поясната област.

Болка в задната част на шията.

Болка в областта на десния бъбрек, < при седене неподвижно; на следващия ден — в областта на левия бъбрек, > при движение, с топлина, пълнота, болезненост при дълбок натиск (който облекчава болката), с неспокойство в левия бедр, често желание за уриниране, струята много малка; следващия ден — изисква значително усилие на волята, за да изпразни пикочния мехур, което става бавно; болка и болезненост в левия хълбок продължават; тежест в лумбалната област; в леглото — неспокойство около пикочния мехур (нямала желание за уриниране при лягане); събудила се рано сутрин с чувство за раздуване в пикочния мехур; уринирането бавно и трудно; урината едва оцветена; болката в гърба < следващата нощ, < при лежане по корем, > при лежане на дясната страна.

Напъващо усещане в сакралната област като при дисменорея, преминаващо към левия яйчник и постепенно разпространяващо се през хълбока.

Горни крайници :

Болка в двете рамене, особено при повдигане на ръцете.

Болка в раменните стави; ревматична, в мускулите на дясното рамо, през цялата нощ.

Интермитентно, изтръпващо мравучкащо усещане в дясната ръка и длан всеки ден.

Скованост в раменните стави при спускане на ръцете; при събуждане ръцете са изпънати над главата.

Болка в лакътя, < при движение.

Пронизваща болка по метакарпалната кост на десния показалец.

Ревматична дърпаща болка в ставите на пръстите, < втория став на десния показалец, през целия следобед.

Хипертрофия или загуба на нокти.

Ревматични болки в ръцете, дланите и пръстите.

Тъпа ревматична болка в дясната лакътна става при движение.

Силни дърпащи болки в ставите на всички пръсти.

Фини, пронизващи болки по метакарпалната кост на десния показалец, на всеки няколко секунди.

Остри, режещи болки по метакарпалните кости на дясната ръка.

Долни крайници :

Болка в лявото коляно при ходене, увеличаваща се до крампи, принуждаваща ме да се подпирам на ръката на приятел; болката, с периодични крампи, продължи цялата вечер, < при повдигане на ходилото така, че да се натиска върху пръстите.

Крампозна скованост в левия крак, < при повдигане на ходилото така, че да се натиска върху пръстите.

Стъпалата подути сутрин.

Режеща болка в костите на дясната ръка и крак.

Чести ревматични симптоми в ръцете, пръстите и краката.

Ревматични болки в краката.

Прехвърчащи ревматични болки в метатарзалните кости на десния крак.

Силни болки в костите по цялото тяло, особено в прасците, които са леко схванати.

Кожа :

Скалпът се превърна в една мръсна маса от възпаление, две трети от косата опаха, останалата се сплъсти, с изтичане на водниста течност от скалпа; обрив като рубеола на шията и гърдите, постепенно разпространяващ се към краката, най-гъст на гърдите и ставите; сърбеж < нощем; разтриването на която и да е част предизвикваше обрив; на лицето и шията — на петна като тения, но не везикуларни.

Склонност към малки циреи.

Циреи на тила.

Конгестивно усещане в кожата.

Кожата суха и гореща; конгестирана.

Болезнено, разрушително заболяване на ноктите.

Парестезия на кожата; мравучкане, парене, сърбеж; ясно изразена еритема на откритите части на тялото, последвана от пергаментоподобна, тъмнокафява кожа с rhagades, < от топлина.

Roullin наблюдавал косопад и понякога загуба на зъби както при животни, така и при хора; мулета, хранени с него, често губели копитата си, а кокошки снасяли яйца без черупки; причинявал косопад при животни и лекувал пълна алопеция.

Пустулозна улцерация на кожата, „scald-head“ и различни форми на екзема.

Медни петна по кожата; вторичен сифилис; макули.

Негър, уртикария от шест години, страдащ почти постоянно; всяка нощ сърбеж; разчесването предизвиква големи бледи подутини по тялото, ръцете и краката.

Сън :

Трудно заспиване и след това неприятни сънища.

Неспокойна нощ; с треска; с тревожни сънища.

Сексуални сънища; без емисия; отвратителни, събуждащи го; станал и уринирал с трудност и тенежъм.

Треска :

Тръпки, преминаващи нагоре и надолу по гърба.

Топлина през нощта, по време на сън.

Вътрешна топлина; със световъртеж; < очите, които са възпалени и чувствителни към светлина; очната ябълка болезнена при допир; интермитентна; пулс нормален.

Парене в лицето и скалпа.

Кожата суха; нощем; и гореща.

Рецидивиращи трески; много обилно потене; лека гадене; опресия в гърдите; мозъчни нарушения и голяма раздразнителност.

Жажда за студени напитки.

Студенина външно, но не вътрешно.

Общи :

Невралгични болки във фронталната област, ръката и краката.

Ревматични болки по цялата лява страна, с режеща болка в лявото коляно и прасеца, ако натисна тежест върху пръстите или сгъна коляното с тежест върху него.

Ревматични болки в мускулите на ръцете, дланите, пръстите и поясната област; тези в гърба < при ходене.

Симптоми на настинка.

Неразположение, сякаш съм настинал; чувствам се болен от настинка; постоянно воднисто течение от носа и очите, с периодични тръпки.

Отпадналост: през деня, с главоболие, < по обяд, и с парещо фронтално главоболие в 21 ч.; сутрин при ставане; в 14 ч.

Припадъчно усещане в 11 ч. в топла лекционна зала.

Припадъчни пристъпи, започващи в епигастриума, с малки болки в хипохондриума и червата.

COMPARE :

SECALE	USTILAGO
Парене; във всички части на тялото, сякаш искри от огън падат върху пациента.	Парене; в хранопровода, стомаха, яйчниците, сърцето, лицето, скалпа; по-слабо върху кожата.
< от топлина, покриването на засегнатите части < от топлина, всички заболявания.	< от топлина по-слабо изразено.
Приложим при тънки, жилави, немощни, кахектични жени; раздразнителни, нервни, с бледо, хлътнало лице.	Приложим при слаби, отпуснати, атонични пациенти; раздразнителни, унили, умствено слаби.
Хеморагия: обилна, тънка, черна, водниста, разложена; кървава; хеморагична диатеза; най-леката рана може да кърви седмици; дефибринирана.	Хеморагия: пасивна, просмукваща се, тъмна, съсирена, кървава; образува дълги, черни, нишковидни съсиреци; частично тъмна, частично съсирена и нишковидна, или тънка и водниста.

Връзки :

Сравни: **Mel., Med., Mez., Psor., Vinc. m.**, при *crusta lactea* и други заболявания на скалпа в детството.

Bry., Ham., Mill., Phos., при викарна менструация.

Agar., Mur., Sep., при чувство за тежест надолу и маточен колапс.

Helon., Lys., Natr. h., Sec., при забавена субинволуция.

Malan., Sec., при заболявания на косата и ноктите.

Act., Caul., Thuja., Sul., Vib. o., при болка в левия яйчник.

Bov., Elaps., Graph., Ham., при интермитентно течение.

Sang., Urt. ur., при болка и ревматични заболявания на дясното рамо.

Sang., при болка в лявата инфрамамарна област, простираща се към лопатката.

Lac c., Kali bi., Puls., при непостоянни, „блуждаещи“ ревматични болки.

Sul., при припадъчно „изчезнало“ усещане в 11 ч. преди обяд.

Cob., при болки в гърба и семинални емисии.

Bov., при течение по средата между менструалните периоди.

Canth., Pyr., Sec., при изхвърляне на чужди тела от матката.