

The Materia Medica

Nosodes

Henry Clay ALLEN

Copyright © Médi-T 2003

Vaccinium

Ум :

Плач.

Лошо настроение, с неспокоен сън.

Нервна депресия, нетърпеливост, раздразнителност; склонност да се безпокои от всичко.

Болестен страх от заразяване с едра шарка.

Обърканост, не помни нещата в момента, когато са й нужни.

Глава :

Фронтално главоболие.

Челото сякаш ще се разцепи по средната линия от корена на носа до върха на главата.

Пронизващи болки в десния слепоочен участък.

Обрив като *crusta lactea*.

Болезненост и топлина в цялата глава, особено във фронталната област.

Жилене в двата слепоочни участъка.

Болезненост във фронталната област през целия предиобед.

В средата на нощта — събуждане от болка във фронталната област и очите, сякаш разцепени, и жилене в двата слепоочни участъка.

Силно главоболие по цялата глава.

Очи :

Tinea tarsi и конюнктивит при жена, 28 г., останали като резултат от вариола в детството; конюнктивата болезнено чувствителна.

Слаби очи; усещане, че челото се разцепва.

Възпалени клепачи.

Зачервяване на очите и лицето, с малки пъпки по лицето и ръцете.

Кератит след ваксинация.

Болка във фронталната област и очите, сякаш разцепени.

Мъгливо усещане пред очите сутрин, не може да вижда добре.

Подуто червено лице и червени очи, с малки пъпки по лицето и ръцете.

Болезненост във вътрешния ъгъл на лявото око.

Особено тъпо усещане в долния клепач на лявото око.

Нос :

Усещане за пълнота в главата, с течащ нос.

Кървене от носа, предшествано от усещане за свиване над и между веждите, скоро след ядене на месо; менструацията твърде обилна и твърде честа; излекувано чрез реваксинация.

Шия :

Подуване на шията под дясното ухо (паротидна жлеза), с усещане като порязване.

Хладно усещане в гърлото, отпред надолу към гръдната кост, навътре и навън.

Лице :

Зачервяване и подуване на лицето, тръпки по гърба, до следобед.

Подуто червено лице и червени очи, с малки пъпки по лицето и ръцете.

Уста :

Езикът обложен, сухожълтеникав, с папили, които се виждат през налепа.

Суха уста и език.

Апетит :

Апетитът изчезнал, отвращение към вкус, мирис и вид на храна.

Кафето има кисел вкус.

Добър апетит.

Стомах :

Болестност в епигастриума, с кратък дъх.

Коремна болка.

Корем :

Пронизваща болка в чернодробната област, по ръба на последното долно ребро, по аксиларната линия.

Пронизваща болка в слезковата област; подуване от газове.

Пикочни органи :

Нефрит с албуминурия, хематурия и отоци, развил се единадесет дни след ваксинация; детето се възстановило.

Дихателни органи :

Кратък дъх с болестност в епигастриума и натиск в областта на сърцето.

Коклюш.

Гръден кош :

Пронизваща болка в лявата страна на гръдния кош, отпред, под късите ребра.

Пронизващи болки в дясната страна под късите ребра отпред, отдясно наляво, след това на съответното място в лявата страна, но отляво надясно, продължаващи пет минути, усещани в черния дроб и слезката.

Дърпащо усещане надолу по лявата страна на гръдния кош и гърба.

Сърце :

Фебрилно действие на сърцето и артериите.

Болестност в сърдечната област.

Гръб :

Болка в гърба.

Болестност в гърба, < в лумбалната област, обхващаща кръста.

Извиващи болки в долната част на гърба.

Внезапна слабост в поясната област, > при лягане.

Горни крайници :

Силни болки в лявата горна част на ръката на мястото на ваксинацията, не можеше да я повдигне сутрин.

Ревматични болки в китките и ръцете.

Усещане за топлина, преминаваща от гърба на ръката, като пара.

Келоиди на местата от реваксинация.

Лявата горна част на ръката се усеща скована, леко треперлива.

Зачервяване на лявата горна част на ръката.

Леко разкъсващо усещане от лявата китка към предната част на радиуса.

Мравучкане в левия четвърти пръст, сякаш „заспива“; също и в левия среден пръст.

Болестеност в левия четвърти пръст.

Дърпане в левия лакът нагоре по ръката.

Лявата ръка се усеща гореща.

Левият четвърти пръст гори; топлина преминава през лявата ръка.

Долни крайници :

Разкъсваща болка надолу в лявото бедро.

Болестеност на долните крайници, сякаш прегряти или пренатоварени.

Краката болят прекомерно, едва може да се движи; усещане като „чупене на костите“ и чувство сякаш костите се раздробяват.

Извиващи болки в двете колена.

Кожа :

Кожата гореща и суха.

Общ обрив, подобен на кравешка шарка.

Малки пъпки се развиват на мястото на ваксинацията при четвърто разреждане; червени пъпки или петна на различни места, най-видими при затопляне.

Обрив от пустули с тъмночервена основа и кръгло или продълговато възвишение, изпълнени със зеленикаво-жълта гной, от лявата страна на торса, между раменете, на лявото рамо, зад дясното ухо, наподобяващи вариолоид; някои големи колкото

грахово зърно, други по-малки, без депресия в центъра; появяват се като твърди кръгли възли в кожата („като сачма“), много сърбящи.

Мравучкащо парене в кожата по цялото тяло, най-силно в кожата на челото и в долната и предната част на окосмената част на главата, които са зачервени като предвестник на вариолозен обрив.

Vaccinium 6, във вода, за един ден със строга диета, повторено осем дни — действало като профилактика в шестстотин случая.

Лекувани множество случаи на вариола и вариолоид през последните осемнадесет години, някои от най-тежък характер, и никога не е загубен случай при използване на ваксинен вирус като лекарство; никой от лекуваните не е страдал от хеморагия, делириум, вторични трески или обезобразяване с ямки.

Vaccinium 200th бързо > тежки симптоми на вариола при дете на шест месеца; два дни преди появата на обрива е реваксинирано (след осем дни) върху невус близо до дясното зърно; затруднено преглъщане от засягане на езика и фаринкса; пустули, много големи, разпръснати по скалпа, лицето, тялото и крайниците.

Обрив от малки червени везикули на лявата горна част на ръката и гърдите, изчезващи след няколко дни; пустули, изпълнени с материя, с депресия в центъра и червен ореол на лявото рамо.

Пустулите внезапно силно хлътват.

Обрив по цялото тяло от малки пустули, някои с централна депресия, някои кафяви.

Сън :

Събуждане в средата на нощта от болка във фронталната област и очите, сякаш разцепени, и жилене в слепоочията.

Неспокоен сън.

Треска :

Треска, с топлина, жажда, въртене, плач, отвращение към храна.

Тръпки с треперене.

Следващата нощ едва успява да се стопли.

След лягане — обилно изпотяване, след което тръпките, зачервяването и пъпките изчезват.

Общи :

Неспокойство.

Общо неразположение.

Отпадналост, летаргия.

Умора по цялото тяло, със чувство за разтягане и прозяване; неестествена умора.

Детето иска да бъде носено.

Много хора припаднат при ваксинация.

Слабост.