

The Materia Medica

Nosodes

Henry Clay ALLEN

Copyright © Médi-T 2003

Variolinum

Описание :

Dr. Adolphus **Fellger** (1821–?) съобщава, че е давал **Variolinum** на стотици хора и нито един от тях не се е разболял от едра шарка.

В семейство, където бащата имал конлуентна едра шарка, той дал **Variolinum** профилактично — и макар никой от останалите да не бил ваксиниран, нито един не се заразил.

Съобщава случай на брокер във Филаделфия, силно белязан от едра шарка; като дете бил ваксиниран и станал идиотичен вследствие на това. На шестнадесет години получил тежка едра шарка, след което възстановил разума си.

Variolinum е показан при едра шарка, когато няма много болка; пациентът може дори да се храни сравнително добре; кожата изглежда нормална между пустулите; очната ябълка е бяла и естествена; леките, неусложнени случаи на едра шарка са тези, които изискват **Variolinum**.

Ум :

Делириум с начална треска.

Страх от смърт; диво вълнение и молби да узнае дали ще умре, и преди изречението да бъде завършено — потъва в тежък сън с шумно дишане.

Глава :

Световъртеж.

Припадък при опит да се изправи.

Челото много горещо, лицето червено и подпухнало, каротидите пулсират силно.

Главоболие: с или след тръпки; по цялата глава; особено във фронталната област; силно на върха; сякаш лента стегнато обхваща главата; силно ланциниращо, пулсиращо; < при всяка пулсация.

Нетърпима болка в тилната област.

„Лудо“ усещане в мозъка, трудно за описание.

Очи :

Кератит при едра шарка и след ваксинация.

Хронична офталмия със загуба на зрение.

Зениците стеснени.

Уши :

Глухота.

Лице :

Кожата на лицето и шията — тъмно тъмнопурпурен оттенък.

Челюстта пада при сън, с треперене при събуждане.

Направих прекрасно излекуване на най-упорит случай на акне с **Variolinum**, което предписах, защото лицето на пациента беше толкова обезобразено от цикатрикси, че приличаше на човек, прекарал едра шарка. — W. J. Guernsey.

Зъби :

Зъбите покрити с дебела кафява слуз.

Уста :

Дебел, мръсножълт налеп на езика.

При сън езикът изпъква, черен налеп; при повдигане трудно се прибира; изглежда като маса от гниеща плът.

Езикът обложен бял, сякаш с парче бял кадифен плат — при вариола с главоболие, болки в гърба и висока температура.

Гърло :

Гърлото много болезнено, зачервяване на фаринкса.

Фаринкс и фауси — тъмнопурпурно червени, с гангренозен вид; дъхът ужасно зловонен.

Болезнено преглъщане.

Усещане сякаш гърлото е затворено.

Усещане за буца в дясната страна на гърлото.

Дифтерия с ужасен *fetor oris*.

Апетит :

Храната, особено водата, има болестно сладникав вкус.

Стомах :

Болезненост в епигастриума и през епигастралната област.

Силна болка в прекордиалната област, често гадене и повръщане на жлъчна и кървава материя.

Често жлъчно повръщане.

Щом изпие мляко — веднага го повръща.

Изпражнения :

Тънки, кървави изпражнения.

Няколко кафяви, зелени, накрая тревнозелени изпражнения, безболезнени, редки, с нетърпимо зловонна миризма; без жажда; последният изпражнения слузест, с малко количество кръв.

Дизентерия.

Запек.

Пикочни органи :

Урина: тъмна, с цвят като бренди; мътна и зловонна; оставя розово-чаено петно, трудно за премахване.

Мъжки полови органи :

Уголемяване на тестиса.

Твърдо подуване на левия тестис вследствие на контузия.

Дихателни органи :

Затруднено дишане.

Астма.

Мъчителна кашлица, със серозни и понякога кървави храчки.

Изкашляне на гъста, лепкава слюз с лоша миризма.

Шия и гръб :

Скованост на шията, с напрегнато дърпане в мускулите, < при движение.

Болка в основата на мозъка и шията.

Тръпки като струи ледена вода, стичащи се надолу от между лопатките към сакралната област.

Нетърпима болезненост в лумбалната и сакралната област.

Болка в мускулите на гърба като ревматична; < при движение.

Горни крайници :

Ръцете ледено студени по време на инвазията.

Подуване на ръката, която преди това била наполовина парализирана.

Долни крайници :

Мускулен ревматизъм; < при движение.

Петехиални, еритематозни обриви в долната абдоминална област, с триъгълна форма — връх при пубиса, основа напречно през корема около пъпа; също по страничната повърхност на торса до аксилата, навлизащи в гънките на аксилата, съответната част на ръката и *pectoralis major*.

Ужасни болки в гърба от дясната страна на гръбнака и над и под лопатката; мускулите болезнени при допир; гадене; болки навсякъде, особено в краката; език чист; пулс 120; **Variolinum cm**; тялото напълно покрито с големи пустули, лицето — маса от конлуентни пустули; пулсът все още висок; постоянна експекторация на лепкава слюз; устата и фаринксът покрити с пустули, дори езикът покрит; запек; лек делириум; осем дни по-късно температура 104.5°F; пулс 120, много слаб и спиращ периодично; силен страх от смърт; молби да узнае дали ще умре, и преди изречението да бъде завършено — тежък сън със стертозно дишане; челюстта пада върху гърдите; зениците стеснени; зъбите покрити с дебела кафява слюз; центърът на езика напълно черен; лигавицата на устата и фаринкса — тъмнопурпурно-червена, с гангренозен вид; дъхът ужасно зловонен; кожата на лицето и шията — тъмнопурпурна; миризмата от тялото — като гнил поток; почти никакъв контрол над езика или челюстта; по-късно висящи надолу, езикът изпъква като маса от разложен черен дроб при сън; опит за говорене

причинява силно треперене на челюстта и езика, който трудно се прибира; твърд, изглежда като маса от гниеща плът; урината тъмна, но преминава свободно през целия пристъп; продължено **cm** до този момент; дадена една доза **cm** сухо върху езика; на следващия ден почти възстановен; напълно оздравява с малко белези.

Силен студ, последван от висока температура; силна болка в гърба сякаш счупен; болка по цялата глава, много силна и постоянна в тилната област; често жлъчно повръщане; дебел, мръсножълтеникав налеп на езика; див делириум и спазми; нощта преди появата на обрива — упорит запек; на третия ден — много гъст обрив от пустули на едра шарка, скоро ставащ конлуентен; **Variolinum cm**.

Едра шарка; специфичната миризма причинява силно гадене; конгестия към главата, сърцебиене; два часа след приемане на доза **Variolinum 30** — пълзящо усещане в гърба и студенина в долните крайници; студени крака; тежест и слабост в лявата ръка; липса на апетит; сънят нарушен от топлина; към сутринта — изпотяване; на следващия ден — постоянна притискаща болка в главата, особено в тилната област; пулс леко раздразнен; нежелание за умствена работа; при четене — топлина в главата и челото; слабост при ходене; болка в ставите на горните и долните крайници, сякаш са схванати; към вечерта — отново треска; притискаща болка в пояската област надолу към сакрума (**Glonoin. 3** облекчава главоболието); в леглото — дърпане в горната челюст и зъбите; сънят пълен с сънища; към сутринта — отново изпотяване; урината мирише на амоняк; на четвъртия ден — червени пъпки на гърба на лявата ръка, задържащи се няколко дни без да се изпълнят с гной; умствената работа все още причинява топлина в челото и натиск в главата; избегната едра шарка.

На третия ден от обрива, когато пустулите се изпълнили и били конлуентни на лицето — силен сърбеж; **Variolinum 1m** във вода, на всеки два часа; на втория ден сърбежът почти изчезнал, пустулите се свивали; на третия ден — изсъхване; на петия ден — коричките паднали от лицето; на седмия ден — останалите корички паднали, езикът чист.

Използвано в много тежки случаи; при лечение с **Variolinum 200** болестта се съкращава наполовина; страданията значително намаляват; вторичната треска отсъства или е много лека; пустулите не се разкъсват, а увяхват и падат; супуративният стадий е силно ускорен и съкратен; пациентите не остават белязани.

Две пациентки взели **Variolinum m** (Fincke), една доза на 22 ноември и друга на 23 ноември. На 24-ти се появила везикула на лявата страна на шията, станала болезнена и силно сърбяща след разкъсване на върха. Била червена и възпалена, с ясно очертан ореол около инч в диаметър; от възпалената основа излизали светложълти, лъчисти люспи като при псориазис. Протекла за около две седмици. Появили се няколко подобни петна на различни части на тялото, със силен сърбеж, но без системни

симптоми. И двете били ваксинирани години преди това, но никога не са имали никакъв обрив.

Кожа :

Екзантема от остри, заострени пъпки, обикновено малки; рядко големи и супуративни; сухи, върху малък червен ореол; често между тях — червени петна; понякога силен сърбеж.

Петехиални обриви.

Variolinum 30 предотвратило пристъп на едра шарка след силно гадене, причинено от миризмата на болен.

Variolinum във вода на всеки два часа, дадено на третия ден от обрива при конluentен случай — прекратило пристъпа.

Shing.

Треска :

Много силен студ, последван от гореща треска.

Интензивна треска, започваща с тръпки, стичащи се по гърба като струи студена вода, причиняващи треперене и тракане на зъбите.

Треска с интензивна излъчваща топлина, гореща на допир.

Гореща треска, без жажда.

Много обилно, зловонно изпотяване.