

The Materia Medica

Nosodes

Henry Clay ALLEN

Copyright © Médi-T 2003

Adrenalin

(Саркод)

Описание :

Екстракт от супрареналните тела.

Неговата химична формула е $C_3H_3A_2O_3$ и образува блестящи призматични кристали, които се топят при температура $207^{\circ}C$.; най-разтворим е в топла вода.

Има горчив вкус, който оставя усещане за изтръпване на върха на езика.

В разреждени киселини притежава ясно изразен афинитет към кислорода, и когато е изложен на въздух се променя в оксиадреналин, който е отровен, макар да не притежава свойствата на адреналин.

Именно на тази химична промяна, която постоянно настъпва в тъканите, се дължи преходният ефект на лекарството.

Брой случаи на болест на Адисон са били излекувани, а други — спрени в развитието си, чрез адреналин.

Повечето от тези случаи са настъпили в практиката на други школи и с големи дози от суровия препарат.

Много малко са докладвани в хомеопатичната школа; всъщност Raue казва, че не е успял да намери автентичен случай на това заболяване, излекуван в нашата литература.

Засега имаме само едно изпитване, направено през 1904 г. от студенти на Нюйоркския хомеопатичен колеж под ръководството на д-р V. L. Getman и следните изпитатели: M. W. Macduffie, W. G. LaField, G. H. Clapp, J. B. G. Custis, Jr., G. C. Birdsall и R. C. Miller.

Дневниците на изпитателите са пропуснати.

Ум :

Потиснат и нервен; липса на интерес към каквото и да е; липса на амбиция; неохота към умствена работа; отсъствие на „твърдост“.

Отвращение към умствена работа, не може да концентрира мислите.

Глава :

Горещо главоболие в лявата страна, разпространяващо се към дясната, < при четене и сутрин, с усещане сякаш очите са напрегнати.

Фронтално главоболие, супраорбитално, със запушен нос и очи.

Пареща топлина в главата, усещане сякаш иска да отвори очите широко.

Главоболие, разпространяващо се навсякъде, но < в лявата страна и над очите през челото.

Събуди се с главоболие над очите и в лявата страна на главата, сякаш иска да отвори очите широко и да ги притисне.

Тъпа болка по цялата глава, понякога дясностранна, понякога лявостранна, но винаги разпространяваща се към очите, причинявайки усещане сякаш иска да отвори очите широко.

Силна болка > при натиск върху очите.

Главоболие с гадене и топлина в лицето, без зачервяване, < вечер, но се появява отново веднага щом натискът се премахне.

Главоболие, разпространяващо се към ушите.

Всички главоболия са < следобед или вечер; вечер се появяват около 7 Р.М. и продължават, докато не бъдат облекчени от разходка на открито или сън.

Ако главоболието се появи следобед, времето е 3 Р.М., винаги > от разходка на открито и донякъде облекчено от хранене и сън, но не толкова напълно, колкото от разходка на открито.

Когато главоболието е по-силно, то също е > от натиск върху очите и широко отваряне на очите, и е < от умствен труд и престой на закрито.

Тъпо главоболие над очите; чувство за пълнота в главата.

Невралгично главоболие; болките започват от основата на мозъка, вървят напред над главата към фронта и страните; болките са първо стрелкащи и сякаш точно под скалпа, появяват се в 11 А.М. и продължават до 3 или 4 Р.М., и изчезват при хранене, на открито, < в затворена, топла стая.

Мозъкът се чувства подут, сякаш е твърде голям за черепа.

Конгестия на мозъка през деня.

Тъпо болезнено усещане в очните ябълки с главоболието, > при натиск и при разтриване на очите.

Главоболие, появяващо се в 11 А.М., продължаващо до 12:30 през нощта, > при хранене.

Пълнота в главата следобед и вечер.

Приливи на топлина вечер по лицето и главата, но лицето е само леко зачервено.

Тъпо усещане в главата от 3 до 6 Р.М.

Фронтално главоболие.

Очи :

Усещане за напрежение; конгестия; усещане сякаш иска да ги отвори широко или да ги притисне.

Болка в дясното око.

Натиск върху очите и широко отваряне > главоболието.

Хиперемия на конюнктивата се разсейва почти незабавно при локално приложение; така прави операциите възможни.

Болезненост в очните ябълки, > при натиск и разтриване.

Уши :

Болезненост в лявото ухо съпътства главоболието; понякога остра болка и в двете уши.

Сърбеж и гъделичкане в дясното ухо, > при бъркане в ухото с пръст.

Нос :

Конгестия, чувство за пълнота в носа.

Желатинозни капки слуз падат от задните носни ходове, трудно се отделят.

При излизане на студен въздух имаше обилно, воднисто носно течение, < отдысно; когато беше на закрито, носът се чувстваше пълен и запушен.

Лека запушеност в носа, с чувство за пълнота в корена на носа.

Лице :

Чувства се затоплен, но не е зачервен.

Приливи на топлина по лицето и главата; затоплен през цялата вечер.

Уста :

Лош вкус при събуждане.

Устата пълна с тъмнокафява слуз, която има неприятен вкус.

Езикът обложен бял, червен ръб и връх.

Езикът чист отпред; устата суха.

Езикът понякога обложен бял в задната част.

Гърло :

Много покашляне и прочистване на гърлото.

Гласните връзки възпалени; ларингеален катар, обилна секреция от фарингеалните жлези на белезникава желатинозна слуз, която беше трудна за отделяне.

Дясната страна подута и болезнена, червена и възпалена, < при преглъщане.

Стомах :

Оригване след хранене.

Апетитът увеличен.

Усещане за гадене, сякаш ще повърне.

Болка в стомаха, преминаваща отдысно наляво, появяваща се и изчезваща внезапно.

Гадене преди хранене, макар апетитът да е добър, щом започне да яде.

Апетит увеличен; вълчи глад.

По-малка жажда от обичайното.

Понякога жажда за големи количества, увеличена вечер.

Корем :

Къркорене в червата; борборигми.

Изпращания :

Преминаване на зловонни газове.

Изпращание рядко, кафяво, полутвърдо, преминава бързо, с фетиден мирис.

Внезапна пръскаща диария; всичко приключва за минута, последвано от парене в ануса.

Урина :

Силен мирис, гореща и пареща; честа, обилна, бледа.

Парене преди и по време на уриниране.

Внезапно спешно желание за уриниране.

Количеството урина намалено, твърдите вещества увеличени.

Кристалите на натриев оксалат увеличени, докато натриевият урат се появи по време на изпитването и беше много изразен; няма цилиндри.

Гнойни клетки, които присъстваха в началото, изчезнаха; няма епителни клетки.

Хематурия със силна болка в бъбречната област; излекувана.

Уриниране по-често от обичайното.

Мъжки :

Сперматозоиди налични (в урината?) в началото и през първата част на изпитването, напълно изчезват.

Сексуалното желание увеличено, без ерекции.

Ерекции; похотливи сънища през цялата нощ, причиняващи събуждане от сън.

Емисии рано сутрин без никакви лоши ефекти.

Дихателни :

Кашлица, от раздразнение в супрастерналната ямка.

Отхрачване на желатиозна слюз, която е трудна за отделяне.

Увеличение на дихателните движения, скоро последвано от задушаване и смърт от парализа на продълговатия мозък и пневмогастрика (суров препарат).

Гръб :

Болка особено в лявата страна; по-добре при изправено седене или лежане по права линия.

Крайници :

Леки ревматични болки, появяващи се и изчезващи надолу по крака.

Левият крак, ходило и седалище лесно изтръпват и се чувстват вцепенени; това вцепеняване се разпространява към двата долни крайника, но е < в левия.

Ръцете и краката лесно изтръпват; вцепеняване и мравучкане отдолу нагоре.

Мазоли по пръстите на краката.

Болезненост в крайниците при ходене сутрин; болезненост в прасците.

Ревматични болки в левия лакът и малкия пръст при събуждане.

Силен крамп в дясната пета, продължаващ десет минути, след това същото в лявата пета, последвано от болка в стомаха.

Краката уморени и болезнени, особено в прасците и под коленете.

Глезените се чувстват слаби и уморени.

Болезнено подуване на първия пръст на дясната ръка, завършващо с панариций.

Уморена болезненост в ръцете и краката при събуждане.

Тъпа болка в ръцете и краката.

Тъкани :

Притежава мощно локално действие върху разширени кръвоносни съдове.

Когато се инжектира в кръвообращението, артериите се свиват и кръвното налягане се повишава.

Продължителна контракция на общата мускулна система.

Повтарящи се инжекции причиняват атерома и сърдечни увреждания при животни.

Кожата става бронзова; голяма загуба на сила; бързо отслабване; изключително бърз пулс; неправилни, прекъсващи сърдечни удари; общо изразена анемия.

Сън :

Голяма сънливост и отпадналост.

Сънлив вечер и след добър нощен сън.

Тъпота и сънливост от 3 до 6 P.M.

Треска :

Приливи на топлина по лицето и главата.

