

The Materia Medica

Nosodes

Henry Clay ALLEN

Copyright © Médi-T 2003

Ambra grisea

(Амбра)

Описание :

Dr Heinrich A. von GERSDORFF

Съмнителен произход, години наред на границата относно истинската си класификация, но вероятно носод или болестен продукт, намиран в корема на кашалота, *Physeter macrocephalus*.

Често се намира плаваща по морето или изхвърлена на брега на Балтийско море, или на бреговете на Мадагаскар или Суматра.

Но може би най-добрите екземпляри са тези, които китоловците изрязват и които се намират в Бостън и други китоловни пристанища.

Има много характеристики на чревни или билиарни конкременти и се е смятало, че е с чернодробен произход, вероятно мастна екскреция от жлъчния му мехур.

Въведена е от Ханеман през 1827 г.; изпитана от него и неговия приятел граф де Герсдорф, който лично е получил почти половината от симптомите.

Т.нар. „Масло от амбра“ (използвано от д-р Holcombe при хълцане) е *Oleum Succinum* и не трябва да се бърка с амбра гризеа.

Характеристики :

За деца, особено млади момичета, които са възбудими, нервни и слаби; нервни заболявания, възрастни хора, „износени“ нерви; преждевременна старческа немощ; обща функционална недостатъчност.

Оплаквания на двата крайни периода от живота.

Кльощави, слаби, изтощени хора, които лесно настиват; „изсъхнали“; нервни, слаби, жилисти жени (**Secale**); нервен билиозен темперамент.

Голяма тъга, седи с дни и плаче.

Голяма свенливост, много характерна; смутена в компания, в болнична стая.

Присъствието на други, дори на медицинската сестра, е непоносимо по време на изхождане; чести, безрезултатни позиви, които я правят тревожна.

След делови затруднения не може да спи, трябва да стане (**Act.**, **Sep.**).

Ляга уморена, но става будна веднага щом главата докосне възглавницата.

Слабост; отпадналост; изтръпване на отделни части; едностранни оплаквания.

Ранула с фетиден дъх (**Thuja**).

Усещане за студ в корема (**Cal.**); на отделни части.

Не може да уринира в присъствието на други хора (**Nat. mur.**).

Изтичане на кръв между менструациите при много малък повод — дълга разходка, след всяко твърдо изхождане и др.; нимфомания; силен пруритус, особено в пуерпериума.

Левкорей; гъста, синкаво-бяла слуз, особено или само през нощта (**Caust.**, **Mer.**, **Nit. ac.**).

Кашлица силна; в спазматични пристъпи, с оригвания и пресипналост; < говорене или четене на глас (**Dros.**, **Phos.**, **Tub.**); вечер без, сутрин с експекторация (**Bry.**, **Carb. v.**, **Hep.**, **Hyos.**, **Phos.**, **Puls.**, **Sep.**); коклюш, но без „вдишващ вик“; < когато има много хора.

Връзки :

Антидотира се от **Camph.**, **Cof.**, **Nux**, **Puls.**, **Staph.**, **X-ray**.

Ambra антидотира **Staph.**, особено сладострастния сърбеж на скротума.

Nux антидотира потенцираната **Ambra**.

Сравни :

Calc., **Nat. c.**, **Tub.** (студ в корема); **Cast.**, **Asaf.**, **Psor.**, **X-ray**, **Val.** — дефектна реактивност; **Coca**, **Fer.** — свенливост и изчервяване; **Mosch.**, **Val.** — припадък, хистерична астма; **Act.**, **Ign.** — нощна кашлица; **Iod.**, **Nux**, **Tub.** — слаби, изтощени, нервни, раздразнителни хора; **Ars.**, **Tub.** — астматични състояния; **Phos.** — астма,

нервен, възбудим, слаб, раздразнителен пациент, висок и слаб; **Bov.** — течение на всеки няколко дни между менструациите; **Lach., Rhus., Sepia** — < от пренатоварване; **Cof., Croc., China, Ign., Puls., Sec., Staph., Sulph.** — нервни хистерични състояния; **Kali bi., Iod.** — сърбеж зад стернума при силна, разтърсваща, пристъпна кашлица.

Carbo veg. и **Petr.** при липса на реакция в остри заболявания.

При жени, които са прекалено нервни и не реагират в остри състояния.

Агравирание :

Топли напитки, топла стая; вечер; лежане, особено на безболезнената страна (**Arn., Bry., Calc., Puls., Rhus.**); четене или говорене на глас; музика; присъствието на много хора; след събуждане (**Lach., Sep.**).

Подобряване :

След хранене; на студен открит въздух; студена храна и напитки; ставане от леглото, опирание върху засегнатите части.

Болки :

Разкъсващи, теглещи, пробощащи; с усещане за натиск.

Сфера :

Кърмачето е слабо, раздразнително и умствено недоразвито, слабо и изтощено, образ на малък изсъхнал старец.

Косата побелява и пада; паметта става ненадеждна; възприемането е забавено; слухът, обонянето и зрението започват да отслабват; нервност, тревожност, меланхолия; отвращение към компания или безразличие към семейството и житейските дела — постепенни стъпки към старческа немощ.

От дефектна асимилация тъканите се обедняват; от слаба циркулация има студени крайници, изтръпване и световъртеж.

Тези признаци на старческа разруха могат да се срещнат в различна степен във всяка възраст, и това е сферата на **Ambra.** — Farrington.

Ум :

Паметта отслабена.

Възприемането бавно, трябва да чете всичко три или четири пъти и пак не го разбира.

Не е способна да размишлява правилно върху нищо, чувства се глупава.

Объркване в главата; в тилната област.

Трудно мислене сутрин.

Изкривени образи, гримаси; дяволски лица нахлуват във въображението му.

Тя е възбудена, бърлива; непостоянното говорене я уморява; не можеше да спи през нощта, или е с отвращение към говорене и смях.

Голяма тъга; потисната, не иска да живее.

Принудена е да мисли за най-неприятните неща; безсъние вследствие на това.

Меланхолия, седи с дни и плаче; с голяма слабост, загуба на мускулна сила и болка в кръста и запек.

Страх да не полудее.

Отчаяние; отвращение от живота.

Тревога и изпотяване по цялото тяло през нощта.

Тревожност, потиснатост, нервна слабост с раздразнителност и нетърпение.

След делови затруднения не може да спи, трябва да стане и да ходи (**Rhus r., Sep.**).

Бърза прекалено много, когато е заета с умствена работа.

Смущение в компания; изчервяване, свенливост (**Fer., X-ray, Tub.**).

Кашлица по-лоша, когато има много хора.

Присъствието на други хора влошава симптомите.

Сензориум :

Световъртеж с усещане за тежест на върха на главата; < след сън, < след хранене.

Тя трябваше да легне поради световъртеж и усещане за слабост в стомаха.

Музиката причинява прилив на кръв към главата.

Голяма слабост в главата със световъртеж.

Глава :

Натиск във фронталната област и върха на главата със страх да не полудее.

Разкъсващи болки: във фронталната област; в левия слепоочен дял, изкачващи се към върха; в дясната фронтална издатина и зад лявото ухо.

Изключително болезнено разкъсване на върха на главата и сякаш в цялата горна половина на мозъка, с бледност на лицето и студеност на лявата ръка.

Пресиращо теглене, изкачващо се от тила и преминаващо през главата към челото, като значителна тежест остава в долната част на тилната област.

Тъпота в тилната област.

Разкъсващите болки преобладават в главата.

Прилив на кръв към главата, причинен от музика.

Слабост в главата със световъртеж.

Косата пада, косата побелява рано.

От дясната страна на главата — място, където косата боли при допир, сякаш е възпалено.

Скалпът се чувства болезнен сутрин при събуждане; след това следва усещане за изтръпване, разпространяващо се по цялото тяло.

Очи и зрение :

Замъглено зрение, сякаш гледа през мъгла.

Натиск и парене в очите, сякаш от прах; сълзене.

Натиск върху очите, които трудно се отварят, и болка в очите, сякаш са били затворени твърде силно, особено сутрин.

Сърбеж на клепача, сякаш се образува ечемик.

Уши и слух :

Бучене и свирене в ушите следобед.

Глухота на едното ухо.

Пращане в лявото ухо (като звук при навиване на часовник).

Слухът намалява; със студено усещане в корема.

Силна разкъсваща болка в и зад дясната ушна мида.

Разкъсване в дясното ухо.

Пълзене, сърбеж и гъделичкане в ушите.

Музиката влошава кашлицата.

Слушането на музика предизвиква конгестия към главата.

Нос :

Събрала се засъхнала кръв в носа.

Кървене от носа рано сутрин.

Кървене от носа по време на менструация.

Обилно кървене от носа рано в леглото, няколко последователни дни.

Носът запушен и болезнен, сякаш е възпален отвътре.

Продължителна сухота в носа, често дразнене сякаш от кихане.

Лице :

Бледност на лицето при главоболие.

Приливи на топлина в лицето.

Топлина в лицето със студенина на други части.

Разкъсване в горната част на лицето, особено близо до дясната ноздра.

Пъпки и сърбеж в брадата.

Болезнено подуване на бузата върху горната челюст, с пулсиране в венците.

Жълтеникав цвят на лицето.

Спазматично потрепване на лицевите мускули, долната част на лицето; вечер в леглото.

Устните горещи.

Устните изтръпнали и сухи сутрин при събуждане.

Крамп на долната устна.

Зъби и венци :

Теглеща болка ту в един, ту в друг зъб; увеличена от топлина, моментно облекчена от студ; не < при дъвчене и преминава след хранене; едновременно вътрешната част на венците е подута.

Кървене от венците.

Уста :

Горчив вкус в устата сутрин при събуждане.

Кисел вкус след пиене на мляко.

Болка като от възпаление във гънките под езика, като малки израстъци.

Ранула.

Езикът синкав, оловносив (**Ars.**).

Лош дъх, по-лош сутрин.

Мехури в устата, болка като от изгаряне; под езика — възелчета като малки израстъци, които болят като от разраняване; парене и напукана болезнена устна кухина; поради болката не може да яде нищо твърдо.

Натрупване на вода в устата при кашлица.

Стържеща, пареща болка в устата при ядене на твърда храна (**Phos. ac.**).

Сутрин при събуждане — език, уста и устни сякаш изтръпнали и сухи (усещане за изтръпване в гърлото, **Mag., Sulph.**).

Езикът обложен сивкаво-жълто.

Гърло :

Усещане за суровост в областта на мекото небце.

Суровост в гърлото с кашлица.

Разкъсваща болка в небцето, разпространяваща се към лявото ухо.

Сухота в гърлото сутрин.

Болезнено усещане в гърлото при преглъщане и при външен натиск, но не при преглъщане на храна, с напрежение на жлезите на гърлото, сякаш са подути.

Болки в гърлото след излагане на течение; бодежи от гърлото към дясното ухо; болките особено при движение на езика.

Гъделичкане в гърлото, което предизвиква кашлица.

Гъделичкане в гърлото и щитовидното тяло по време на кашляне.

Натрупване на сивкава хрипка в гърлото, която трудно се изхравва, придружено от суровост.

Изхравването на хрипки от фаринкса предизвиква повръщане и задавяне.

Папулозен обрив във фаринкса.

Парене в задната част на фаринкса, когато не преглъща.

При изхравване на слюз сутрин — почти неизбежно давяне и повръщане.

Стомах :

Липса на жажда.

След закуска — гадене.

След хранене:

кашлица и прозяване или позиви за повръщане; тревожност; натиск в ямката на стомаха, сякаш храната е заседнала и не слиза надолу (храната слиза бавно и попада в ларинкса — **Kali carb.**); храната се усеща, докато не влезе в стомаха (**Alum., Bry., Phos.**).

Влошаване от топли напитки, особено от топло мляко.

По-добре след хранене: зъбобол; тежест в гърдите; втрисане и др.

След пиене на мляко: кисел вкус; киселини.

Оригване с кашлица и след кашлица.

Оригвания — празни, кисели или горчиви.

При ходене на открито — киселини с задържани оригвания.

Оригвания с кашлица, почти причиняващи задавяне.

Оригването премахва натиска под епигастриума.

Хълцане.

Усещане за студ в стомаха.

След излагане на студ по време на шейна — страдала непрекъснато, лято и зима, 14 години, от усещане за студ в стомаха; използвала всякакви подложки и затоплящи средства без облекчение; излекувана за 24 часа.

Киселини: с абортивни оригвания; при ходене на открито; след пиене на мляко, особено топло мляко.

Всяка вечер — усещане за разстроен стомах и парещи издигания към ларинкса.

Гадене след закуска.

Повръщане и задавяне при изхрочване на хрочки от фаринкса.

Натиск и парене под епигастриума; оригването го премахва.

Натиск в стомаха и хипохондриума.

Напрежение и натиск или боджи и натиск в стомаха.

Сътресение в ямката на стомаха при кашлица.

Слабост в стомаха, придружаваща световъртеж; трябва да легне поради световъртеж и усещане за слабост в стомаха.

Корем :

Пресираща болка в малко място в горната дясна част на корема, макар да не се усеща при допир.

Разкъсваща болка в областта на далака, сякаш нещо се откъсва.

Болка в дясната хипохондриална област > при лежане върху нея.

Напрежение и подуване на корема след всяка хапка, дори след всяка глътка течност.

Подуване на корема; натрупване на много газове, които спадат без да бъдат отделени.

Усещане за студ в корема.

Студенина в едната страна на корема (лявата); също и при глухота.

Колики, понякога последвани от диария.

Натиск дълбоко в хипогастриума след изхождане.

Изпражнения и анус :

Първо обилни, меки, светлокафяви изпражнения след няколкодневен запек.

Запек: чести безрезултатни позиви както при **Nux vomica**, но придружени от голяма тревожност при изхождане и ясно усещане за студ в корема; пациентите изпитват голямо страдание от присъствието на други хора в стаята (непоносимост към присъствието на други при уриниране — **Nat. m.**); след изхождане — дълбока болезненост в хипогастриума; сърбеж и парене в ануса, облекчени от разтриване.

Диария, предшествана от колики.

Изпражненията не са твърди, макар да са големи.

Чести безрезултатни позиви за изхождане; това я прави много тревожна, а присъствието на други хора става непоносимо.

Голямо количество кръв с изпражненията.

Сърбеж в ануса.

Бодежи в ануса.

След изхождане — натиск дълбоко в хипогастриума.

Пикочни органи :

Често уриниране през нощта (**Lyc.**) и сутрин след ставане.

Болка в пикочния мехур и ректума едновременно.

Урината мирише кисело; урината мътна дори когато е прясно отделена.

Урината при отделяне е мътна, жълтеникаво-кафява и оставя кафяв утайка, след което изглежда бистра и жълта; утайка като кафе.

Кисела миризма на урината.

Уринира три пъти повече от изпитото количество, особено сутрин; последвано от тъпа болка в областта на бъбреците.

Усещане сякаш няколко капки преминават през уретрата.

По време на уриниране — парене, пареща болка, сърбеж и гъделичкане в уретрата и вулвата.

Мъжки полови органи :

Мъж, 80 г., получава астма при опит за коитус.

Импотентност.

Силни сутрешни ерекции без желание, с изтръпване на частите.

Вътрешно, силно, сладострастно усещане в гениталните органи.

Сърбящи пъпки по мъжките гениталии.

Суровост и болезненост между бедрата.

Сладострастен сърбеж на скротума.

Женски полови органи :

Нимфомания: често с течение на синкаво-бяла слуз, < през нощта, бодежи във влагалището преди отделянето.

Парене в половите части, с отделяне на няколко капки кръв.

Бодежи в яйчниковата област при прибиране на корема или натиск върху него.

Изтичане на кръв между менструациите при всеки малък повод, при всяко твърдо изхождане или след малко по-дълга разходка от обичайното.

Менструация ранна; левият крак става напълно син от разширени варици, с пресираща болка в крака.

Лежането влошава маточните симптоми.

Счита се, че причинява маточна атония.

Потисната менструация.

Менструация твърде ранна и твърде обилна.

Менструацията се появява седем дни преди срока.

Силен сърбеж на външните полови органи, трябва да разтрива частите.

Суровост и сърбеж, със подуване на лабиите.

По време на уриниране: сърбеж, гъделичкане, парене на вулвата и уретрата.

Гъста, слузеста левкорей, увеличаваща се ден след ден, или левкорей през нощта, синкаво-бяла слуз; преди всяко отделяне — бодеж във влагалището.

По време на бременност: нервност, неспокойствие; пруритус вулве.

Предстоящо аборт.

Пуерпериална еклампсия.

Намалява силата на родилните болки.

В пуерпериума — упорит запек и тenezми; коремът подут, причинява голяма тревожност; толкова нервна, че не може да опита изхождане в присъствието на други хора, дори на медицинската сестра.

Revillout сравнява общото действие на **Ambra** с това на **Kali bromatum**.

Ефектът настъпва по-бързо след **Ambra**, но този на **Kali bromatum** продължава по-дълго.

Следователно **Ambra** е предпочитана за премахване на тежки рефлексни действия, детски спазми, пуерпериална еклампсия.

Ambra прекрасно успокоява нервното неспокойствие при бременност и така предотвратява гърчове; също така забавя маточните контракции.

Revillout препоръчва **Ambra** при бременност:

1. За предотвратяване на еклампсия.
2. За намаляване на твърде силни родилни болки.
3. При твърде ранно раждане или заплашващ аборт.

Но **Ambra**, давана твърде често и в твърде голяма доза, може да причини маточна атония.

Ambra, давана в големи дози, може обикновено да премахне гърчове, независимо от причината, и чрез намаляване на нервността действа благоприятно при нервни хора, деца и млади момичета.

Тук има още един случай на неволна хомеопатия.

Ambra причинява у здрави хора парене в половите части с отделяне на няколко капки кръв; менструацията настъпва няколко дни твърде рано; причинява изтичане на кръв извън менструацията, също fluor albus и вероятно овариит.

Причинява също потрепвания в мускулите, спазми, неспокойствие, слабост, тревожност, потиснатост, нервна слабост с раздразнителност и нетърпение, потрепвания и подскоци в крайниците, със студенина на тялото и голяма слабост — състояние, често срещано при жени и възбудими, слаби деца, комбинирано с безсъние; много сънища, уплашено събуждане, неспокоен сън през нощта, общо неспокойствие, раздразнителност, тревожност и отчаяние.

Дишане :

Гъделичкане в ларинкса със спазматична кашлица.

Гъделичкане в гърлото, ларинкса и трахеята, причиняващо силна кашлица.

Пресипналост и грапавост на гласа, с натрупване на гъста, лепкава слуз, лесно отделяна при кашляне.

Сърбеж, стържене и болезненост в ларинкса и трахеята.

Четенето на глас или говоренето влошава кашлицата.

Сърбеж в щитовидната жлеза; сърбеж зад стернума, причиняващ кашлица.

Стягане в гърдите, не може да поеме дълбок дъх или да се прозява дълбоко.

Усещане за тежест в гърдите и между лопатките; отслабва за кратко след хранене.

Усещане за натиск в гърдите, по-лошо при издишване.

Астма при възрастни хора и деца.

Астма се появява, докато се опитва коитус.

Свирене в гърдите при дишане.

Задъхва се при кашлица, която е спазматична; прилив на кръв към главата.

Кашлица :

Спазматична кашлица, губи дъх; с прилив на кръв към главата; накрая се отделя малко храчка.

Кашлица в спазматични пристъпи.

Празна, спазматична, лаеща кашлица; по-лоша от говорене или четене на глас; с даване след хранене.

Спазматична кашлица при възрастни или изтощени хора.

Пристъпи на кашлица, идващи от дълбоко в гърдите, предизвикани от силно гъделичкане в гърлото; вечер без, сутрин с експекторация, обикновено сивкаво-бяла, рядко жълта слуз, със солен или кисел вкус; лепкава сива слуз; по-лошо сутрин.

Силна спазматична кашлица, с чести оригвания и пресипналост; с болка в областта на далака, сякаш нещо се откъсва.

Повдигането на тежък предмет влошава кашлицата.

Кашлица само през нощта, причинена от прекомерно дразнене в гърлото.

Кашлица с оригвания на газ, почти причиняващи задавяне (**Lach.**).

Кашлица всяка вечер с болка под левите ребра, сякаш нещо се откъсва там.

Натрупване на сива слуз, трудно за изхрочване, придружено от суровост и почти неизбежно даване и повръщане.

Кашлица по-лоша, когато има много хора.

Кашлицата причинява сътресение в ямката на стомаха.

Кашлица с изтощение.

Вид коклюш; пристъпна, но без „вдишващ вик“; < след лягане.

Дълбока суха кашлица, с натрупване на вода в устата и последваща суровост в гърлото.

Задавяне и повръщане при изхрочване на хрочки от фаринкса.

Хрочки жълто-бели, кремообразни; „sputum coctum“.

Натрупване на хрочки в гърлото, трудно за изкашляне.

Стари кашлици.

Стържене и гъделичкане в гърлото, ларинкса, надолу по трахеята, причиняващи силна кашлица с усещане за плътно прилепнала слуз в трахеята; при дишане — свирене в гърдите; груб и пресипнал глас; натрупване на слуз в гърлото, трудно за изкашляне.

Кашлица най-вече само през нощта от силно дразнене, със сътресение в ямката на стомаха; кашлица понякога в спазматични пристъпи, с тежест в гърдите, задъхване, голямо неспокойствие и след това много оригване — вид коклюш.

При нервни хора причинява гъделичкане в ларинкса и спазматични пристъпи на кашлица; свирене в гърдите; спазматично кратко дишане; сърдечна тревога и спазматично сърцебиене.

Гръден кош и бели дробове :

Болка в долната част на дясната гръдна половина, облекчена при лежане по гръб.

Бодежи в гърдите, разпространяващи се към гръба.

Тежест в гърдите, разпространяваща се към гръба между лопатките.

Облекчава се за кратко след хранене.

Усещане за натиск дълбоко в дясната гръдна половина; също в лявата или в горната част на гърдите.

Свирене в гърдите.

Усещане за суровост в гърдите.

Разкъсващ натиск в лявата страна на гърдите.

Сърбеж в гърдите.

Стягане в гърдите, не може да се прозява или да диша дълбоко.

Усещане за бучка в гърдите.

Болестеност в гърдите над епигастриума, сякаш частите са били бити; облекчава се от оригване.

Силна, тъпа, бодяща болка в дясната гръда, прекъсваща дишането.

Парене във външните части на гърдите.

Натиск в горната част на гърдите, появяващ се в редовни пристъпи.

Сърце и пулс :

Тревожност в областта на сърцето, причиняваща затруднено дишане, с приливи на топлина, тежестта започваща от сърцето.

Сърцебиене при ходене на открито, с бледност на лицето.

Силно сърцебиене, с натиск в гърдите, сякаш лежи бучка там, или сякаш гърдите са натъпкани.

Пулс ускорен, с приливи.

Усеща пулса в тялото; чувства се като тиктакане на часовник.

Външен гръден кош :

Парене на гърдите.

Шия и гръб :

Жлезите на гърлото напрегнати, сякаш подути.

Парене в лявата лопатка.

Разкъсване в лявото или в двете рамене.

Ревматични болки в дясната страна на гърба.

Болезнено напрежение в лумбалните мускули.

Бодежи в кръста при седене.

Скованост в кръста след седене.

Болка в кръста, със загуба на мускулна сила и запек.

Горни крайници :

Разкъсване в лявата раменна става.

Теглене, сякаш навехнато и схванато в рамото.

Ръцете „заспиват“ при лежане върху тях, при носене на нещо в ръцете или през нощта; с изтръпване особено на лявата ръка в покой, мравучкане в палеца.

Разкъсващи болки в рамото, лакътя, предмишницата и ръката.

Слабост на пръстите през нощта.

Бодежи в ръцете и пръстите, сякаш от насекоми.

Теглене в пръстите и палеца.

Сърбеж в дланите.

Крампи в ръцете, понякога само при хващане на нещо.

Върховете на пръстите са набръчкани.

Разкъсване, бодежи или сърбеж във върховете на пръстите и палеца.

Кожата на пръстите се усеща напрегната.

Продължителна ледена студенина на ръцете.

Студенина на лявата ръка при главоболие.

Чупливи нокти при много стар човек; станали меки, еластични и розови.

Долни крайници :

Разкъсваща болка, първо в лявата, после в дясната тазобедрена става.

Усещане за свиване в дясното бедро; крайникът изглежда скъсен.

Разкъсване в седалището, тазобедрената става, коляното, подбедрицата, глезена и стъпалото.

Тежест в краката.

Трептящо усещане в краката.

Усещане сякаш „заспали“ и двата крака; няма стабилна походка.

Крампи в краката и прасците почти всяка нощ.

Студени крака.

Подагрозна болка в възглавничката на големите пръсти.

Сърбеж по вътрешния ръб на стъпалото на десния крак, не се облекчава от чесане.

Суровост и разраняване между бедрата и в ямките на коленете.

Левият крак става син от разширени варици по време на менструация.

Разкъсващи или ревматични болки в части на всички крайници.

Необичайно потрепване и студенина на тялото през нощта.

Неспокойство, като пълзене, с тревожност, само през деня.

Отпадналост, с болезнена чувствителност на всички крайници.

Нерви :

Тризм на новородени.

Неспокойствие.

Тикове и потрепвания.

Гърчове.

Епилепсия.

Детски спазми.

Спазми и потрепвания в мускулните части.

Спазматични оплаквания.

Ръцете и крайниците „заспиват“ лесно.

Голяма отпадналост, особено сутрин в леглото.

Припадък.

Слабост на цялото тяло; на коленете, сякаш ще се подгънат; на стъпалата, със загуба на усещане; в стомаха, така че трябва да легне.

Голяма прострация след продължителни трески.

Хлороза.

Загуба на мускулна сила.

Световъртеж и нервна апоплексия.

Паралитични оплаквания.

Изтръпване на цялото тяло.

При ходене на открито — неспокойствие в кръвта и по-бърза циркулация, с по-голяма слабост на тялото.

Разговорът причинява умора, тежест в главата, безсъние, тежест в гърдите, потене, тревожност; треперене и тръпнене; нервност и раздразнителност.

В. W., 58 г., пълен, румен, дясната страна парализирана от пет години, ходи трудно, влачи десния крак; световъртеж с усещане за голяма тежест на върха на главата пет години; по-лошо след сън; безсъние след 1 ч.; загуба на памет; загуба на обоняние; изтръпване на дясната страна; студена пот по крайниците, десният крак по-студен от левия; гадене в корема; имал много скръб, **Ign., Con., Ver. b.**; малко облекчение.

Ambra 200 (две сухи дози) премахва болката във върха на главата, световъртежа и гаденето.

Сън :

Не може да спи, трябва да стане; тревоги от делови затруднения; безсъние на делови хора.

Не може да спи през нощта, но не знае защо.

Сънлива при лягане; но щом главата докосне възглавницата, е напълно будна с часове, неспокойна, върти се или просто не може да затвори очи.

Неспокоен сън, с тревожни сънища.

Досадни, тревожни сънища и говорене насън; събужда се уплашена.

Безсъние след 1 ч.

По-лошо от твърде малко сън.

Потрепване на крайниците, пречещо на съня, и студенина.

Неспокоен сън от студенина и потрепване.

Почти всяка нощ — крампи в прасците.

По-лошо след сън: световъртеж; тежест на върха на главата; коклюш; слабост; сухота в устата; отпадналост; очите сякаш били затворени твърде силно.

При събуждане: болезненост на скалпа; устни изтръпнали и сухи; горчив вкус в устата.

Рано в леглото: кървене от носа; голяма отпадналост.

Температура и време :

< от топлина: зъбобол.

от студ: зъбобол.

< в топла стая: кашлица.

от движение на открито.

< от топли напитки.

След излагане на течение: възпалено гърло.

При ходене на открито: киселини; сърцебиене; неспокойствие в кръвта; < слабост.

Настинал и изпотяването се е спряло след гръмотевична буря, от северен вятър в лицето; мъчителна кашлица няколко седмици.

Треска :

Втрисане преди обяд, с отпадналост и сънливост; облекчава се от хранене; кожата на цялото тяло студена, освен лицето и гениталиите.

Втрисане на отделни части на тялото, с топлина на лицето.

Тревожни приливи на топлина, повтарящи се на всеки четвърт час; най-силни към вечерта.

Обилно потене през нощта, по-лошо след полунощ и най-много от засегнатата страна.

Обилно потене, особено на корема и бедрата, при физическо усилие.

Злокачествени трески.

Кожа :

Сърбеж.

Жълтеникав цвят на лицето.

Парене в кожата; върховете на пръстите се набръчкват.

Болезненост на брадавица на пръста.

Изтръпване на кожата.

Парещ херпес.

Лепрозни оплаквания.

Сърбящи пъпки в брадата.

Суровост и разраняване между краката и в ямките на коленете.

Разширени варици на крака по време на менструация.

Възпроизвежда крастата.

Нервен сърбеж по цялото тяло, особено около лигавичните отвори.