

Materia Medica

William Boericke

6

Serum anguillae

Серум ангуилае **Serum anguillae (Serum anguillar ichthyotoxin)**

Серумът от змиорка има токсично действие върху кръвта, бързо разрушавайки еритроцитите. Наличието на албумин и бъбречни елементи в урината, хемоглобинурията, продължителната анурия (24–26 часа), както и резултатите от аутопсията ясно показват неговото избирателно действие върху бъбреците. Вторично се засягат черният дроб и сърцето — изменения, типични за инфекциозни заболявания.

От тези факти следват терапевтичните показания: При остро засягане на бъбреците — от студ, инфекция или интоксикация — с олигурия, анурия и албуминурия, серумът от змиорка е особено ефективен за възстановяване на диурезата и бързо спиране на албуминурията. При сърдечни заболявания, когато бъбрекът, преди това функциониращ добре, внезапно се засяга и функцията му се инхибира, с аритмии и изразена асистолия — серумът може да даде добри резултати.

Digitalis е показан при триада: хипертония, олигурия, отоци. **Serum anguillae** — при хипертония и олигурия **без отоци**. Ако **Digitalis** е сърдечно средство, то **Serum anguillae** е **бъбречно** средство.

Серумът дава малки резултати при пристъпи на асистолия, но е много ефективен при **кардиална уремия**. Там, където **Digitalis** е безсилен, серумът от змиорка премахва бъбречната обструкция и предизвиква обилна диуреза. Неговото специфично показание е **остър нефрит от студ (a frigori)**.

Показания.

Подостър нефрит. Сърдечни заболявания с декомпенсация и заплашваща асистолия. Бързо настъпваща хематурия, албуминурия и олигурия (доказано експериментално). Остър нефрит с опасност от уремия. Много ефективен при функционални сърдечни заболявания. Митрална инсуфициенция. Асистолия — със или без отоци. Диспнея и затруднена уринарна секреция.

Връзки.

Голяма аналогия между серума от змиорка и отровата на **Vipera**. Сравни още: **Pelias**, **Lachesis**.

Доза.

Разреждания с глицерин или дестилирана вода. Ниски потенции (1X–3X) — при сърдечни заболявания. По-високи — при внезапни бъбречни атаки.

Silicea terra

Силицея терра **Silicea**

Чиста кремъчна киселина.

Несъвършена асимилация → дефектно хранене. Действа по-дълбоко — причинява неврастенични състояния, повишена чувствителност към нервни стимули и засилени рефлексии. Болести на костите — кариес, некроза. Стимулира организма да резорбира фиброзни и цикатриксни тъкани. При туберкулоза трябва да се използва внимателно — може да резорбира белези и да „освободи“ затворени огнища. Дълбоко и бавно действие. Периодични състояния — абсцеси, ангини, главоболия, спазми, епилепсия, чувство за студ преди пристъп. Келоидни образувания. Скрофулозни, рахитични деца — голяма глава, отворени фонтанели, подут корем, бавно прохождение. Лоши ефекти от ваксинации. Гнойни процеси. Свързана с всички фистулозни ходове. „Узрява“ абсцеси — стимулира супурацията. Пациентът **Silicea** е студен, мрази течение, търси топлина, студени ръце и крака, по-лошо зимата. Липса на жизнена топлина. Умствена и физическа протрация. Голяма чувствителност към настиване. Нетолерантност към алкохол. Заболявания с образуване на гной. Епилепсия. Липса на „гръбнак“ — морален и физически.

Ум.

Отстъпчив, малодушен, тревожен. Нервен, възбудим. Свръхчувствителен към впечатления. Умствено изтощение. Упорити, своенравни деца. Разсеяност. Фиксирани идеи — мисли само за игли, страхува се от тях, търси ги и ги брои.

Глава.

Главоболие от гладуване. Вертиго при гледане нагоре; по-добре при топло увиване; по-добре при лежане на лявата страна. Обилна, зловонна пот на главата, стигаща до шията. Болка започва от тила, разпространява се и се установява над очите. Подуване в глабелата.

Очи.

Ъглите на очите — засегнати. Подуване на слъзния канал. Отвращение към светлина, особено дневна — заслепяване, остри болки; очите — чувствителни на допир; по-лошо при затваряне. Замъглено зрение; буквите се сливат. Ечемици. Ирит и иридо-хориоидит с гной в предната камера. Перфорираща или некротична язва на роговицата. Абсцес на роговицата след травма. Катаракта при канцеларски работници. След кератит и язва — изчиства мътнините (30С месеци наред).

Уши.

Зловонен секрет. Кариес на мастоида. Силен „пистолетен“ звук. Чувствителност към шум. Бучене.

Нос.

Сърбеж на върха. Сухи, твърди корички — кървят при отделяне. Носните кости — чувствителни. Кихане сутрин. Запушване и загуба на обоняние. Перфорация на септума.

Лице.

Напукване по ръба на устните. Обрив по брадичката. Фациална невралгия — пулсираща, разкъсваща, зачервено лице; по-лошо студ и влага.

Уста.

Усещане за косъм на езика. Венците — чувствителни към студен въздух. Фурункули по венците. Абсцес в корена на зъб. Пародонтоза. Чувствителност към студена вода.

Гърло.

Периодична ангина. Бодеж като от игла в тонзилата. Настинките „слизат“ в гърлото. Подуване на паротидите. Бодежи при преглъщане. Твърдо, студено подуване на шийни жлези.

Стомах.

Отвращение към месо и топла храна. Храната лесно попада в задните носни ходове. Липса на апетит; силна жажда. Кисели оригвания след хранене. Епигастриумът — болезнен при натиск. Повръщане след пиене.

Корем.

Болка или болезнено студено усещане — по-добре от външна топлина. Твърд, подут корем. Колики; режещи болки с запек; жълти ръце и сини нокти. Силно къркорене. Подути, болезнени ингвинални жлези. Чернодробен абсцес.

Ректум.

Усеща се парализиран. Фистула. Фисури и хемороиди — болезнени, със спазъм на сфинктера. Изпразненията излизат трудно; излизат наполовина и се връщат. Силен напън; ректумът „жили“; затваря се върху изпразнението. Фекалиите стоят дълго в ректума. Запек преди и по време на мензис; раздразнен сфинктер. Диария с трупна миризма.

Урина.

Кървава, неволна, с червен или жълт утайка. Простатен секрет при напъване. Нощна енуреза при деца с глисти.

Мъжки.

Парене и болезненост на гениталиите; обрив по вътрешната част на бедрата. Хронична гонорея — гъст, зловонен секрет. Елефантиаза на скротума. Сексуална възбудимост; нощни емисии. Хидроцеле.

Женски.

Млечна, остра левкорей по време на уриниране. Силен сърбеж на вулвата и влагалището. Кървене между мензисите. Увеличен мензис, с пристъпи на ледена студенина по тялото. Зърната — много болезнени; лесно се улцерират; втегнати. Фистулозни язви на гърдата. Абсцес на лабиите. Кървене от влагалището при всяко кърмене. Вагинални кисти; твърди възли в гърдата.

Дихателни органи.

Настинките не преминават; храчките — мукопурулентни и обилни. Бавно възстановяване след пневмония. Кашлица и възпалено гърло с малки гранулирани храчки, миришещи ужасно. Кашлица с дневна експекторация — кървава или гнойна. Бодежи в гърдите, през към гърба. Силна кашлица при лягане, с жълти, буци храчки — супуративен стадий.

Гръб.

Слаб гръбнак; много чувствителен към течение. Болка в опашната кост. Спинална иритация след травми; заболявания на гръбначните кости. Болест на Пот.

Сън.

Нощно ходене; става в съня си. Безсъние с прилив на кръв и топлина в главата. Чести подскоци. Тревожни сънища. Прекомерно прозяване.

Крайници.

Ишиас — болки през хълбоците, краката и стъпалата. Крампи в прасците и ходилата. Загуба на сила в краката. Треперещи ръце при работа. Паралитична слабост на предмишницата. Болести на ноктите — бели петна, вращали нокти. Ледено студени, потни крака. Частите, на които лежи — изтръпват. Зловонна пот на крака, ръце, подмишници. Усещане в върховете на пръстите — сякаш нагнояват. Панарициум. Болка в коляното — сякаш стегнато. Напрегнати прасци. Болка под пръстите. Стомпване на стъпалата — болезнено. Супурации.

Кожа.

Фелони, абсцеси, циреи, стари фистулозни язви. Кожа — деликатна, бледа, восъчна. Напукване на върховете на пръстите. Безболезнено подуване на жлези. Розови петна. Белезите внезапно стават болезнени. Зловонен гной. Изкарва чужди тела от тъканите. Всяка малка рана нагноява. Дълги супурации и фистулозни ходове. Сухи върхове на пръстите. Обриви — сърбят само денем и вечер. Деформирани нокти. Индуративни тумори. Абсцеси на стави. След нечиста ваксинация. Бурси. Лепра, възли, медни петна. Келоиди.

Треска.

Студенина; силна чувствителност към студен въздух. Пълзящо треперене. Студени крайници дори в топла стая. Нощно изпотяване — по-лошо към сутринта. Засегнатите части — студени.

Модалности.

По-лошо: новолуние, сутрин, миене, по време на мензис, разкриване, лежане, лява страна, студ, влага. По-добре: топлина, увиване на главата, лято, влажно време.

Връзки.

Допълващо: **Thuja, Sanic, Puls, Fluor-ac**. Несъвместими: **Mercurius ↔ Silicea**. Сравни: **Hep, Kali-phos, Pic-ac, Calc, Phos, Tabasheer, Natrum-silicum, Ferrum-cyanatum, Silica-marina, Vitrum, Arundo-donax**.

Доза.

6С до 30С. 200С и нагоре — силно действащи. При злокачествени състояния — понякога нужни ниски потенции.

Silphium lacinatedum

Силфиум лацина́тум **Silphium**

Rosin-weed.

Използва се при различни форми на астма и хроничен бронхит. Катарални състояния на пикочния мехур. Катарален грип. Дизентерия — пристъпът е предшестван от запек с изпражнения, покрити с бяла слуз.

Дихателни органи.

Кашлица с обилна, нишковидна, пенеста, светла експекторация. Провокира се от усещане за „ръмжене“ на слуз в гърдите; по-лошо от течение. Стягане на белите дробове. Катарални състояния с обилни, нишковидни, слузни секрети. Желание да прочиства и „стърже“ гърлото. Дразнене в задните носни ходове, обхващащо носната лигавица, със стягане в супраорбиталната област.

Връзки.

Сравни: **Aral**, **Copaiv**, **Tereb**, **Cubeb**, **Samb**, **Silphion-cyrenaicum** — фтиза, непрекъсната кашлица, нощни изпотявания, изтощение. **Polygonum-aviculare** — полезно при фтиза в тинктура. **Salvia** — гъделичкаща кашлица. **Arum-dracontium** — влажна кашлица нощем при лягане. **Justicia-adhatoda** — бронхиален катар, дрезгавост, свръхчувствителност.

Доза.

3С. Някои предпочитат по-ниски тритурации.

Sinapis nigra

Синапис нигра **Sinapis-nigra**

Black Mustard.

Полезно при сенна хрема, кориза и фарингит. Сухи носни ходове и фаринкс, с гъст, бучковиден секрет. Вариола.

Глава.

Скалпът — горещ и сърби. Пот по горната устна и челото. Езикът — усеща се като обварен/с мехури.

Нос.

Слуз от задните носни ходове — усеща се студена. Оскъден, acrid секрет. Запушване на лявата ноздра през целия ден или следобед и вечер. Сухота, топлина, сълзене, кихане; дразнеща кашлица; по-добре при лягане. Редуващо се запушване на ноздрите. Сухота на предните носни ходове.

Дихателни органи.

Кашлицата — по-добре при лягане.

Гърло.

Усеща се като опарено, горещо, възпалено. Астматично дишане. Силни пристъпи на кашлица с „лаещ“ експириум.

Стомах.

Зловонен дъх — мирише на лук. Парене в стомаха, издигащо се по хранопровода, гърлото и устата, която е пълна с афти. Горещи, кисели оригвания. Колики — болките идват при навеждане напред; по-добре при изправяне. Пот — подобрява при появата на гадене.

Урина.

Болка в мехура; често и обилно уриниране ден и нощ.

Гръб.

Ревматична болка в интеркосталните и лумбалните мускули. Безсъние от болки в гърба и хълбоците.

Връзки.

Сравни: **Sulph, Capsic, Colocy, Sinapis-alba** — силно изразени гърлени симптоми, парене, натиск, усещане за бучка зад манубриума; подобни усещания и в ректума. Горчично масло при инхалация — действа на сетивните окончания на тригеминуса; облекчава болки в средното ухо, носа, носните кухини и тонзилите.

Доза.

ЗС.

Skatolum

Скатолум **Skatol**

Представлява крайния продукт на протеиновия разпад и е съставна част на човешките фекалии.

Акне при автоинтоксикация, зависеща от чревен разпад. Стомашни и коремни симптоми, фронтално главоболие. Вялост, липса на амбиция. Желание да ругае и псува.

Ум.

Липса на концентрация; невъзможност за учене. Унило настроение; желание за компания. Раздразнителност. Чувства се „лош“ към всички.

Глава.

Фронтално главоболие — по-лошо над лявото око, вечер; по-добре след кратък сън.

Стомах.

Езикът — обложен; лош вкус. Зърнените храни имат солен вкус. Оригвания. Повишен апетит. Леки, жълти, тесни, много зловонни изпражнения. Чревна диспепсия.

Урина.

Често, оскъдно, парещо, затруднено уриниране.

Сън.

Повишено желание за сън; събужда се без освежаване, с чувство на „полу-упойка“.

Връзки.

Сравни: **Indol, Baptis, Sulph.**

Доза.

6С.

Skookum Chuck Aqua

Скукум Чък Аква **Skookum-Chuck**

Соли от водата на Medical Lake, близо до Спокейн, Вашингтон.

Силен афинитет към кожата и лигавиците — **анти-псорично средство**. Otitis media. Обилен, ихорозен, трупно миришещ секрет. Литемия. Катари. Уртикария. Кожни заболявания. Екзема. Суха кожа. Сenna хрема. Обилна кориза и постоянно кихане.

Връзки.

Saxonite — изразени почистващи, дезодориращи и успокояващи свойства за кожата; полезно при екзема, изгаряния, рани, хемороиди.

Доза.

3X тритурация.

Solanum nigrum

Соланум нигрум **Solanum-nigrum**

Black Nightshade.

Използва се успешно при ерготизъм с тетанични спазми и ригидност на цялото тяло, с мания. Изразено действие върху главата и очите. Менингит. Хронична чревна токсемия. Мозъчно дразнене по време на никнене на зъби. Неспокойствие — бурно, конвулсивно. Формикации с контрактури на крайниците.

Глава.

Бясно делириум. Вертиго; ужасно главоболие и пълно прекъсване на умствените функции. Нощни ужаси. Конгестивно главоболие.

Нос.

Остра кориза; обилен воднист секрет от дясната ноздра; лявата — запушена, със студено усещане, редуващо се с топлина.

Очи.

Болка над двете очи. Редуващо се разширяване и свиване на зениците. Слабо зрение. Плаващи петна.

Дихателни органи.

Стягане в гърдите, затруднено дишане. Кашлица от гъделичкане в гърлото.

Експекторация — гъста, жълта. Болка в лявата гръдна половина, болезнена при допир.

Треска.

Редуване на студ и топлина. Скарлатина — обрив на петна, големи и ярки.

Връзки.

Сравни: **Bellad**, **Solanum-carolinense** — конвулсии и епилепсия; ценен при grand mal след детска възраст; истеро-епилепсия; коклюш. **Solan-mammosum** — болка в лявата

тазобедрена става. **Solan-oleraceum** — подуване на млечната жлеза с обилна

секреция. **Solan-tuberosum** — крампи в прасците, контрактура на пръстите; плюене през затворени зъби. **Solan-vesicarium** — препоръчван при фациална парализа.

Solaninum-aceticum — заплашваща парализа на белите дробове при бронхит у

възрастни и деца; трябва да кашля дълго, за да изкара храчки. **Solan-pseudocaps** — остри болки в долната част на корема. **Solan-tuberos-aegrotans** — пролапс на ректума, разширен анус; зловонен дъх и телесна миризма; тумори на ректума като „гниещ картоф“; сънища за локви кръв. **Solanum-tuberosum (berries)** — крампи в прасците и пръстите.

Доза.

2С до 30С.

Solidago virgaurea

Солидаго виргауреа **Solidago**

Golden-rod.

Вдишването на полена е предизвиквало белодробни хеморагии при фтиза. Повтарящи се настинки при туберкулоза (2X): слабост, студенина, редуваща се с топлина; назофарингеален катар, парене в гърлото, болки в крайниците и гръдна опресия. Болка в областта на бъбреците, с дизурия. Бъбреците — чувствителни на натиск. Болест на Брайт. Сенна хрема, когато **Solidago** е провокиращият фактор — тук се дава 30С или по-високо.

Очи.

Инжектирани, воднисти, парещи, жилещи.

Нос.

Раздразнени носни ходове с обилна слуз. Пристъпи на кихане.

Стомах.

Горчив вкус, особено нощем. Обложен език. Много оскъдна, кафява и кисела урина.

Дихателни органи.

Бронхит; кашлица с много гнойна, кърваво прошарена експекторация. Затруднено дишане. Постоянна диспнея. Астма — с нощна дизурия.

Женски.

Уголемяване на матката — органът притиска мехура. Фиброми.

Урина.

Оскъдна, червеникаво-кафява, с плътен утайник; дизурия; песъчинки. Трудно и оскъдно уриниране. Албумин, кръв и слуз в урината. Болката в бъбреците се разпространява напред към корема и мехура. Урината — бистра, но зловонна. Понякога прави катетъра излишен.

Гръб.

Болки в гърба от конгестирани бъбреци.

Кожа.

Петна, особено по долните крайници; сърбеж. Екзантем по долните крайници, с уринарни смущения, отоци и заплашваща гангрена.

Връзки.

Антидот на отравяне от Golden-rod: **Iodoform 2X**. Сравни: **Arsenic, Agrimonia** (болки в областта на бъбреците).

Доза.

Тинктура до 3С. Масло от Solidago: 1 унция към 8 унции спирт; 15 капки за подпомагане на експекторацията при бронхит и бронхиална астма у възрастни.

Spigelia anthelmia

Спигелия антхелмия **Spigelia**

Pinkroot.

Важно средство при перикардит и други сърдечни заболявания. Провингите са проведени с изключителна точност и субективните симптоми са многократно потвърдени. Изразен афинитет към очите, сърцето и нервната система. Невралгия на n. trigeminus — силно подчертана. Подходящо за анемични, изтощени, ревматични и скрофулозни пациенти. Пробождащи болки. Сърдечни заболявания и невралгии. Голяма чувствителност към допир. Части, които се усещат студени, предизвикват тръпки. Симптоми от глисти. Детето сочи пъпа като най-болезнено място.

Ум.

Страх от остри, заострени предмети — игли, карфици и др.

Глава.

Болка под фронталната издатина и слепоочията, разпространяваща се към очите. Полулатерална болка, засягаща лявото око; силна, пулсираща; по-лошо при „фалшива стъпка“. Усещане за лента около главата. Вертиго; слухът — свръхчувствителен.

Очи.

Усещат се твърде големи; притискаща болка при движение. Разширени зеници; фотофобия; ревматичен офталмит. Силни болки в и около очите, проникващи дълбоко в орбитата. Цилиарна невралгия — истински неврит.

Нос.

Предната част — винаги суха. Секретът се стича назад — хроничен катар с постназално стичане на бленда слуз.

Уста.

Език — напухан, болезнен. Разкъсващ зъбобол — по-лошо след хранене и от студ. Лош дъх. Неприятен вкус.

Лице.

Просопалгия — засяга очите, зигомата, бузите, зъбите, слепоочието; по-лошо при навеждане, допир; от сутрин до залез.

Сърце.

Силна палпитация. Преакордиална болка; силно влошаване от движение. Чести пристъпи на палпитация, особено с лош дъх. Пулс — слаб, нерегулярен. Перикардит — пробощащи болки, палпитация, диспнея. Невралгия, разпространяваща се към ръката или двете ръце. Ангина пекторис. Желание за гореща вода — облекчава. Ревматичен кардит — треперлив пулс; цялата лява страна — болезнена. Диспнея — трябва да лежи на дясната страна с висока глава.

Ректум.

Сърбеж и пълзящо усещане. Чести, неуспешни позиви. Аскариди.

Треска.

Студенина при най-малко движение.

Модалности.

По-лошо: допир, движение, шум, завъртане, миене, сътресение. По-добре: лежане на дясната страна с висока глава; дълбоко вдишване.

Връзки.

Сравни: **Spigelia-marylandica** — маниакална възбуда, пристъпи на смях и плач, разкъсана реч, вертиго, разширени зеници, конгестии. **Acon, Cact, Cimicif, Arnica** (Spigelia е хроничното Arnica). **Cinnab** — супраорбитална болка. **Naja, Spong** — сърце. **Sabad, Teucr, Cina** — симптоми от глисти.

Антидот: **Pulsat**.

Доза.

6C–30C — при невралгични симптоми. 2C–3C — при възпалителни симптоми.

Spiranthes autumnalis

Спирантес аутумналис **Spiranthes**

Lady's Tresses.

Използва се при стимулиране на лактацията при кърмачки, лумбаго и ревматизъм, колики със сънливост и спастично прозяване. Антифлогистично средство, сродно на **Acon**, със симптоми на конгестия и възпаление. Киселинност и парене в хранопровода с оригване.

Женски.

Пруритус; вулвата — зачервена. Сухота и парене във влагалището. Пареща болка във влагалището по време на коитус. Левкорей — кървава.

Крайници.

Ишиас — особено вдясно. Болка в раменете. Подуване на вените на ръцете. Болка във всички стави на ръцете. Студени крака и пръсти.

Треска.

Горещи вълни. Пот по дланите. Ръцете — ту горещи, ту студени.

Доза.

ЗС.

Spongia tosta

Спонгия тоста **Spongia**

Roasted Sponge.

Особено изразено действие върху дихателните органи — кашлица, круп и др. Сърдечни заболявания. Често показано при туберкулозна диатеза. Деца със светъл тен, отпуснати тъкани; подути жлези. Изтощение и тежест в тялото след малко усилие, с прилив на кръв към гърдите и лицето. Тревожност и затруднено дишане.

Ум.

Тревожност и страх. Всяко вълнение усилва кашлицата.

Глава.

Прилив на кръв; разпукващо главоболие; по-лошо във фронталната област.

Очи.

Сълзене; лепкав или мукозен секрет.

Нос.

Течаща кориза, редуваща се със запушване. Сухота; хроничен сух назален катар.

Уста.

Език — сух и кафяв; покрит с везикули.

Гърло.

Щитовидната жлеза — подута. Бодежи и сухота. Парене и жилене. Болно гърло — по-лошо след сладки храни. Гъделичкане → кашлица. Постоянно прочистване на гърлото.

Стомах.

Силна жажда, голям глад. Не понася стегнати дрехи около торса. Хълцане.

Мъжки.

Подуване на семенната връв и тестисите, с болка и чувствителност. Орхит. Епидидимит. Топлина в частите.

Женски.

Преди мензис — болка в сакрума, глад, палпитация. По време на мензис — събужда се със задушаващи пристъпи. Аменорея с астма.

Дихателни органи.

Голяма сухота на всички въздушни пътища. Дрезгавост; ларинксът — сух, гори, стегнат. Кашлица — суха, лаеща, крупозна; ларинксът — чувствителен на допир. Круп — по-лошо при вдишване и преди полунощ. Дишане — кратко, задъхано, трудно; усещане за „тапа“ в ларинкса. Кашлицата намалява след хранене или пиене, особено топли напитки. Суха, хронична симпатична кашлица при органични сърдечни заболявания — облекчава се от **Spongia**. Неудържима кашлица от дълбока болезнена точка в гърдите. Гърдите — слаби; трудно говори. Ларингеална фтиза. Гуша със задушаващи пристъпи. Бронхиален катар — хрипове, астматична кашлица, по-лошо студен въздух; обилна експекторация и задушаване; по-лошо при лежане с ниска глава и в топла стая. Опресия и топлина в гърдите, с внезапна слабост.

Сърце.

Бърза и силна палпитация, с диспнея; не може да лежи; понякога по-добре в хоризонтално положение. Събужда се внезапно след полунощ с болка и задушаване; зачервен, горещ, ужасно изплашен. Клапна инсуфициенция. Ангина пекторис — слабост, тревожна пот. Прилив на кръв; разширени вени. Сърцето „се издига“ към гърдите, сякаш ще изскочи нагоре. Хипертрофия на сърцето — особено на дясната страна — с астматични симптоми.

Кожа.

Подуване и индурация на жлези; включително екзофталмични. Шийни жлези — подути, с напрегната болка при завъртане на главата; болезнени при натиск. Гуша. Сърбеж; морбили.

Сън.

Събужда се уплашен, с чувство на задушаване. Общо по-лошо след сън или „спи в обостряне“.

Треска.

Пристъпи на топлина с тревожност; топло, зачервено лице и пот.

Модалности.

По-лошо: изкачване, вятър, преди полунощ. По-добре: слизане, лежане с ниска глава.

Връзки.

Сравни: **Acon, Hep, Brom, Lach, Merc-prot, Iod** (гуша).

Доза.

2X тритурация или тинктура до 3C.

Squilla maritima

Скуила маритима **Squilla**

Sea-onion.

Бавно действащо средство. Подходящо за състояния, които достигат максимум след няколко дни. Упорити, тъпи, ревматични болки, проникващи цялото тяло. Средство за слезката — боджи под левите свободни ребра. Важно средство за сърце и бъбреци. Бронхопневмония.

Действа особено върху лигавиците на дихателния и храносмилателния тракт, както и върху бъбреците. Ценно при хроничен бронхит у възрастни — с мукусни хрипове, диспнея и оскъдна урина.

Очи.

Раздразнени; детето ги търка с юмруци. Усещане сякаш плуват в студена вода.

Стомах.

Усещане за натиск като от камък.

Дихателни органи.

Течаща кориза; ръбовете на ноздрите — болезнени. Кихане; раздразнено гърло; кратка, суха кашлица; трябва да поеме дълбоко въздух. Диспнея и боджежи в гърдите; болезнено свиване на коремните мускули. Силна, яростна, изтощителна кашлица с много слюз; обилна, солена, лепкава експекторация; неволно изпускане на урина и кихане. Детето търка лицето си с юмрук по време на кашлица. Кашлица, провокирана от дълбоко вдишване, студени напитки, усилие, преминаване от топло към студено. Кашлица при морбили. Чести позиви за уриниране нощем — отделя големи количества. Кихане при кашляне.

Сърце.

Сърдечен стимулант — действа върху периферните съдове и коронарните артерии.

Урина.

Силен позив; много водниста урина. Неволно изпускане на урина при кашляне.

Кожа.

Малки червени петна по тялото, с бодяща болка.

Крайници.

Ледено студени ръце и крака, докато останалата част от тялото е топла. Краката се разраняват от стоене. Болезнени стъпала при продавачки/жени, които стоят дълго.

Модалности.

По-добре: покой. По-лошо: движение.

Връзки.

Сравни: **Digit, Strophant, Apocyn-can, Bry, Kali-carb. Squilla** следва **Digitalis**, ако последният не облекчава воднистите състояния.

Доза.

1C до 3C.

Stannum metallicum

Станум металикум **Stannum**

Tin.

Основното действие е върху нервната система и дихателните органи. Много силна слабост — особено при хронични бронхиални и белодробни състояния, с обилни мукопурулентни секрети на туберкуозна основа. Говоренето причинява силна слабост в гърлото и гърдите. Болки, които **постепенно се усилват и постепенно намаляват**, са характерни за **Stannum**. Паралитична слабост; спазми; парализа.

Ум.

Тъжен, тревожен. Обезкуражен. Страх да вижда хора.

Глава.

Болка в слепоочията и челото. Упорита остра кориза и грип с кашлица. Болката — по-лошо от движение; постепенно се усилва и отслабва; усещане за стягане с лента; челото — сякаш притиснато навътре. Трусове при ходене отекват болезнено в главата. Дърпащи болки в скулите и орбитите. Улцерация на дупката за обеса в ушната висулка.

Гърло.

Много лепкава слуз — трудно се отделя; усилията за отделяне причиняват гадене. Гърлото — сухо, жили.

Стомах.

Глад. Миризмата на готвене причинява повръщане. Горчив вкус. Болката — по-добре от натиск, но чувствителна на допир. Усещане за празнота в стомаха.

Корем.

Крампозна колика около пъпа, с чувство за празнота. Коликата — по-добре от силен натиск.

Женски.

Усещане за „слизване надолу“. Пролапс, със слабост и потъващо усещане в стомаха. Мензис — ранен и обилен. Болка във влагалището — нагоре и назад към гръбнака. Левкорей със силна слабост.

Дихателни органи.

Дрезгавост; слюзта се изхвърля с усилие. Силна, суха кашлица вечер до полунощ. Кашлица, провокирана от смях, пеене, говорене; по-лошо при лежане на дясната страна. През деня — обилна зелена, сладникава експекторация. Гърдите — болезнени. Гърдите — слаби; едва може да говори. Грипозна кашлица — от обяд до полунощ, с оскъдна експекторация. Дишане — кратко, потиснато; бодежи в лявата страна при дишане и лежане на тази страна. *Phthisis mucosa*. Хектична треска.

Сън.

Спи с единия крак свит, другия изпънат.

Крайници.

Паралитична слабост; изпуска предмети. Подути глезени. Крайниците внезапно отказват при сядане. Замайване и слабост при слизване. Спастични потрепвания на мускулите на предмишницата и ръката. Пръстите подскочат при държане на писалка. Неврит. Парализа при машинописци.

Треска.

Топлина вечер; изтощителни нощни изпотявания, особено към сутринта. Хектична треска. Пот — главно на челото и тила; изтощаваща; мирише на мухъл или неприятно.

Модалности.

По-лошо: използване на гласа (смях, говорене, пеене), лежане на дясната страна, топли напитки. По-добре: кашляне или експекторация, силен натиск.

Връзки.

Допълващо: **Puls**.

Сравни: **Stann-iod 3X** — хронични гръдни заболявания с пластични тъканни промени; постоянен позив за кашляне от сухо гъделичкане в корена на езика; трахеално и бронхиално дразнене при пушачи; куха кашлица, завършваща с експекторация; напреднала фтиза. **Caust, Calc, Sil, Tuberc, Bacil, Helon. Myrtus-chekan** — хроничен бронхит, кашлица при фтиза, емфизем, с гастрокатарални усложнения и гъста, жълта, трудна експекторация; възрастни с отслабена сила за отхрачване.

Доза.

3С до 30С.

Staphysagria

Стафизагрия **Staphysagria**

Stavesacre.

Нервни разстройства с подчертана раздразнителност; заболявания на генито-уринарния тракт и кожата — най-често дават показания за това средство. Действа върху зъбите и алвеоларния периост. Лоши ефекти от гняв и обиди. Сексуални грехове и излишества. Много чувствителен пациент. Разкъсани тъкани. Болка и нервност след изваждане на зъб. Разкъсани или разтегнати сфинктери.

Ум.

Пристъпи на ярост; импулсивност; хипохондрия; тъга. Много чувствителна към това какво казват другите. Задълбочава се в сексуални мисли; предпочита самота. Капризност. Детето плаче за много неща и ги отказва, когато му ги дадат.

Глава.

Отпаднало, замайващо главоболие; преминава с прозяване. Мозъкът — усеща се притиснат. Усещане за оловна топка в челото. Сърбящ обрив над и зад ушите.

Очи.

Топлина в очните ябълки — замъглява очилата. Повтарящи се ечемици. Халазион. Хлътнали очи със сини кръгове. Сърбеж по ръба на клепачите. Засегнати ъгли на очите, особено вътрешните. Разкъсани или срязани рани на роговицата. Разпукваща болка в очните ябълки при сифилитичен ирит.

Гърло.

Бодежи, стрелящи към ухото при преглъщане — особено вляво.

Уста.

Зъбобол по време на мензис. Зъбите — черни, ронливи. Слюноотделяне; гъбести венци, лесно кървят. Подути подчелюстни жлези. След хранене — сънливост. Пародонтоза.

Стомах.

Отпуснат, слаб стомах. Желание за стимуланти. Стомахът — усеща се отпуснат. Желание за тютюн. Вълчи глад, дори когато стомахът е пълен. Гадене след коремни операции.

Корем.

Колики след гняв. Горещи газове. Подуване на корема при деца, с много газове. Колики с тазов тенезъм. Силна болка след коремна операция. Инкарцерирани газове. Диария след студена вода, с тенезъм. Запек; хемороиди; увеличена простата.

Мъжки.

Особено след самозадоволяване; постоянно мислене за сексуални теми. Сперматорея — хлътнали черти, виновен вид; емисии с болки в гърба и слабост; сексуална неврастения. Диспнея след коитус.

Женски.

Частите — много чувствителни; по-лошо при сядане. Раздразнен мехур при млади омъжени жени. Левкорей. Пропулс с потъващо усещане в корема; болки около хълбоците.

Урина.

Цистоцеле (външно и вътрешно). Цистит при родилки. Неуспешни позиви за уриниране при новобрачни. Натиск върху мехура; усеща, че не се изпразва. Усещане, че капка урина се търкаля постоянно по канала. Парене в уретрата при уриниране. Простатни проблеми; често уриниране; парене в уретрата дори когато не уринира. Позиви и болка след уриниране. Болка след литотомия.

Кожа.

Екзема на глава, уши, лице, тяло; дебели, сухи, силно сърбящи крусти; чесането променя мястото на сърбежа. Фигови брадавици — педункулирани. Артритни възли. Възпаление на фалангите. Нощни изпотявания.

Крайници.

Мускулите — особено на прасците — усещат се натъртени. Болки в гърба — по-лошо сутрин преди ставане. Крайниците — сякаш бити и болезнени. Сковани стави. Крурална невралгия. Тъпа болка в седалището, разпространяваща се към тазобедрената става и кръста.

Модалности.

По-лошо: гняв, възмущение, тъга, унижение, загуба на течности, онанизъм, сексуални излишества, тютюн; най-лек допир. По-добре: след закуска, топлина, нощен покой.

Връзки.

Несъвместимо: **Ranunc-bulb**. Допълващо: **Caust, Colocy**. Сравни: **Ferr-pyrophos, Colocy, Caust, Ign, Phos-ac, Calad**. Антидот: **Camph**.

Доза.

3С до 30С.

Stellaria media

Стелария медия **Stellaria**

Chickweed.

Предизвиква състояние на стазис, конгестия и забавяне на всички функции. Сутрешно влошаване.

Остри, стрелкащи, променливи ревматични болки — силно изразени. Ревматизъм; стрелкащи болки почти навсякъде; скованост на ставите; частите — болезнени при допир; по-лошо от движение. Хроничен ревматизъм. Променливи болки. Псориазис. Уголемени и възпалени подагрозни стави на пръстите.

Глава.

Обща раздразнителност. Отпадналост, нежелание за работа. Парене и смъдене в очите; усещат се изпъкнали. Тъпо фронтално главоболие — по-лошо сутрин и вляво, със сънливост. Мускулите на шията — сковани и болезнени. Очите — усещат се изпъкнали.

Корем.

Черният дроб — конгестиран, подут, с бодежи; чувствителен на натиск. Глинени изпражнения. Чернодробна торпидност. Запек или редуване на запек и диария.

Крайници.

Ревматоидни болки в различни части на тялото. Остра болка в кръста, над бъбреците, в глутеалната област, разпространяваща се по бедрото. Болка в раменете и ръцете. Синовит. Усещане за натъртване. Ревматични болки в прасците.

Модалности.

По-лошо: сутрин, топлина, тютюн. По-добре: вечер, студен въздух, движение.

Връзки.

Сравни: **Pulsat** — подобен ревматизъм, променливи болки, по-лошо в покой и топлина; по-добре на студен въздух.

Доза.

Тинктура — външно. Вътрешно — 2X.

Sticta pulmonaria

Стикта пулмонария **Sticta**

Lungwort.

Дава картина на кориза, бронхиален катар и грип, заедно с нервни и ревматични нарушения. Общо чувство на отпадналост и неразположение, както при започваща настинка. Тъпо, тежко налягане във фронталната област. Катарален конюнктивит. Ревматична скованост на шията.

Ум.

Усещане, сякаш се носи във въздуха. Объркване на мислите; пациентът трябва да говори.

Глава.

Тъпо главоболие, с тежко налягане във фронталната област и корена на носа. Катарално главоболие преди появата на секреция. Парене в очите и болезненост на очните ябълки. Усещане, сякаш скалпът е твърде малък. Парене в клепачите.

Нос.

Усещане за пълнота в корена на носа. Атрофичен ринит. Сухота на носната лигавица. Постоянна нужда да се духа носът, но без секрет. Сухи корички — особено вечер и нощем. Сенна хрема; непрекъснато кихане.

Женски.

Оскъдно отделяне на мляко.

Корем.

Диария — обилни, пенести изпражнения; по-лошо сутрин. Увеличено количество урина, със soreness и болка в мехура.

Дихателни органи.

Гърлото — сурово; стичане на слуз назад. Суха, дразнеща кашлица през нощта; по-лошо при вдишване. Трахеит — улеснява експекторацията. Влажна кашлица

сутрин. Болка през гърдите — от стернума към гръбначния стълб. Кашлица след морбили; по-лошо вечер и при умора. Пулсации от дясната страна на стернума надолу към корема.

Крайници.

Ревматична болка в дясната раменна става, делтоида и бицепса. Подуване, топлина, зачервяване на ставите. Място на възпаление и зачервяване над засегнатата става. Болката — силна, дърпаща. Хорееподобни спазми; краката — усещат се сякаш „висят във въздуха“. Housemaid's knee. Стрелкащи болки в коленете. Ставите и околните мускули — червени, подути, болезнени. Ревматичните болки предшестват катаралните симптоми.

Модалности.

По-лошо: внезапни промени в температурата.

Връзки.

Сравни: **Datura-arborea** — невъзможност за концентрация; усещане, че мозъкът „плува“; парене в стомаха и хранопровода; пълнота в чернодробната област. **Cetraria** — хронична диария, фтиза, кървава експекторация; използва се като отварка с мляко при бронхорея и катар. Също: **Eryng**, **Dros**, **Stilling**, **Rumex**, **Sambuc**.

Доза.

Тинктура до 6С.

Stigmata maydis

Стигмата майдис **Zea**

Corn-silk.

Изразени уринарни симптоми. Използвано успешно при органични сърдечни заболявания с изразен оток на долните крайници и оскъдно уриниране. Уголемена простата и задръжка на урина. Уратна и фосфатна гонорея. Цистит.

Урина.

Задръжка и потискане на уринирането. Дизурия. Бъбречна литиаза; нефритична колика; кръв и червен пясък в урината. Тенезъм след уриниране. Везикален катар. Гонорея. Цистит.

Допълнително.

Обвивките (shucks) — като отварка, използвани при хронична малария; чаена лъжичка свободно (д-р Е. С. Лоу, Англия).

Доза.

Тинктура — 10 до 50 капки.

Stillingia silvatica

Стилингия силватика **Stillingia**

Queen's Root.

Хроничен периостален ревматизъм; сифилитични и скрофулозни състояния. Добре изразени респираторни симптоми. Торпидност на лимфната система; торпиден черен дроб — жълтеница и запек.

Ум.

Мрачни предчувствия. Потиснатост.

Дихателни органи.

Суха, спастична кашлица. Ларинксът — стегнат; жилене във фаусите. Трахеята — болезнена при натиск. Дрезгавост и хронични ларингеални проблеми при оратори.

Урина.

Урината — безцветна. Бяла утайка; урината — млечна и гъста.

Крайници.

Болки в костите на крайниците и гърба.

Кожа.

Язви; хронични обриви по ръцете и пръстите. Уголемени шийни жлези. Парене и сърбеж по краката — по-лошо на въздух. Екзостози. Скрофулодерма. Сифилис — вторични обриви и късни симптоми. Ценно като интеркурентно средство.

Модалности.

По-лошо: следобед, влажно време, движение. По-добре: сутрин, сух въздух.

Връзки.

Сравни: **Staphis, Mercur, Syphil, Aur, Corydalis** (сифилитични възли).

Доза.

Тинктура и 1С.

Stramonium

Страмониум **Stramonium**

Thorn-apple.

Цялото действие на лекарството е насочено към мозъка, макар кожата и гърлото също да показват нарушения. Потиснати секрети и екскреции. Усещане, сякаш крайниците са отделени от тялото. Delirium tremens. Липса на болка и мускулна подвижност — особено на мимическите и двигателните мускули. Въртеливи и грациозни движения. Паркинсонизъм.

Ум.

Благочестиво, настойчиво, непрекъснато говорене. Приказлив, бърбров; смее се, пее, ругае, моли се, римува. Вижда духове, чува гласове, говори със „спирити“. Бързи промени — от радост към тъга. Виоленто поведение; непристойност. Делузии за идентичността — мисли, че е висок, двоен, че липсва част от тялото. Религиозна мания. Не понася самота или тъмнина — трябва му светлина и компания. Видът на вода или блестящи предмети предизвиква спазми. Делириум с желание да избяга.

Глава.

Често повдига глава от възглавницата. Болка във фронталната област и над веждите — започва в 9 сутринта, по-лошо до обяд. Пробивна болка, предшествана от замъглено зрение. Прилив на кръв към главата; залитане, склонност да пада напред и наляво. Слухови халюцинации.

Очи.

Изпъкнали, широко отворени; зениците — разширени. Загуба на зрение; оплаква се, че е тъмно, и иска светлина. Малките предмети изглеждат големи. Части от тялото — сякаш огромно подути. Страбизъм. Всички предмети изглеждат черни.

Лице.

Горещо, червено; ограничено зачервяване на бузите. Прилив на кръв; изкривено. Израз на ужас. Бледо лице.

Уста.

Суха; вискозна слюнка се стича. Отвращение към вода. Заекване. *Risus sardonicus*. Не може да преглъща поради спазъм. Дъвчащи движения.

Стомах.

Храната — вкус на слама. Силна жажда. Повръщане на слюз и зелена жлъчка.

Урина.

Потисната; мехурът — празен.

Мъжки.

Сексуална възбуда, с непристойни думи и действия. Ръцете — постоянно върху гениталиите.

Женски.

Метрорагия с бърбривост, пеене, молитви. Пуерпериална мания с характерните психични симптоми и обилно изпотяване. Конвулсии след раждане.

Сън.

Събужда се ужасен; крещи от страх. Дълбок, хъркащ сън. Сънлив, но не може да заспи.

Крайници.

Грациозни, ритмични движения. Конвулсии на горните крайници и отделни мускулни групи. Хорееподобни спазми; частични, постоянно променящи се. Силна болка в лявата тазобедрена става. Треперене, потрепвания на сухожилията, залитаща походка.

Кожа.

Лъскав, червен обрив. Ефекти от потиснат обрив при скарлатина — с делириум и др.

Треска.

Обилна пот, която не облекчава. Силна треска.

Модалности.

По-лошо: тъмнина, самота, гледане на ярки/лъскави предмети, след сън, при преглъщане. По-добре: ярка светлина, компания, топлина.

Връзки.

Сравни: **Hyoscy, Bellad**. Има по-малко треска от **Bellad**, но повече от **Hyos**. По-силно функционално възбуждане на мозъка, но не достига истинското възпаление на **Bellad**.

Антидоти: **Bellad, Tabac, Nux**.

Доза.

30C и по-ниски потенции.

Strontium carbonicum

Стронциум карбоникум **Strontia**

Carbonate of Strontia.

Ревматични болки; хронични навяхвания; стеноза на хранопровода. Болките правят пациента отпаднал или „болен навсякъде“. Хронични последици от хеморагии; след операции с обилно просмукване на кръв, студенина и прострация. Артериосклероза. Високо кръвно налягане — зачервено лице, пулсиращи артерии, заплашващ апоплекс. Силни неволеви подскоци. Заболявания на костите — особено бедрената. Нощна неспокойност; чувство на задушаване. За шок след хирургични операции. Неврит; голяма чувствителност към студ.

Глава.

Вертиго с главоболие и гадене. Разпъващо налягане. Болки от тила нагоре; по-добре при топло увиване на главата. Приливи в лицето; силна пулсация. Супраорбитална невралгия — болките се усилват и отслабват бавно. Кървави крусти в носа. Лицето — червено; гори, сърби. Сърбеж, зачервяване и парене на носа.

Очи.

Парене и зачервяване. Болка и сълзене при използване на очите; „танцуващи“ и хроматични промени на предметите.

Стомах.

Загуба на апетит; отвращение към месо; желание за хляб и бира. Храната — безвкусна. Оригвания след хранене. Хълцане → болки в гърдите; кардиалгия.

Корем.

Бодежи в ингвиналния пръстен. Диария — по-лошо нощем; непрекъснат тенезъм; по-добре към сутринта. Парене в ануса — дълго след дефекация. Неприятна пълнота и подуване на корема.

Крайници.

Ишиас с оток на глезена. Ревматична болка в дясното рамо. Ревматизъм с диария. Гризещи болки — сякаш в костния мозък. Крампи в прасците и стъпалата. Хронични спазми — особено в глезенната става. Оточно подуване. Ледено студени крака. Ревматични болки — особено в ставите. Вените на ръцете — препълнени.

Треска.

Топлина, с отвращение към разсъбличане.

Кожа.

Влажен, сърбящ, парещ обрив — по-добре на открит въздух, особено на топло слънце. Навяхвания на глезена с оток. Силно нощно изпотяване.

Модалности.

По-добре: потапяне в гореща вода. По-лошо: промяна на времето; покой; при започване на движение; студ — силна чувствителност.

Връзки.

Сравни: **Arnica, Ruta, Sil, Baryta-c, Carbo. Stront-jodat** — артериосклероза. **Stront-brom** — отличен при състояния, изискващи бромиди; повръщане при бременност; нервна диспепсия; антиферментативно действие. **Stront-nit** — патологични желания; главоболие; екзема зад ушите.

Доза.

6X тритурация и 30C.

Strophanthus hispidus

Строфантус хиспидус **Strophanthus**

Kombe-seed.

Мускулна отрова — увеличава контрактилната сила на всички напречноабраздени мускули. Действа върху сърцето — усилва систолата и забавя честотата. Полезен за

тонизиране на сърцето и намаляване на воднянките. В малки дози — при слабо сърце; усеца се уголемено. При митрална регургитация с оток и воднянка. Не причинява стомашен дискомфорт, няма кумулативен ефект, по-силен диуретик, безопасен за възрастни — не засяга вазомоторите. При пневмония и тежка прострация след хеморагии, операции и остри заболявания. След продължителна употреба на стимуланти; „иритабилно сърце“ при пушачи. Артериосклероза; ригидни артерии при възрастни. Възстановява тонуса на крехки тъкани — особено на сърдечния мускул и клапите. Особено полезен при декомпенсация от мастно сърце. Копривна треска. Анемия с палпитации и задух. Екзофталмична гуша. Корпулентни пациенти.

Глава.

Темпорални болки с диплопия, отслабено зрение. Блестящи очи, зачервено лице. Сенилен вертиго.

Стомах.

Гадене с особено отвращение към алкохол — полезен при дипсомания. Седем капки тинктура.

Урина.

Увеличена секреция; оскъдна и албуминозна.

Женски.

Менорагия; маточни хеморагии; матката — силно конгестирана. Болки през хълбоците и бедрата в климакса.

Дихателни органи.

Диспнея — особено при изкачване. Конгестирани бели дробове. Белодробен оток. Бронхиална и сърдечна астма.

Сърце.

Пулс — ускорен. Сърдечна дейност — слаба, бърза, нерегулярна — от мускулна слабост и инсуфициенция. Сърдечна болка.

Кожа.

Уртикария — особено хронични форми.

Крайници.

Подути, воднянкови. Анасарка.

Връзки.

Сравни: **Digit** — по-бавен от **Strophanthus**. **Phos-ac** — слабо сърце, нерегулярен пулс, „пърхане“ в сърдечната област, палпитации по време на сън, припадъци.

Доза.

Тинктура и 6X. При остри случаи — 5 до 10 капки тинктура 3 пъти дневно.

Strychninum phosphoricum

Стрихниум фосфорикум **Strychnia-phosphorica**

Phosphate of Strychnin.

Действа чрез цереброспиналната система върху мускулите — причинява потрепвания, скованост, слабост и загуба на сила. Действа върху циркулацията — нерегулярен пулс. Действа върху ума — липса на контрол, неудържим смях, нежелание за умствена работа. Много нерегулярен пулс. Тахикардия. Бърз и слаб пулс.

Полезно при хорея, истерия, остра астения след остри фебрилни заболявания.

Симптомите — по-лошо от движение; по-добре в покой и на открит въздух.

Отлично средство при анемия на гръбначния мозък; парализа; парене, болка и слабост в гръбнака; болката се разпространява към предната част на гърдите; чувствителност при натиск в среднодорзалната област. Студени, влажни крака; ръце и аксилари — покрити със студена лепкава пот.

Ателектаза и нарушена компенсация при хипертрофирано сърце; начален стадий на мастна дегенерация на сърдечния мускул.

Доза.

3X тритурация.

Strychninum purum

Стрихниум пурум **Strychninum**

Alkaloid of Nux Vomica.

Основната функция е стимулиране на моторните центрове и рефлексната дейност на гръбначния мозък. Хомеопатично към мускулни спазми, крампи от прекомерна рефлексна възбудимост на гръбначния мозък, спазми на пикочния мехур и др. Силно стимулира централната нервна система; умствената дейност и сетивата — изострени. Дишането — усилено. Всички рефлексни — по-активни. Скованост в мускулите на лицето и шията. Опиистотонус. Тетанични конвулсии с опистотонус. Мускулите се отпускат между пристъпите. По-лошо от най-лек допир, звук, миризма. По-пряко влияе върху гръбначния мозък и е по-малко подходящо при висцерални нарушения от **Нух**. Тетанус. Експлозивна нервност. Болките и усещанията идват внезапно и се повтарят периодично.

Глава.

Неспокоен. Свръхраздражителност. Пълно, разпукващо главоболие, с топлина в очите. Вертиго с шум в ушите. Рязко подхвърляне на главата напред. Скалпът — болезнен. Сърбеж на скалпа и тила.

Очи.

Горещи, болезнени, изпъкнали, втречени. Зениците — разширени. Искри пред очите. Спазматично свиване на очните мускули; потрепване и треперене на клепачите.

Уши.

Слухът — много остър. Парене, сърбеж и шум в ушите.

Лице.

Бледо, тревожно, ливидно. Челюстите — сковани; долната — спазматично затворена.

Гърло.

Сухо, стегнато; усещане за буца. Преглъщането — невъзможно. Парене и спазми в хранопровода. Силен сърбеж в небцето.

Стомах.

Постоянно повдигане. Силно повръщане. Гадене при бременност.

Корем.

Остра болка в коремните мускули; коликообразни болки в червата.

Ректум.

Фекалиите се изпускат неволно по време на спазми. Много упорит запек.

Женски.

Желание за коитус. Всеки допир по тялото предизвиква волуптуозно усещане.

Дихателни органи.

Спазъм на мускулите около ларинкса. Силна диспнея. Остри, стягащи болки в гръдните мускули. Упорита кашлица, повтаряща се след грип.

Гръб.

Ригидност на шийни мускули. Остра болка в тила и надолу по гръбнака. Гърбът — скован; силни тласъци в гръбначния стълб. Ледено усещане надолу по гръбнака.

Крайници.

Крайниците — сковани. Ревматизъм със сковани стави. Силни подскоци, потрепвания и треперене. Тетанични конвулсии и опистотонус; спазми, провокирани от най-лек допир или опит за движение. Шокове в мускулите. Крампообразни болки.

Треска.

Студени тръпки надолу по гръбнака. Пот — като поток по главата и гърдите. Долните крайници — студени.

Кожа.

Сърбеж по цялото тяло, особено носа. Ледено усещане по гръбнака.

Модалности.

По-лошо: сутрин; допир; шум; движение; след хранене. По-добре: лежане по гръб.

Връзки.

Сравни: **Eucalyptus** — неутрализира лошите ефекти на стрихнина. **Strych-ars** — парези при възрастни; прострация; псориазис; хронична диария с паралитични симптоми; сърдечна хипертрофия с начален мастен дегенерат; диспнея при лежане; оток на долни крайници; урина — оскъдна, с висока плътност, богата на глюкоза; диабет. **Strych-et-Ferr-cit** — хлороза и паралитични състояния; диспепсия с повръщане на храна. **Strychnin-nit** — премахва желание за алкохол. **Strychnin-sulph** — стомашна атония. **Strych-valerin** — изтощение на мозъчната сила; жени с висока нервна възбудимост. Сравни още: **Cicuta**, **Arnica** (тетанус).

Доза.

3С до 30С. (Физиологичните дози, описани в текста, са част от оригиналния материал и се включват буквално, без интерпретация.)

Succinum

Сукцидум **Succinum**

Electron. Amber — Fossil Resin.

Нервни и хистерични симптоми. Астма. Заболявания на слезката.

Глава.

Страх от влакове и затворени пространства. Главоболие, сълзотечение, кихане.

Дихателни органи.

Астма. Начална фтиза. Хроничен бронхит. Болки в гърдите. Коклюш.

Връзки.

Да не се бърка с **Ambra** (Ambergris).

Succinic acid — сенна хрема; пристъпно кихане; воднист секрет от носа; астма; възпаление по дихателните пътища; болки в гърдите; сърбеж на клепачите, кантите и носа — по-лошо от течение. Използва се в потенции 6 до 30.

Сравни: **Arundo**, **Wyethia**, **Sabadilla**, **Sinapis**.

Доза.

3X тритурация. Маслото — 5 капки.

Sulfonalum

Сулфоналум **Sulfonal**

A Coal-tar Product.

Вертиго от церебрален произход; заболявания на малкия мозък; атактични симптоми и хорей — поле за хомеопатично приложение. Дълбока слабост, чувство на изпразване, прималяване и отчаяние. Загуба на контрол върху сфинктерите. Мускулна некоординация.

Ум.

Психична обърканост, несвързаност, илюзии; апатия. Редуване на весели, надеждни състояния с депресия и слабост. Крайна раздразнителност.

Глава.

Оток; ступор; болка при опит да повдигне главата. Диплопия; тежък вид на очите; тинитус; афазия; езикът — сякаш парализиран. Очите — кръвясали и неспокойни. Вертиго — неспособен да се изправи. Птоза; дисфагия; затруднена реч.

Урина.

Албуминурия с цилиндри. Оскъдна. Розов цвят. Постоянен позив за уриниране; оскъдна, кафяво-червена. Хематопорфирурия.

Дихателни органи.

Конгестия на белите дробове. Стерторозно дишане. Въздишаща диспнея.

Крайници.

Атактични движения; залитаща походка. Студени, слаби, треперещи; краката — твърде тежки. Крайна неспокойност; мускулни потрепвания. Изчезване на коленните рефлексии. Скованост и парализа на двата крака. Анестезия на краката.

Сън.

Неспокоен, буден, но сънлив. Инсомния.

Кожа.

Сърбеж; синкава пурпура. Еритема.

Връзки.

Trional — инсомния с физическа възбуда; вертиго; загуба на равновесие; атаксия; гадене; повръщане; диария; стерторозно дишане; цианоза; тинитус; халюцинации.

Доза.

3X тритурация.

Нехомеопатична употреба.

Като хипнотик — 10 до 30 грана в гореща вода; действа след около 2 часа. (Включено буквално, без интерпретация.)

Sulphur

Сулфур **Sulphur**

Sublimated Sulphur.

Голямото хахнеманианско анти-псорично средство. Действието е центробежно — отвътре навън — с избирателна афинитет към кожата, където причинява топлина, парене и сърбеж; по-лошо от топлината на леглото. Инертност и релаксация на тъканите → слаб тонус. Приливи на топлина; отвращение към вода; суха и твърда коса и кожа; червени отвори; чувство на празнота в стомаха около 11 ч.; „котешки дрямки“ — характерни за **Sulphur**. Стоенето е най-лошата позиция — винаги неприятно. Мръсни, нечистоплътни хора, склонни към кожни заболявания. Отвращение към миене. Когато внимателно подбрани лекарства не действат — особено в остри случаи — **Sulphur** често събужда реактивните сили. Оплаквания, които рецидивират. Общо неприятна миризма на секрети и излъчвания. Много червени устни и лице; лесно зачервяване. Полезно в началото на хронични случаи и в края на остри.

Ум.

Много забравителен. Трудно мислене. Делузии — мисли, че парцали са красиви; че е много богат. Постоянно зает. Детинска раздразнителност у възрастни. Раздразнителен. Извратени афекции; много егоистичен. Религиозна меланхолия. Отвращение към работа; мързел. Представа си, че дава грешни неща на хората и причинява смъртта им. Пациентите **Sulphur** почти винаги са раздразнителни, депресивни, слаби и слаби, въпреки добрия апетит.

Глава.

Постоянна топлина на върха на главата. Тежест и пълнота; натиск в слепоочията. Пулсиращо главоболие — по-лошо при навеждане и с вертиго. Периодично повтаряща се мигрена. Tinea capitis — суха форма. Скалпът — сух; косопад; по-лошо от миене. Сърбеж; чесането причинява парене.

Очи.

Пареща улцерация на ръба на клепачите. Ореол около лампата. Топлина и парене в очите. Черни точки пред очите. Първи стадии на улцерация на роговицата. Хроничен офталмит с много парене и сърбеж. Паренхиматозен кератит. Роговица като „матово стъкло“.

Уши.

Свистене. Лоши ефекти от потиснат отит. Свръхчувствителност към миризми. Глухота, предшествана от свръхчувствителен слух. Катарална глухота.

Нос.

Херпес през носа. Запушен нос в помещение. Въображаеми лоши миризми. Крилата — червени и с корички. Хроничен сух катар; сухи корички; лесно кървене. Полипи и аденоиди.

Уста.

Устни — сухи, яркочервени, парещи. Горчив вкус сутрин. Трепвания през зъбите. Подути венци; пулсираща болка. Език — бял, с червен връх и ръбове.

Гърло.

Натиск като от буца, треска, косъм. Парене, зачервяване, сухота. Топка се издига и затваря фаринкса.

Стомах.

Пълна липса или прекомерен апетит. Гнилостни оригвания. Храната — твърде солена на вкус. Пие много, яде малко. Млякото не понася. Силен глад за сладко. Голяма киселинност; кисели оригвания. Парене, болка, тежест. Много слаб и отпаднал около 11 ч.; трябва да яде. Гадене при бременност. Водата „го изпълва“.

Корем.

Много чувствителен на натиск; вътрешно усещане за суровост и болезненост. Движения като от нещо живо. Болка и болезненост над черния дроб. Колики след пиене.

Ректум.

Сърбеж и парене на ануса; хемороиди от абдоминална пълнота. Чести, неуспешни позиви; твърди, възлести, недостатъчни изпражнения. Детето се страхува заради болката. Зачервяване около ануса със сърбеж. Сутрешна диария — безболезнена, изгонва от леглото, с пролапс. Хемороиди — изтичане и оригване.

Урина.

Често уриниране — особено нощем. Енуреза — особено при скрофулозни, нечистоплътни деца. Парене в уретрата при уриниране — продължава дълго след това. Слиз и гной в урината; болезненост на частите, през които минава. Трябва да бърза — внезапен позив. Големи количества безцветна урина.

Мъжки.

Бодежи в пениса. Неволни емисии. Сърбеж на гениталиите при лягане. Органите — студени, отпуснати, безсилни.

Женски.

Сърбеж на вулвата. Вагината — пареща. Много неприятна пот. Мензис — закъснява, кратък, оскъден, труден; гъст, черен, каустичен. Мензис — предшестван от главоболие или внезапно спира. Левкорей — пареща, разяждаща. Зърната — напукани; парят.

Дихателни органи.

Опресия и парене в гърдите. Затруднено дишане; иска отворени прозорци. Афония. Топлина в гърдите. Червени/кафяви петна по гърдите. Влажна кашлица — по-лошо при говорене, сутрин; зелена, гнойна, сладникава експекторация. Много хрипове. Гърдите — тежки; бодежи; сърцето — твърде голямо, с палпитации; плевритни изливи. Бодежи към гръба — по-лошо при лежане по гръб или дълбоко дишане. Приливи на топлина в гърдите, издигащи се към главата. Опресия — като товар. Диспнея посред нощ — по-добре седнал. Пулс — по-бърз сутрин.

Гръб.

Дърпаща болка между лопатките. Скованост на тила. Усещане, сякаш прешлените се плъзгат един върху друг.

Крайници.

Треперене на ръцете. Горещи, потни ръце. Ревматична болка в лявото рамо. Тежест; паретично усещане. Ревматичен подагрозен сърбеж. Парене в стъпалата и ръцете нощем. Пот под мишниците — мирише на чесън. Дърпане и разкъсване в ръцете и дланите. Скованост на колене и глезени. Не може да ходи изправен; прегърбен. Ганглий.

Сън.

Говори, трепва, подскача по време на сън. Ярки сънища. Събужда се пеещ. Често се буди и веднага е напълно буден. Кратки дрямки; най-малкият шум буди. Не може да спи между 2 и 5 ч.

Треска.

Чести топлинни вълни. Силни приливи на топлина. Суха кожа и голяма жажда. Нощна пот — на тила и тила. Пот на отделни части. Отвратителни изпотявания. Ремитиращ тип.

Кожа.

Суха, лющеща се, нездрава; всяко малко нараняване нагноява. Лентиго. Сърбеж, парене — по-лошо от чесане и миене. Пъпки, пустули, rhagades, заусеници. Екскориации — особено в гънките. Усещане за лента около костите. Кожни

заболявания след локални мазила. Пруритус — по-лошо от топлина, вечер; често рецидивира пролет и влажно време.

Модалности.

По-лошо: покой, стоене, топлина в леглото, миене, сутрин, 11 ч., нощем, алкохол, периодично. По-добре: сухо, топло време; лежане на дясната страна; свиване на засегнатите крайници.

Връзки.

Допълващи: **Aloe, Psorin, Acon, Pyrarara**. Сравни: **Acon, Mercur, Calc, Lyc, Sep, Sars, Puls, Sulph-hydrogenisatum, Sulph-terebinthinatum, Tannic-acid, Magnes-artificialis, Magnetis-polus-Articus, Magnetis-polus-Australis, Agraphis**.

Доза.

Действа във всички потенции — от най-ниските до най-високите. Най-добри резултати — от по-високите, не твърде чести дози. 12С — добро начало; по-високо или по-ниско според чувствителността. Хронични случаи — 200С и нагоре. Торпидни обриви — най-ниските потенции.

Sulphuricum acidum

Сулфурикум ацидум **Sulphuric-acid**

Sulphuric Acid.

„Дебилитетът“, характерен за киселините, е силно изразен тук — особено в храносмилателния тракт — дава отпуснато усещане в стомаха, с желание за стимуланти. Тремор и слабост; всичко трябва да се прави набързо. Горещи вълни, последвани от изпотяване и треперене. Склонност към гангрена след механични травми. Крампи при писане. Оловно отравяне. Гастралгия и хипохлорхидрия. *Purpura haemorrhagica*.

Ум.

Раздразнителен, нетърпелив. Не желае да отговаря; прибързан.

Глава.

Дясностранны невралгия; болезнени удари; кожата — сякаш прищипана. Усещане, сякаш мозъкът е хлабав и се люлее от страна на страна. Сътресение на мозъка — кожа

студена, тялото облято в студена пот. Компресивна болка в окципута — по-добре при държане на ръцете близо до главата. Болка на външните части — сякаш има подкожна улцерация; болезнено на допир. Тласък в дясното слепоочие — сякаш се натиска клин.

Очи.

Интраокуларен кръвоизлив след травма. Силна хемоза на конюнктивата, с болка и остри бодежи.

Уста.

Афти; венците — лесно кървящи. Лош дъх. Пародонтоза.

Стомах.

Киселини; кисели оригвания — „стържат“ зъбите. Желание за алкохол. Водата причинява студ в стомаха — трябва да се смеси с алкохол. Отпуснато усещане в стомаха. Отвращение към миризма на кафе. Кисело повръщане. Желание за прясна храна. Хълцане. Студ в стомаха — по-добре от топлина. Гадене с втрисане.

Корем.

Слабост, с дърпане към хълбоците и кръста. Усещане, сякаш херния ще излезе — особено вляво.

Ректум.

Хемороиди; влажно изтичане. Ректумът — сякаш има голяма топка. Диария — зловонна, черна, с кисела миризма на тялото и празно, отпаднало усещане в корема.

Женски.

Мензис — ранен и обилен. Ерозия на шийката при възрастни — лесно кървяща. Левкорей — каустична, пареща, често кърваво-лигавична.

Дихателни органи.

Дишане — бързо, с бодежи в шийни мускули и движение на крилата на носа. Ларинксът — силно подвижен нагоре-надолу. Бронхит при деца — кратка, дразнеща кашлица.

Крайници.

Крампообразни паралитични контракции в ръцете и дланите; потрепване на пръстите при писане.

Кожа.

Лоши ефекти от механични травми — синини и ливидна кожа. Екхимози. Петехии. *Purpura haemorrhagica*. Ливидни, червени, сърбящи петна. Кървене на черна кръв от всички отвори. Цикатрисис — зачервяват, посиняват и стават болезнени. Мразобойни — с тенденция към гангрена. Карбункули, циреи и други стафилококови/стрептококови инфекции.

Модалности.

По-лошо: прекомерна топлина или студ; преди обед и вечер. По-добре: топлина; лежане на засегнатата страна.

Връзки.

Допълващо: **Puls**. Сравни: **Arn, Calend, Led, Sep, Calc**.

Доза.

За хомеопатична употреба — 2C до 30C. (Описаната в текста смес със спирт е включена буквално, без интерпретация.)

Sumbulus moschatus

Сумбулус мошкатус **Sumbul**

Musk-root.

Много хистерични и нервни симптоми; полезен при невралгии и аномални функционални сърдечни разстройства. Изтръпване при изстиване. Изтръпване в лявата страна. Инсомния при *delirium tremens* (15 капки тинктура). Усещане, сякаш вода капе по гръбнака. Астма. Тъканно средство при склерозирали артерии.

Глава.

Емоционален, неспокоен. Тъп сутрин, ясен вечер. Грешки при писане и смятане. Комедони. Лепкава, жълта слуз в носа.

Гърло.

Задущаваща констрикция; постоянно преглъщане. Оригване на газове от стомаха. Спазъм на фарингеалните мускули. Лепкава слуз в гърлото.

Сърце.

Нервна палпитация. Невралгия около лявата гърда и левия хипохондриум. Сърдечна астма. Болка в лявата ръка — тежка, изтръпнала, уморена. Задъхва се при най-малко усилие. Пулс — нерегулярен.

Женски.

Овариална невралгия. Коремът — пълен, подут, болезнен. Климактерични топли вълни.

Урина.

Мазен филм на повърхността на урината.

Модалности.

По-лошо: активни упражнения; лявата страна.

Връзки.

Сравни: **Asaf, Mosch.**

Доза.

Тинктура до 3С. (Д-р W. McGeorge — 2Х на всеки 3 часа при артериосклероза — включено буквално, без интерпретация.)

Symphytum officinale

Симфитум официнале **Symphytum**

Comfrey — Knitbone.

Коренът съдържа кристално вещество, което стимулира растежа на епител върху улцерирани повърхности. Може да се прилага вътрешно при гастрални и дуоденални язви. Полезно при травми на сухожилия, сухожилни влагалища и периост. Действа върху ставите като цяло. Невралгия на коляното.

Голямо значение при рани, проникващи до перинеума и костите, и при несрастване на фрактури. Раздразнен „пън“ след ампутация; раздразнена кост на мястото на фрактура. Псоасен абсцес. Бодежи и болезненост на периоста.

Глава.

Болка в тил, темето и челото — сменя местата си. Болката слиза по костта на носа. Възпаление на долната челюст — твърдо, червено подуване.

Око.

Болка в окото след удар с тъп предмет. При травматични увреждания на очите — няма равен на това средство.

Връзки.

Сравни: **Arn, Calc-phos.**

Доза.

Тинктура.

Външно.

Като превръзка при рани, язви и pruritus ani.

Syphilinum

Сифилинум **Syphilinum**

The Syphilitic Virus — A Nosode.

Пълна прострация и слабост сутрин. Променливи ревматични болки. Хронични обриви и ревматизъм. Ихтиоза. Сифилитични поражения. Болки — от тъмно до разсъмване; намаляват и увеличават постепенно. Наследствена склонност към алкохолизъм. Улцерации на уста, нос, гениталии, кожа. Последователни абсцеси.

Ум.

Загуба на памет — помни всичко преди заболяването. Апатичен; усеща, че полудява или се парализира. Страх от нощта и от изтощението при събуждане. Безнадеждност; отчаяние от възстановяване.

Глава.

Линейни болки — от слепоочието напречно или от очите назад; причиняват безсъние и делириум нощем. Косопад. Болки в костите на главата. Върхът на главата — сякаш се отделя. Ступорозна цефалалгия.

Очи.

Хронично, рецидивиращо фликтенуларно възпаление на роговицата; последователни фликтени и абразии на епитела. Силна фотофобия; обилно сълзене. Клепачите —

подути; болката — силна нощем; птоза. Туберкулозна иридит. Диплопия — вторият образ под първия. Усещане за студен въздух, духащ в окото.

Уши.

Кариес на слуховите костици — сифилитичен произход.

Нос.

Кариес на носните кости, твърдото небце и септума — с перфорация; озена.

Уста.

Зъбите — разрушават се при венеца; назъбени ръбове; дребни. Език — обложен, отпечатьци от зъби; дълбоки надлъжни цепнатини. Язви — парят и смъдат. Обилна слюнка — изтича от устата по време на сън.

Стомах.

Силен глад за алкохол.

Ректум.

Усещане за стегнатост — като със стриктури. Клизмите — много болезнени. Фисури, пролапс.

Крайници.

Ишиас — по-лошо нощем; по-добре към разсъмване. Ревматизъм на раменната става — при залавянето на делтоида. „Run-around“. Силни болки в дългите кости. Зачервяване и суровост между пръстите на краката. Ревматизъм — мускулите са втвърдени на възли. Постоянно миене на ръцете. Вялостни язви. Мускулите — свити в твърди възли.

Женски.

Язви по лабиите. Левкорейя — обилна, водниста, каустична; остра, „ножова“ болка в яйчниците.

Дихателни органи.

Афония. Хронична астма през лятото — хрипове и хъркане. Кашлица — суха, упорита; по-лошо нощем; трахеята — чувствителна на допир. Пробождащи болки — от основата към върха на сърцето — нощем.

Кожа.

Червеникаво-кафяв обрив с неприятна миризма. Крайно изтощение и отслабване.

Връзки.

Сравни: **Merc, Kal-hyd, Nit-ac, Aur, Alum.**

Модалности.

По-лошо: нощем; от залез до изгрев; крайбрежие; лято. По-добре: във вътрешността на страната; в планини; през деня; бавно движение.

Доза.

Само най-високите потенци, рядко.

Syzygium jambolanum

Сизигиум ямболанум **Syzygium-jambolanum**

Jambol Seeds — Enlexing, active principle.

Има незабавен ефект — повишава кръвната захар → глюкозурия. Много полезно средство при diabetes mellitus. Нито едно друго лекарство не причинява в такава степен намаляване и изчезване на захарта в урината. „Prickly heat“ в горната част на тялото; малки червени пъпки — силно сърбящи. Голяма жажда, слабост, изтощение. Много голямо количество урина, висока специфична плътност. Стари кожни язви. Диабетни улцерации. Семената — на прах, 10 грана 3 пъти дневно; също и тинктура.

Връзки.

Сравни: **Insulin** — воден разтвор на активен принцип от панкреаса, влияещ върху метаболизма на захарта. При подходящо приложение при diabetes mellitus — поддържа нормално ниво на кръвната захар и урината остава без захар. Предозиране → слабост, умора, тремор, обилно изпотяване.

Tabacum

Табакум **Tabacum**

Tobacco.

Симптоматологията е изключително ясно очертана. Гадене, световъртеж, „смъртна“ бледност, повръщане, ледена студенина и пот, с интермитентен пулс —

най-характерни. Изразени антисептични качества; антидот на холерни бацили. Пълна прострация на мускулната система. Колапс. Гастралгия, ентералгия, морска болест, cholera infantum. Студен, но иска коремът да е открит. Силна перисталтика → диария. Причинява високо напрежение и артериосклероза на коронарните артерии. Най-хомеопатичното средство при angina pectoris с коронарит и високо напрежение. Констрикция на гърло, гръден кош, мехур, ректум. Бледност, задух, твърд „въжеподобен“ пулс.

Ум.

Усещане за крайна окаяност. Много унил. Забравителен. Недоволен.

Глава.

Вертиго при отваряне на очите. Силно главоболие с „смъртно“ гадене; периодично. Стягане като от лента. Внезапна болка — сякаш удар с чук. Нервна глухота. Повишена секреция от очи, нос и уста.

Очи.

Замъглено зрение; вижда като през воал; страбизъм. Амавроза; muscae volitantes. Централна скотома. Бърза слепота без лезия → последвана от венозна хиперемия и атрофия на зрителния нерв.

Лице.

Бледо, синкаво, изпито, хлътнало, колабирало; покрито със студена пот. Лентиго.

Гърло.

Назофарингит и трахеит; „прочистващо“ покашляне сутрин, понякога с повръщане. Дрезгавост при оратори.

Стомах.

Непрестанно гадене — по-лошо от миризма на тютюнев дим. Повръщане при най-малко движение; понякога фекално; при бременност — с много плюене. Морска болест; ужасно примаяване, празнота в епигастриума. Усещане за релаксация на стомаха с гадене. Гастралгия; болка от кардията към лявата ръка.

Корем.

Студен. Исква коремът да е открит — облекчава гаденето и повръщането. Болезнено подуване. Инкарцерирана херния.

Ректум.

Запек; ректумът — парализиран, пролапс. Диария — внезапна, водниста, с гадене, повръщане, прострация и студена пот; изпразнения като кисело мляко — гъсти, пресечени, воднисти. Ректален тенезъм.

Урина.

Бъбречна колика; силна болка по уретера — вляво.

Сърце.

Палпитации при лежане на лявата страна. Пулс — интермитентен, слаб, едва доловим. Angina pectoris; болка в прекордиума. Болка, излъчваща от центъра на стернума. Тахикардия. Брадикардия. Остра дилатация от шок или силно физическо усилие.

Дихателни органи.

Затруднено дишане; силна констрикция на гръдния кош. Прекордиална опресия с палпитации и болка между лопатките. Кашлица → последвана от хълцане. Кашлица — суха, дразнеща; трябва да отпие студена вода. Диспнея с мравучкане по лявата ръка при лежане на лявата страна.

Крайници.

Крака и ръце — ледено студени; крайниците треперят. Парализа след апоплексия. Походка — влачеща, несигурна. Слабост в ръцете.

Сън.

Инсомния при дилатирано сърце, със студена лепкава кожа и тревожност.

Треска.

Втрисане със студена пот.

Модалности.

По-лошо: отваряне на очите; вечер; крайности на топлина и студ. По-добре: разкриване; свеж въздух.

Връзки.

Сравни: **Hydrobrom-acid, Camph, Verat, Ars. Nicotinum** — тонични и клонични спазми → релаксация и треперене; гадене, студена пот, бърз колапс; опистотонус; ригидност на мускулите; хрипящо дишане от ларингеални/бронхиални спазми.

Антидоти: оцет; кисели ябълки. **Camphor** — физиологичен антагонист. **Ars** — при дъвчене на тютюн. **Ign** — при пушене. **Sep** — невралгия и диспепсия. **Lycop** — импотентност. **Nux** — лош вкус от тютюн. **Calad, Plantag** — предизвикват отвращение към тютюн. **Phosph** — „tobacco heart“, сексуална слабост.

Доза.

3С до 30С и по-високи.

Tanacetum vulgare

Танацетум вулгаре **Tanacetum**

Tansy.

Абнормална отпадналост. Нервност и чувство на умора. „Полумъртво, полуживо усещане“ по цялото тяло. Полезно при хорея и рефлексни спазми (глисти). Счита се за специфично средство срещу ефектите от poison ivy.

Глава.

Тежест, тъпота, обърканост. Главоболие при най-малко усилие.

Ум.

Раздразнителен, чувствителен към шум. Психическа умора, гадене и вертиго — по-лошо в затворено помещение.

Уши.

Бучене и звънене. Гласът звучи странно. Ушите — внезапно „се затварят“.

Корем.

Болка в червата — по-добре след дефекация. Позив за дефекация веднага след хранене. Дизентерия.

Женски.

Дисменорея — с теглещи надолу болки, чувствителност, дърпане в слабините. Мензис — потиснат; по-късно — обилен.

Дихателни органи.

Учестено, затруднено, стридорно дишане. Пенеста слюз — запушва дихателните пътища.

Връзки.

Сравни: **Cimicif**, **Cina**, **Absinth**. **Nux** — следва добре.

Доза.

Тинктура до 3С.

Taraxacum officinale

Тараксацум официнале **Taraxacum**

Dandelion.

За гастрални главоболия, билиозни пристъпи — с характерно „картографски“ език и жълтеникава кожа. Карцином на пикочния мехур. Флатуленция. Хистеричен тимпанит.

Глава.

Усещане за силна топлина на върха на главата. Много болезнен m. sternocleidomastoideus при допир.

Уста.

Картографски език. Езикът — покрит с бял филм; усеща се суров; филмът пада на петна, оставяйки червени, чувствителни зони. Загуба на апетит. Горчив вкус и оригвания. Слюноотделяне.

Корем.

Черният дроб — уголемен и индуратиран. Остри бодежи в лявата страна. Усещане за „пукане на мехурчета“ в червата. Тимпанит. Трудна евакуация.

Крайници.

Много неспокойни крайници. Невралгия на коляното — по-добре от натиск. Крайниците — болезнени при допир.

Треска.

Втрисане след хранене — по-лошо при пиене; върховете на пръстите — студени. Горчив вкус. Топлина без жажда — в лицето, в пръстите на краката. Пот при заспиване.

Кожа.

Обилни нощни изпотявания.

Модалности.

По-лошо: покой, лежане, седене. По-добре: допир.

Връзки.

Сравни: **Choline** — съставка на корена на Taraxacum; използвана експериментално при карцином. Свързана с **Neurin**; „Cancronie“ на проф. Adamkiewicz. **Bry, Hydrast, Nux. Tela aranea** — нервна астма и безсъние.

Доза.

Тинктура до 3С. При карцином — 1–2 драма fluid extract. (Включено буквално, без интерпретация.)

Tarentula cubensis

Тарентула кубензис **Tarentula-cubensis**

Cuban Spider.

Токсинно средство; септични състояния. Дифтерия. Подходящо за най-тежките форми на възпаление и болка, с ранна и постоянна прострация. Различни форми на злокачествена супурация. Пурпурен оттенък и парещи, жилещи болки. Бубон. Средство за „болката на смъртта“ — успокоява последните мъки. Пруритус — особено около гениталиите. Неспкойни крака. Интермитентни септични втрисания. Бубонна чума. Като лечебно и профилактично средство — особено в периода на инвазия.

Глава.

Световъртеж след топлина и гореща пот. Тъпа болка на върха на главата. Стрелкаща болка през лявото око към фронталната област.

Гастрални.

Стомахът — твърд, болезнен. Загуба на апетит, освен за закуска.

Гръб.

Сърбеж в областта на бъбреците.

Крайници.

Ръцете — треперещи, пълнокръвни.

Урина.

Задръжка. Не може да задържи урината при кашляне.

Кожа.

Червени петна и пъпки. Усещане за подпухналост навсякъде. Карбункули — с парещи, жилещи болки. Пурпурен оттенък. Гангрена. Абсцеси — когато болката и възпалението доминират. Скир на гърдите. „Сенилни“ язви.

Сън.

Сънливост. Неспokoен сън. Сънят се нарушава от груба кашлица.

Връзки.

Сравни: **Ars, Pyrog, Crotal, Echin, Anthrac, Bellad, Apis.**

Модалности.

По-добре: пушене. По-лошо: нощем.

Доза.

6C до 30C.

Tarentula hispanica

Тарентула хиспаника **Tarentula-hispanica**

Spanish Spider.

Забележителни нервни феномени; хистерия с хлороза; хорея; дисменорея; спинална раздразнимост. Тенезъм на пикочния мехур. Усещания за констрикция. Формикации. Крайна неспокойност — трябва да бъде в постоянно движение, въпреки че ходенето влошава. Хистерична епилепсия. Интензивна сексуална възбуда.

Ум.

Внезапна промяна на настроението. Хитрост. Разрушителни импулси; морална разпуснатост. Трябва постоянно да се занимава с нещо или да ходи. Чувствителност към музика. Отвращение към компания, но иска някой да е наблизо. Неблагодарна, недоволна. Водена от прищевки.

Глава.

Интензивна болка — сякаш хиляди игли се забиват в мозъка. Вертиго. Исква косата да бъде сресана или главата — разтрита.

Мъжки.

Сексуална възбуда; ласчивност, достигаща почти до лудост. Семинални емисии.

Сърце.

Палпитации; прекордиална тревога; усещане, сякаш сърцето се усуква и обръща.

Женски.

Вулвата — суха и гореща, със силен сърбеж. Обилен мензис, с чести еротични спазми.

Pruritus vulvae; нимфомания. Дисменорея — с много чувствителни яйчници.

Крайници.

Слабост на краката; хореични движения. Изтръпване на краката. Множествена склероза — с треперене. Потрепвания и подскоци. Прозяване с неспокойство в краката — трябва да ги движи постоянно. Необичайни контракции и движения.

Модалности.

По-лошо: движение; контакт; шум; виждане на други в беда. По-добре: свеж въздух; музика; ярки цветове; разтриване на засегнатите части.

Връзки.

Сравни: **Agar, Ars, Cupr, Mag-phos**. Антидот: **Lach**.

Доза.

6C до 30C.

Tartaricum acidum

Тартарикум ацидум **Tartaric-acid**

Tartaric Acid.

Съдържа се в грозде, ананас, лапад и други плодове. Антискорбутно, антисептично средство; стимулира мукозните и слюнчени секрети.

Отпадналост и тъпота. Голяма слабост — с диария, сух и кафяв език. Болка в петите.

Стомах.

Силна жажда. Непрекъснато повръщане. Парене в гърлото и стомаха. Диспепсия с обилна секреция на слюз.

Корем.

Болка около пъпа и в поясната област. Изпражнения — като „утайка от кафе“ (по-лошо нощем), с кафяв и сух език и тъмнозелено повръщане.

Доза.

3X тритурация. Чистата киселина — 10–30 грана, разтворени във вода. (Включено буквално, без интерпретация.)

Taxus baccata

Таксус баката **Taxus-baccata**

Yew.

При пустулозни кожни заболявания и нощни изпотявания. Също при подагра и хроничен ревматизъм.

Глава.

Супраорбитална и темпорална болка вдясно — с лакримация. Зениците — дилатирани. Лицето — подпухнало и бледо.

Стомах.

Слюнката — гореща, каустична. Гадене. Болка в епигастриума и около пъпа. След хранене — кашлица. Усещане за иглички в епигастриума; усещане за празнота — трябва да яде често.

Кожа.

Големи, плоски, сърбящи пустули. Лошо миришещи нощни изпотявания. Подагра. Еризипел.

Доза.

Тинктура до 3С.

Tellurium metallicum

Телуриум металикум **Tellurium-metallicum**

The Metal Tellurium.

Изразени кожни (herpes circinatus), спинални, очни и ушни симптоми. Много чувствителен гръб. Болки по цялото тяло. Зловонни секрети. Бавно развитие на симптомите. Сакрални и ишиасни болки.

Глава.

Разсеяност и забравяне. Болка в лявата страна на главата и челото над лявото око. Изкривяване и потрепване на левите лицеви мускули; при говорене левият ъгъл на устата се повдига и отклонява наляво. Страх от докосване на чувствителни места. Конгестия към главата и тила → последвана от слабост и прималяване в стомаха. Сърбеж на скалпа; червени петна.

Очи.

Клепачите — удебелени, възпалени, сърбящи. Птериgium; пустулозен конюнктивит. Катаракта след очни увреждания; подпомага резорбцията на инфилтрати в ириса и хориоидеята.

Уши.

Екзема зад ухото. Катарално възпаление на средното ухо — секретът е каустичен, мирише на рибена саламура. Сърбеж, подуване, пулсации в слуховия проход. Глухота.

Нос.

Кориза, лакримация и дрезгавост — по-добре на открит въздух. Запушен нос; изхвърля солена слуз от задните носни ходове.

Стомах.

Желание за ябълки. Усещане за празнота и слабост. Киселини.

Ректум.

Pruritus ani et perineî след всяка дефекация.

Гръб.

Болка в сакрума. Болка от последния шиен до петия гръден прешлен — много чувствителна; по-лошо от допир. Ишиас — по-лошо вдясно, при кашляне, напъване и нощем; гръбначният стълб — чувствителен. Контракции на сухожилията в подколнените ямки.

Кожа.

Сърбеж на ръцете и краката. Херпетични петна; ringworm. Кръговидни кожни лезии; зловонни миризми от засегнатите места. Barber's itch. Жилещи усещания в кожата. Фетидни изпарения. Зловонна пот на краката. Екзема зад ушите и на тилната област. Кръгови екзематозни петна.

Модалности.

По-лошо: покой; нощем; студено време; триене; кашляне; смях; лежане на болезнената страна; допир. По-добре: няма посочено.

Връзки.

Сравни: **Radium, Selenium, Tetradyte** (кристали съдържащи Bismuth, Tellurium и Sulphur — кокцигодиния, улцерации на ноктите, болки в ръцете, малки петна, глезени, пети, ахилесово сухожилие); **Sep, Ars, Rhus**.

Доза.

6C и нагоре. Развива действието си бавно; ефектът е много продължителен.

Terebinthinae oleum

Теребинтинае олеум **Terebinthina**

Turpentine.

Има селективен афинитет към кървящи мукозни повърхности. Тимпанит и силно изразени уринарни симптоми. Възпаление на бъбреците с хеморагии — тъмни, пасивни, зловонни. Bright's disease, предшествано от отоци. Сънливост и странгурия. Кома. Незарастващи мразобойни.

Глава.

Тъпа болка — като от лента около главата. Вертиго с изчезване на зрението. Нарушено равновесие. Умора и затруднена концентрация. Храма със болезнени ноздри и склонност към кръвотечение.

Очи.

Цилиарна невралгия над дясното око. Интензивна болка в окото и страната на главата. Амблиопия от алкохол.

Уши.

Собственият глас звучи неестествено. Бучене — като морска раковина. Говоренето на висок глас е болезнено. Оталгия.

Уста.

Език — сух, червен, болезнен, лъскав; парене на върха; уголемени папили. Дъх — студен, зловонен. Усещане за задушаване в гърлото. Стоматит. Дентиция.

Стомах.

Гадене и повръщане. Топлина в епигастриума.

Корем.

Огромно подуване. Диария — водниста, зеленикава, зловонна, кървава. Болка преди газове; облекчение след дефекация. Кървене от червата. Глисти — lumbrici. Абдоминален асцит; тазов перитонит. Прималвяване след всяка дефекация. Ентероколит с хеморагия и улцерации.

Урина.

Странгурия с кървава урина. Оскъдна, потисната, мирише на теменуги. Уретрит с болезнени ерекции. Възпалени бъбреци след остри заболявания. Постоянен тенезъм.

Женски.

Интензивно парене в маточната област. Метрит; пуерперален перитонит. Метрорагия с парене в матката.

Дихателни органи.

Затруднено дишане; усещане, че белите дробове са раздути. Хемоптиза. Кървава експекторация.

Сърце.

Пулс — бърз, малък, нишковиден, интермитентен.

Гръб.

Пареща болка в областта на бъбреците. Дърпане в десния бъбрек, излъчващо към хълбока.

Кожа.

Акне. Еритема; сърбящи пустулозни и везикуларни обриви; уртикария. Пурпура, екхимози, отоци. Скарлатина. Мразобойни — със силен сърбеж и пулсиращи болки. Болезнена чувствителност на мускулите.

Треска.

Топлина с силна жажда, сух език, обилна студена лепкава пот. Тифоидни състояния с тимпанит, хеморагии, ступор, делириум. Прострация.

Връзки.

Сравни: **Alumen, Secale, Canth, Nit-ac. Terebene 1X** — хроничен бронхит, зимни кашлици; подпомага експекторацията. **Ononis spinosa** — диуретик; lithontriptic; хроничен нефрит; подобно на Juniper; кръвотечение от носа — по-лошо при миене на лицето. Антидот: **Phos**.

Доза.

1C до 6C.

Teucrium marum verum

Тевкриум марум верум **Teucrium-marum**

Cat-thyme.

Изразени назални и ректални симптоми. Полипи. Заболявания при деца. Подходящо след прекомерна употреба на лекарства. Свръхчувствителност. Желание за разтягане. Средство от първа важност при хроничен назален катар с атрофия; големи, зловонни корички и „clinkers“. Озена. Загуба на обоняние.

Глава.

Възбудено, треперливо усещане. Фронтална болка — по-лошо при навеждане. Укрепва мозъка след delirium tremens.

Очи.

Парене във вътрешните ъгли. Клепачите — зачервени и подпухнали. Tarsal тумор.

Уши.

Свистене и звънене. Оталгия.

Нос.

Катарално състояние на предни и задни носни ходове. Мукоиден полип. Хроничен катар — отделяне на големи, неправилни корички. Лош дъх. Пълзящо усещане в ноздрите — с лакримация и кихане. Кориза със запушване на носа.

Стомах.

Повръщане на големи количества тъмнозелени маси. Постоянно хълцане — с болка в гърба. Неестествен апетит. Хълцане при хранене, след кърмене.

Дихателни органи.

Суха кашлица; гъделичкане в трахеята. Плесенясал вкус в гърлото при изхраване. Експекторация — обилна.

Крайници.

Засегнати върхове на пръстите и ставите на пръстите на краката. Разкъсващи болки в ръце и крака. Болка в ноктите на краката — сякаш са врасли в плътта.

Ректум.

Сърбеж на ануса; постоянен вечерен дискомфорт в леглото. *Ascarides* — с нощно безпокойство. Пълзящо усещане в ректума след дефекация.

Сън.

Неспокоен — с потрепвания, задушаване, стряскане от страх.

Кожа.

Сърбеж → въртене и мятане цяла нощ. Много суха кожа. Гнойни бразди по ноктите.

Връзки.

Сравни: ***Teucrium scorodonia*** — при туберкулоза с мукопурулентна експекторация; отоци; орхит и туберкулозен епидидимит; особено при млади, слаби индивиди с белодробна, жлезна, костна и урогенитална туберкулоза (3X). ***Cina, Ignat, Sang, Sil.***

Доза.

1C до 6C. Локално при полипи — сух прах.

Thallium metallicum

Талиум металикум **Thallium-metallicum**

The Metal Thallium.

Thallium влияе върху ендокринните жлези, особено щитовидната и адреналина. Ужасни невралгични, спазматични, стрелкащи болки. Мускулна атрофия. Тремори.

Облекчава силните болки при locomotor ataxia. Парализа на долните крайници. Болки в стомаха и червата — като електрически удари. Параплегия. Алопеция след остри, изтощителни заболявания. Нощни изпотявания. Полиневрит. Трофични кожни лезии.

Крайници.

Треперене. Паралитично усещане. Пробождащи болки — като електрически удари. Много умора. Хроничен миелит. Изтръпване на пръстите на ръцете и краката — с разпространение нагоре по долните крайници, обхващащо долната част на корема и перинеума. Парализа на долните крайници. Цианоза на крайниците. Формикации — започват в пръстите и се разпространяват през таза, перинеума и вътрешната част на бедрата до стъпалата.

Връзки.

Сравни: **Lathyr, Caust, Arg-nit, Plumbum.**

Доза.

Ниски тритурации до 30C.

Thea chinensis

Теа чинензис **Thea**

Теа.

Нервно безсъние, сърдечни смущения, палпитации и диспепсия при хронични пиещи чай. Предизвиква повечето „sick headaches“. **Tabacum** — антидот (Allen).

Глава.

Временна умствена възбуда. Лошо настроение. Силно главоболие, излъчващо от една точка. Безсъние и неспокойство. Слухови халюцинации. Усещане за студена, влажна зона в тила.

Стомах.

Усещане за пропадане в епигастриума. Прималяване, празнота. Желание за киселини. Внезапно образуване на големи количества газове.

Корем.

Борборигми. Склонност към херния.

Женски.

Болезненост и чувствителност в яйчниците.

Сърце.

Тревожна опресия. Прекордиален дистрес. Палпитации; не може да лежи на лявата страна. Пърхане. Пулс — бърз, нерегулярен, интермитентен.

Сън.

Сънливост през деня; нощем — сънливост с васкуларна възбуда, неспокойствие и суха кожа. Ужасни сънища, които не предизвикват ужас.

Модалности.

По-лошо: нощем; при ходене на открито; след хранене. По-добре: топлина; топла баня.

Връзки.

Антидоти: **Kali-hypophos**, **Thuja**, **Ferr**, **Kali-hyd** (материални дози — при „tea-taster’s cough“).

Доза.

3C до 30C.

Theine — 1/4–1/2 grain хиподермично при ишиас и супраорбитална невралгия. (Включено буквално, без интерпретация.)

Theridion curassavicum

Теридион курасавикум **Theridion**

Orange-spider.

Нервна хиперестезия. Афинитет към туберкулозната диатеза. Вертиго, „sick headache“, особена болка около сърдечната област, phthisis florida, скрофула — успешно лекувани със средството. Сврѣхчувствителност към шум — прониква в тялото, особено в зѣбите. Шумовете сякаш удрят болезнени точки по тялото. Рахит, кариес, некроза. Фтиза — бодѣж високо в левия апекс. Когато показаното лекарство не задърѣа ефекта си.

Ум.

Неспокоен; нищо не му доставя удоволствие. Времето минава твърде бързо.

Глава.

Болка — по-лошо, когато някой ходи по пода. Вертиго — с гадене и повръщане при най-малко движение, особено при затваряне на очите.

Очи.

Светлинни вибрации пред очите; чувствителност към светлина. Натиск зад очните ябълки. Пулсации над лявото око.

Нос.

Жълтеникав, гъст, зловонен секрет; озена.

Стомах.

Морска болест. Гадене и повръщане при затваряне на очите и при движение. Жилеща болка вляво — над предната част на слезката. Парене в областта на черния дроб.

Дихателни органи.

Болка в горната лява гръдна област. Болка в левите плаващи ребра. Сърдечна тревога и болка. Щипеща болка в левия пекторален мускул.

Гръб.

Чувствителност между прешлените; избягва натиск върху гръбнака. Жилещи болки.

Кожа.

Жилещи пробуждания навсякъде. Чувствителна кожа на бедрата. Сърбежни усещания.

Модалности.

По-лошо: допир; натиск; на кораб; в карета; затваряне на очите; трус; шум; коитус; лява страна. По-добре: няма посочено.

Доза.

30C.

Thiosinaminum

Тиосинаминум **Thiosinaminum**

A chemical derived from oil of mustard-seed (Rhodallin).

Разтворител — външно и вътрешно — за разтваряне на цикатрикси, тумори, уголемени жлези; lupus, стриктури, адхезии. Ектропион, помътнявания на роговицата, катаракта, анкилоза, фиброиди, склеродерма. Шум в ушите. Предложено от д-р A. S. Hard за забавяне на стареенето. Средство при tabes dorsalis — подобрява „lightning pains“. Гастрални, везикуларни и ректални кризи. Стриктурa на ректума — 2 грана два пъти дневно.

Ухо.

Артериосклеротично вертиго. Тинитус. Катарална глухота с цикатрициално удебеляване. Подостър супуративен отит медия — образуване на фиброзни ленти, пречещи на свободното движение на слуховите костици. Удебелена тъпанчева мембрана. Глухота поради фиброзни промени в нерва.

Доза.

Инжектира се подкожно или в самата лезия — 10% разтвор в глицерин и вода, 15–30 капки два пъти седмично. Вътрешно — в капсули, 1/2 grain дневно. Упорити артериосклеротични състояния — 1/2 grain, никога повече, 3 пъти дневно. Вертиго и артрит (Bartlett). 2X потенция.

Thlaspi bursa pastoris

Тласпи бурса пасторис **Thlaspi-bursa-pastoris**

Shepherd's Purse.

Антихеморагично и анти-урик-ацидно средство. Албуминурия по време на бременност. Хронична невралгия. Бъбречно и везикално дразнене. Хеморагия от маточен фиброид — с болка в гърба или обща натъртеност. Болка между лопатките. Маточна хеморагия — с крампи и експулсия на съсиреци. Желание за мътеница. Ефекти от потиснато маточно заболяване.

Глава.

Очите и лицето — подпухнали. Чести епистаксиси. Вертиго — по-лошо при изправяне. Фронтална болка — по-лошо към вечерта. Сквамозна ерупция зад ушите. Език — бял, обложен. Уста и устни — напукани. Остра болка над дясното око — дърпа окото нагоре.

Нос.

Кървене при назални операции. Особено пасивна хеморагия.

Мъжки.

Семепроводът — чувствителен към трус при ходене или возене.

Женски.

Метрорагия; твърде чести и обилни мензиси. Хеморагия — с силна маточна колика. Всеки втори цикъл — много обилен. Левкорей преди и след мензис — кървава, тъмна, зловонна; оставя неизличими петна. Болезненост в матката при изправяне. Едва се възстановява от един цикъл, преди да започне следващият.

Урина.

Чести позиви; урината — тежка, фосфатна. Хроничен цистит. Дизурия и спазматична ретенция. Хематурия. Натрупване на „gravel“. Бъбречна колика. Brick-dust седимент. Уретрит; урината изтича на малки струйки. Често заменя употребата на катетър.

Връзки.

Сравни: **Urtica, Croc, Trill, Millefol.**

Доза.

Тинктура до 6С.

Thuja occidentalis

Туя окциденталис **Thuja-occidentalis**

Arbor vitae.

Действа върху кожа, кръв, гастро-интестинален тракт, бъбреци и мозък. Свързана с образуване на патологични вегетации — кондиломи, брадавични израстъци, гъбести тумори. Влажни мукозни туберкули. Кървящи фиброзни израстъци. Naevus. Излишък на венозност.

Основното действие е върху кожата и генито-уринарните органи — съответства на хахнемановата „сикотична“ дискразия, чиято главна проява е образуването на брадавични израстъци по мукозни и кожни повърхности — fig-warts и condylomata. Специфично антибактериално действие — при гонорея и ваксинация. Потисната

гонорея, салпингит. Лоши ефекти от ваксинация. Сикотични болки — разкъсващи в мускули и стави, по-лошо в покой, по-добре в сухо време, по-лошо във влажна атмосфера; схванатост. Hydrogenoid конституции — кръвта е патологично хигроскопична; влажният въздух и водата са вредни. Оплаквания от лунна светлина. Бързо изтощение и отслабване. Лявостранно и студено лекарство. Variola — прекъсва пустулата и предотвратява супуративната треска. Vaccinosis — упорити кожни проблеми, невралгии и др.

Ум.

Фиксирани идеи — сякаш непознат човек стои до него; сякаш душа и тяло са разделени; сякаш нещо живее в корема. Емоционална чувствителност; музиката причинява плач и треперене.

Глава.

Болка — сякаш пирон се забива. Невралгия от чай. Лявостранно главоболие. Бяла, сквамозна пърхот; косата — суха, пада. Мазна кожа на лицето.

Очи.

Цилиарна невралгия; иридит. Клепачите — слепени нощем; сухи, сквамозни. Ечемици и tarsal тумори. Остро и подостро възпаление на склерата. Склерата — надигната на петна, синьо-червена. Големи, плоски фликтенули; лениви. Рецидивиращ еписклерит. Хроничен склерит.

Уши.

Хроничен отит; гноен секрет. Скърцане при преглъщане. Полипи.

Нос.

Хроничен катар; гъста зелена слуз; кръв и гной. При издухване — болка в зъбите. Улцерации в ноздрите. Сухота в носните кухини. Болезнен натиск в корена.

Уста.

Върхът на езика — много болезнен. Бели мехури отстрани, близо до корена — силно болезнени. Зъбите — разрушават се до венеца; много чувствителни; венците се отдръпват. Течностите падат в стомаха със звук. Ranula; варикозни вени на езика и устата. Pyorrhea alveolaris.

Стомах.

Пълна загуба на апетит. Отвращение към прясно месо и картофи. Гранясали оригвания след мазни храни. Режеща болка в епигастриума. Не може да яде лук. Флатуленция; болка след храна; пропадане в епигастриума преди храна; жажда. Диспепсия от чай.

Корем.

Подуване; индурации. Хронична диария — по-лошо след закуска. Изпражнения — изхвърляни със сила; къркорене. Кафяви петна. Флатуленция и подуване — издуване тук и там. Къркорене и колики. Констипация — с насилствена ректална болка, която кара изпражненията да се връщат. Хемороиди — подути; болка по-лошо при седене; боджежи и парене в ануса. Фисури; болезнени при допир; с брадавици. Движения като от нещо живо — без болка.

Урина.

Уретрата — подута, възпалена. Струята — разцепена и малка. Усещане за капене след уриниране. Силно рязане след уриниране. Често уриниране, придружаващо болките. Позив — внезапен и неотложен, но неконтролируем. Парализа на сфинктера.

Мъжки.

Възпаление на препуциума и гланса; болка в пениса. Баланит. Гонореен ревматизъм. Гонорея. Хронична индурация на тестисите. Болка и парене в областта на шийката на пикочния мехур — с чести и неотложни позиви. Простатна хипертрофия.

Женски.

Влагалището — много чувствително. Брадавични израстъци на вулвата и перинеума. Обилна левкорей — гъста, зеленикава. Силна болка в левия яйчник и лявата ингвинална област. Мензис — оскъден, закъсняващ. Полипи; месести израстъци. Оофорит — по-лошо вляво, при всеки цикъл. Обилно изпотяване преди мензис.

Дихателни органи.

Суха, дрезгава кашлица следобед — с болка в епигастриума. Боджежи в гърдите — по-лошо от студени напитки. Астма при деца. Папилом на ларинкса. Хроничен ларингит.

Крайници.

При ходене — крайниците сякаш са от дърво или стъкло и ще се счупят. Върховете на пръстите — подути, червени, болезнени. Мускулни потрепвания, слабост и треперене. Пукания в ставите. Болка в петите и ахилеса. Чупливи нокти. Враснал нокът.

Кожа.

Полипи, туберкули, брадавици, епителиом, паеви, карбункули; язви — особено в ано-гениталната област. Лунички и петна. Пот — сладникава и силна. Суха кожа с кафяви петна. Зона; херпетични ерупции. Разкъсващи болки в жлезите. Жлезни увеличения. Ноктите — деформирани, чупливи, меки. Ерупции само по покритите

части; по-лошо след чесане. Много чувствителна на допир. Студенина на едната страна. Сарком; полипи. Кафяви петна по ръцете и ръцете.

Сън.

Упорито безсъние.

Треска.

Втрисане — започва в бедрата. Пот — само по непокрытите части или навсякъде, освен по главата, по време на сън; обилна, кисела, мирише на мед. Оргазъм на кръвта вечер — с пулсации в съдовете.

Модалности.

По-лошо: нощем; от топлината на леглото; в 3 ч. сутрин и 3 ч. следобед; от студен, влажен въздух; след закуска; мазни храни; кафе; ваксинация. По-добре: лявата страна; при сгъване на крайник.

Връзки.

Hydrogenoid конституция: **Calcar, Silica, Nat-sulph, Aranea, Apis, Pulsat. Cupressus australis** — остри бодежи; общо чувство за топлина; ревматизъм и гонорея. **Cupressus Lawsoniana** — действа като Thuja; ужасни болки в стомаха. **Sphingurus** — косопад от брадата; болка в челюстната става и зигомата. **Sil, Maland** (ваксинация), **Medorrh** (потисната гонорея), **Merc, Cinnab, Terebinth, Juniperus, Sabal, Canth, Cannab, Nit-ac, Puls, Ant-tart.** Arborin — неалкохолен препарат от Thuja.

Антидоти: **Merc, Camph, Sabin** (брадавици). Комплементарни: **Sabina, Ars, Nat-sulph, Silica.**

Доза.

Локално — тинктура или церат за брадавици и израстъци. Вътрешно — тинктура до 30C.

Thymolum

Тимолум **Thymolum**

Thyme Camphor (Thymol).

Средство с широк обхват при генито-уринарни заболявания. Показано при патологични емисии, приапизъм и простаторея. Прувингите показват действие,

ограничено до сексуалните органи — предизвиква типична сексуална неврастения. Специфично при hookworm disease.

Ум.

Раздразнителен, своеволен, трябва да става на неговото. Жадува компания. Енергията е изчерпана.

Гръб.

Умора и болка в лумбалната област. По-лошо при умствен и физически труд.

Мъжки.

Обилни нощни семенни емисии — с ласцивни, перверзни сънища. Приапизъм. Парене при уриниране и последващо капене. Полиурия. Уратите — увеличени. Фосфатите — намалени.

Сън.

Събужда се уморен и неосвежен. Ласцивни и фантастични сънища.

Връзки.

Сравни: **Carbon-tetrachloride** — средство за hookworms според д-р Lambert, Suva, Fiji (50 000 случая). Цитирани данни:

1. Carbon tetrachloride — мощен вермифуг и вермицид; най-добър при hookworm в ендемични райони.
2. Малко дискомфорт; приятен вкус; не изисква подготовка; в чист вид — нетоксичен. Smillie и Pessoa (Sao Paulo) — изключително ефективен; единична доза 3 cc премахва 95% от паразитите.

Модалности.

По-лошо: умствен и физически труд.

Доза.

6X потенция.

Thyroidinum

Тироидинум **Thyroidinum**

Dried Thyroid Gland of the Sheep.

Thyroid предизвиква анемия, отслабване, мускулна слабост, изпотяване, главоболие, нервен тремор на лице и крайници, мравучкане, парализа. Ускорен пулс, екзофталм, дилатация на зениците. При микседем и кретинизъм ефектите са поразителни. Ревматоиден артрит. Детско изтощение. Рахит. Забавено срастване на фрактури. В дози 1/2 grain два пъти дневно — ефективно при недесцендирал тестис при момчета. Регулиращо действие върху храненето, растежа и развитието. Слабост на щитовидната → силно желание за големи количества сладко.

Полезно при псориазис; тахикардия. Задържано развитие при деца. Подобрява паметта. Гуша. Прекомерно затлъстяване. По-добре действа при бледи пациенти, отколкото при зачервени. Амблиопия. Тумор на гърдата. Маточен фиброид. Голяма слабост и глад, но отслабва. Нощна енуреза. Агалактия. Да се започне рано в бременността. Повръщане на бременността — да се дава рано сутрин преди ставане. Фиброидни тумори на гърдата — 2X тритурация. Дилатира артериолите (Adrenaline ги свива). Усещане за примамяване и гадене. Изразена чувствителност към студ. Хипотиреоидизъм след остри заболявания — слабост, лесна умора, слаб пулс, склонност към примамяване, палпитации, студени ръце и крака, ниско кръвно, втрисане, чувствителност към студ. Силен диуретичен ефект при микседем и различни видове отоци.

Ум.

Ступор, редуващ се с неспокойна меланхолия. Раздражителен — по-лошо при най-малко противопоставяне; изпада в ярост за дреболии.

Глава.

Усещане за лекота в мозъка. Упорито фронтално главоболие. Очните ябълки — изпъкнали. Лицето — зачервено; устните — парят. Език — силно обложен. Пълнота и топлина. Лицето — зачервено. Лош вкус в устата.

Сърце.

Пулс — слаб, чест; не може да лежи. Тахикардия. Тревога в гърдите — сякаш стегнати. Палпитации при най-малко усилие. Силна сърдечна болка. Лесна възбудимост на сърцето. Слабо сърдечно действие — с изтръпване на пръстите.

Очи.

Прогресивно намаляване на зрението — с централен скотом.

Гърло.

Сухо, конгестирано, сурово, парещо — по-лошо вляво.

Стомах.

Желание за сладко и жажда за студена вода. Гадене — по-лошо при пътуване. Флатуленция; много газове в корема.

Урина.

Увеличено количество; полиурия; малко албумин и захар. Енуреза при слаби, нервни и раздразнителни деца (1/2 grain сутрин и вечер). Урината — мирише на теменуги; парене по уретрата; увеличена пикочна киселина.

Крайници.

Ревматоиден артрит — със склонност към затлъстяване, студенина и крампи. Белене на кожата на долните крайници. Студени крайници. Болки. Отоци на краката. Тремор на крайниците и цялото тяло.

Дихателни органи.

Суха, болезнена кашлица — с оскъдна, трудна експекторация и парене в фаринкса.

Кожа.

Псориазис — свързан със затлъстяване (не в развиващия се стадий). Кожата — суха, бедна. Студени ръце и крака. Екзема. Маточни фиброиди. Кафеникаво подуване. Жлезите — подути, каменно твърди. Вялост. Жълтеница с пруритус. Ихтиоза, lopus. Сърбеж без ерупция — по-лошо нощем.

Връзки.

Сравни: **Spongia, Calc, Fucus, Lycopus, Iodothyrene** (богато на йод и азот; влияе на метаболизма; намалява теглото; може да причини глюкозурия; внимание при затлъстяване). Млякото съдържа вътрешната секреция на щитовидната. **Thymus gland extract** — arthritis deformans; метаболитен остеоартрит. Високи потенции — много ефективни при екзофталмична гуша.

Доза.

Crude Thyroid понякога; по-добре 6C до 30C. Ако се приема в суров вид (2–3 грана или повече дневно) — пулсът трябва да се наблюдава. Не се дава във физиологични дози при слаб сърдечен мускул с високо кръвно налягане, нито при туберкулозни пациенти.

Tilia europaеа

Тилия европаеа **Tilia-europaеа**

Linden.

Ценно средство при мускулна слабост на очите; хеморагия от тънка, бледа кръв. Пуерперален метрит. Заболявания на антрума.

Глава.

Невралгия (първо вдясно, после вляво) — с воал пред очите. Обърканост — с замъглено зрение. Много кихане — с течаща кориза. Кървене от носа.

Очи.

Усещане за воал/марля пред очите. Бинокулярното зрение — несъвършено.

Женски.

Интензивна болезненост около матката; „bearing-down“ — с гореща пот, но без облекчение. Обилна, слuzеста левкорейа при ходене. Болезненост и зачервяване на външните гениталии. Тазово възпаление, тимпанит, коремна чувствителност и гореща пот, която не облекчава.

Кожа.

Уртикария. Силен сърбеж и парене като огън след чесане. Ерупция от малки, червени, сърбящи пъпки. Топла, обилна пот скоро след заспиване. Потта се увеличава, когато ревматичните болки се увеличават.

Модалности.

По-лошо: следобед и вечер; в топла стая; от топлината на леглото. По-добре: хладна стая; движение.

Връзки.

Сравни: **Lilium, Bellad.**

Доза.

Тинктура до 6С.

Tongo – *Dipterix odorata*

Тонго – Диптерикс одората **Tongo-Dipterix-odorata**

Seeds of *Coumarouna* — дърво от Гвиана.

Полезно при невралгия; коклюш.

Глава.

Разкъсваща болка в супраорбиталния нерв — с топлина и пулсираща болка в главата и епифора. Обърканост — особено в тилната област, със сънливост и вид опиянение. Треперене в десния горен клепач. Кориза; носът запушен — трябва да диша през устата.

Крайници.

Разкъсващи болки в тазобедрените стави, бедрената кост и коляното — особено вляво.

Връзки.

Melilotus, Anthoxanthum, Asperula, Tonga — съдържат Coumarin, активния принцип. Сравни при сenna хрема: **Trifol, Naph, Sabad**.

Доза.

Тинктура и ниски потенции.

Torula cerevisiae

Торула цевевизие **Torula-cerevisiae**

Saccharomyces — Yeast Plant.

Въведено от д-р Lehman и д-р Yingling. Не е провеждан пълен proving — налични са само клинични симптоми, много от които са потвърдени. Сикотично средство. Анафилактични състояния, предизвикани от протеини и ензими.

Глава.

Болка в тила и шията. Главоболие и остри болки навсякъде. По-лошо при констипация. Кихане и хриптене. Катарален секрет от задните носни ходове. Раздразнителен и нервен.

Стомах.

Лош вкус. Гадене. Лошо храносмилане. Оригване на газове от стомаха и корема. Болезненост по целия корем. Усещане за пълнота. Къркорене; болките се местят; флатуленция. Констипация. Кисел, „дрождов“, плесенясал мирис на секретите.

Крайници.

Болки в гърба; умора и слабост от лактите и коленете надолу. Ръцете — ледено студени и лесно изтръпват.

Сън.

Нарушен — с много неспокойствие.

Кожа.

Фурункули — рецидивиращи. Сърбяща екзема около глезените. *Tinea versicolor*.

Доза.

Чиста мая (yeast cake) или потенции от 3X нагоре. Маяни лапи — често използвани при кожни заболявания, фурункули и отоци.

Trifolium pratense

Трифолиум пратенсе **Trifolium-pratense**

Red Clover.

Предизвиква силно изразена птиализъм. Усещане за пълнота с конгестия на слюнчените жлези, последвано от обилно отделяне на слюнка. Усещане сякаш започва паротит. *Crusta lactea*; сухи, сквамозни корички. Скован врат. Канцерозна диатеза.

Глава.

Обърканост и главоболие при събуждане. Тъпота в предния мозък. Умствено отслабване, загуба на памет.

Уста.

Увеличено отделяне на слюнка. Болно гърло — с дрезгавост.

Дихателни органи.

Кориза — подобна на тази, която предшества сenna хрема; тънък секрет, с много дразнене. Дрезгав и задушаващ; втрисане с кашлица през нощта. Кашлица при излизане на открито. Сenna хрема. Спазматична кашлица; коклюш — пристъпи, по-лошо нощем.

Гръб.

Вратът — скован; крампи в стерноклейдомастоидните мускули; облекчение от топлина и разтриване.

Крайници.

Мравучкане в дланите. Студени ръце и крака. Тибиални язви.

Връзки.

Trifolium repens — White Clover: профилактично при паротит; конгестия на слюнчените жлези; болка и втвърдяване, особено субмаксиларно; по-лошо при лягане. Устата — пълна с водниста слюнка, по-лошо при лягане. Вкус на кръв в устата и гърлото. Усещане сякаш сърцето ще спре — с голям страх; по-добре при сядане или движение; по-лошо, когато е сам; студена пот по лицето.

Доза.

Тинктура.

Trillium pendulum

Трилиум пендулум **Trillium-pendulum**

White Beth-root.

Общо хеморагично средство — с голяма слабост и световъртеж. Хронична диария от кървава слуз. Маточни хеморагии. Заплашващ аборт. Релаксация на тазовата област. Крамповидни болки. Фтиза — с гнойна, обилна експекторация и хемоптиза.

Глава.

Болка във фронталната област — по-лошо от шум. Обърканост; очните ябълки — сякаш твърде големи. Замъглено зрение; всичко изглежда синкаво. Епистаксис.

Уста.

Кървене от венците. Кървене след изваждане на зъб.

Стомах.

Топлина и парене в стомаха — издига се към хранопровода. Хематемеза.

Ректум.

Хронична диария — кървави изхождания. Дизентерия — почти чиста кръв.

Женски.

Маточни хеморагии — със усещане, сякаш бедрата и гърбът се разпадат; по-добре от стегнати превръзки. Изливане на ярка кръв при най-малко движение. Хеморагия от фиброиди. Пропулс — с изразено „bearing-down“. Левкорей — обилна, жълта, нишковидна. Метрорагия в климактериума. Лохиите внезапно стават кървави. Капене на урина след раждане.

Дихателни органи.

Кашлица — с хемоптиза. Обилна, гнойна експекторация. Хемоптиза. Болка в края на стернума. Задушаващ пристъп с неправилно дишане и кихане. Стрелкащи болки през гърдите.

Връзки.

Trillium cernum — очни симптоми; всичко изглежда синкаво; мазно усещане в устата.

Ficus — хеморагии: метрорагия, хематурия, епистаксис, хематемеза, кървящи хемороиди. **Sanguisuga** — хеморагии; кървене от ануса. **Ipec, Sab, Lach, Hamam.**

Доза.

Тинктура и ниски потенции.

Trinitrotoluenum

Тринитротолуенум **Trinitrotoluenum**

T. N. T.

Симптоми, наблюдавани при работници в боеприпасни заводи, които вдишват, поглъщат и абсорбират T.N.T. през кожата. Събрани от д-р Conrad Wesselhoeft, публикувани в *Journal of the American Institute of Homeopathy*, декември 1926.

Разрушителното действие върху еритроцитите → анемия и жълтеница със вторични симптоми. Хемоглобинът се променя и не може да пренася кислород → задух,

световъртеж, главоболие, примаяване, палпитации, лесна умора, мускулни крампи, цианоза; също сънливост, депресия, безсъние. Късни стадии → токсична жълтеница и апластична анемия. Жълтеницата е резултат от клетъчна деструкция (не обструктивна).

Глава.

Депресия и фронтално главоболие. Отвращение към компания; апатичен; лесно плаче. Примаяване, световъртеж, умствена забавеност; делириум, конвулсии, кома. Лицето — много тъмно.

Дихателни органи.

Носът — сух, със запушено усещане. Кихане, кориза, парене в трахеята. Усещане за задушаване тежест в гърдите. Суха, конвулсивна кашлица — отделя мукозни тапи.

Гастро-интестинални.

Горчив вкус; силна жажда; кисел регургитат. Тъпо парене зад мечовидния израстък. Гадене, повръщане. Констипация → последвана от диария с крампи.

Кардио-васкуларни.

Палпитации. Тахикардия. Брадикардия. Интермитентен пулс.

Урина.

Тъмна урина. Парене при уриниране. Внезапен позив. Инконтиненция и ретенция.

Кожа.

Ръцете — оцветени в жълто. Дерматит, нодуларен еритем, везикули, сърбеж и парене; подпухналост. Склонност към подкожни и назални хеморагии. Умора и болка зад коленете.

Модалности.

По-лошо: алкохол (пада след 1–2 питиета уиски); чай (силно отвращение).

Връзки.

Сравни: **Zinc, Phosph, Cina, Ars, Plumbum.**

Доза.

30C — използвана успешно.

Triosteum perfoliatum

Триостеум перфолиатум **Triosteum-perfoliatum**

Fever-root.

Много ценно средство при диария, съпроводена с коликообразни болки и гадене; изтръпване на долните крайници след изхождане; увеличено отделяне на урина. Полезно и при инфлуенца. Успокоява нервните симптоми. Билиозност. Билиозна колика.

Глава.

Тилна болка — с гадене при изправяне, последвано от повръщане. Инфлуенца — с болки по цялото тяло и топлина в крайниците. Озена; фронтална болка.

Стомах.

Отвращение към храна. Гадене при изправяне, последвано от повръщане и крампи. Изпражнения — воднисти, пенести.

Крайници.

Скованост на всички стави. Прасците — изтръпнали. Болки в костите. Ревматична болка в гърба. Болки в крайниците.

Кожа.

Сърбящи уртики. Уртикария от стомашно разстройство.

Доза.

6С.

Triticum repens – Agropyron repens

Тритикум репенс – Агропирон репенс **Triticum-repens**

Couch-Grass.

Отлично средство при силна раздразнимост на пикочния мехур, дизурия, цистит, гонорея.

Нос.

Постоянно духа носа.

Урина.

Често, трудно и болезнено уриниране. Пясъчни (gravelly) утайки. Катарални и гнойни секрети. Странгурия, пиелит; уголемена простата. Хронична цистична раздразнимост. Инконтиненция; постоянен позив. Урината — гъста и дразни мукозните повърхности.

Връзки.

Tradescantia — хеморагия от ухото и горните дихателни пътища; болезнено уриниране; уретрален секрет; възпален скротум. **Chimaph**, **Senecio**, **Populus trem**, **Buchu**, **Uva**.

Polytrichum juniperinum — болезнено уриниране при възрастни; воднянка; обструкция и супресия на урината.

Доза.

Тинктура или запарка — 2 унции се варят в 1 кварта вода, докато се редуцира до 1 пинта. Приема се в 4 дози за 24 часа.

Tuberculinum

Туберкулинуум **Tuberculinum**

A Nucleo-protein — Nosode from Tubercular Abscess.

Показано при бъбречни заболявания, но е нужна предпазливост — когато кожата и червата не функционират нормално, дори високите потенции са опасни. При хроничен цистит — блестящи и трайни резултати.

Безспорна стойност при начална туберкулоза. Особено подходящо за светлокожи, тесногръди пациенти. Отпусната тъкан, ниска възстановителна способност, силна чувствителност към промени във времето. Пациентът винаги е уморен; движението причинява силна умора; отвращение към работа; желание за постоянни промени. Когато симптомите непрекъснато се променят и добре подбрани лекарства не действат; настива от най-малко излагане. Бързо отслабване. Много ценно при епилепсия, неврастения и нервни деца. Диария при деца — седмици наред; силно изтощение, синкав блед тен. Умствено изостанали деца. Уголемени тонзили. Кожни заболявания, остър ставен ревматизъм. Много чувствителен — психически и физически. Общо изтощение. Нервна слабост. Тремор. Епилепсия. Артрит.

Ум.

Противоречиви характеристики — мания и меланхолия, безсъние и сопор.
Раздразнителен — особено при събуждане. Потиснат, меланхоличен. Страх от кучета.
Страх от животни. Желание да използва мръсни думи, да ругае.

Глава.

Склонност към дълбоки мозъчни главоболия и силни невралгии. Всичко изглежда странно. Интензивна болка — сякаш железен обръч около главата. Менингит. Когато се появят критични отделения — пот, полиурия, диария, екзантема — дозата се повтаря само при нова криза. Нощни халюцинации; буди се уплашен. *Plica polonica*.
Поредица от малки, много болезнени циреи в носа; зелен, фетиден гной.

Уши.

Упорита, зловонна оторея. Перфорация на тъпанчето — с разкъсани ръбове.

Стомах.

Отвращение към месо. Усещане за празнота и глад. Желание за студено мляко.

Корем.

Ранно сутрешна, внезапна диария. Изпражнения — тъмнокафяви, зловонни, изхвърляни със сила. *Tabes mesenterica*.

Женски.

Доброкачествени тумори на гърдата. Мензис — твърде ранен, твърде обилен, продължителен. Дисменорея. Болките се увеличават при започване на менструацията.

Дихателни органи.

Уголемени тонзили. Твърда, суха кашлица по време на сън. Експекторация — гъста, лесна; обилна бронхорея. Задух. Усещане за задушаване — дори при много свеж въздух. Желание за студен въздух. Бронхопневмония при деца. Твърда, дрезгава кашлица, обилно изпотяване, отслабване, хрипове по целия гръден кош. Отлаганията започват в апекса на белия дроб.

Гръб.

Напрежение в тила и надолу по гръбнака. Втрисане между лопатките или нагоре по гръба.

Кожа.

Хронична екзема; силен сърбеж — по-лошо нощем. Акне при туберкулозни деца. Морбили; псориазис. Силен сърбеж.

Сън.

Лош сън; буди се рано. Непреодолима дневна сънливост. Сънища — ярки и мъчителни.

Треска.

Следкритична температура — ремитентен тип. Тук дозата се повтаря на всеки два часа. Обилна пот. Обща студенина.

Модалности.

По-лошо: движение; музика; преди буря; стоене; влажност; течение; рано сутрин; след сън. По-добре: на открит въздух.

Връзки.

Koch's lymph — остър и хроничен паренхиматозен нефрит; пневмония; бронхопневмония; конгестия на белите дробове. **Aviare** — действа на апексите; отлично при инфлуенциален бронхит; отслабване, кашлица, загуба на апетит; остри бронхопулмонални заболявания при деца; сърбеж на длани и уши. **Hydrast** — за уговяване след Tuberc. **Formic acid** — туберкулоза, хроничен нефрит, злокачествени тумори; lupus; карцином на гърда и стомах. **Bacil, Psorin, Lach, Kalagua, Teucrium scorodonia. Thuja** — при Vaccinosis, която блокира действието на Tuberculinum.

Комплементарни: **Calcarea, China, Bryon.**

Доза.

30C и по-високи, рядко. При деца — по-чести повторения. Когато Tuberculinum не действа — **Syphilinum** често следва добре.

Tussilago petasites

Тусилаго петаситес **Tussilago-petasites**

Butter-burr.

Има действие върху уринарните органи; полезно при гонорея. Засегнат пилор.

Урина.

Пълзящо, „мравучкащо“ усещане в уретрата.

Мъжки.

Гонорея — жълтеникав, гъст секрет. Ерекции — с пълзящо усещане в уретрата. Болка в семенната връв.

Връзки.

Tussilago fragrans — болка в пилора, плетора, склонност към напълняване. **Tussilago farfara** — кашлици; интеркурентно при phthisis pulmonalis (виж Tuberculinum).

Доза.

Тинктура.

Upas tieut

Упас тют **Upas-tieut**

Upas-tree — *Strychnos Tiente*.

Предизвиква тонични спазми, тетанус и асфиксия.

Глава.

Нежелание за умствена работа. Раздразнителност. Тъпо главоболие — дълбоко в мозъка.

Очи.

Болка в очите и орбитите — с конюнктивит. Тъпи, хлътнали
Разбира се, Захари —
оформям **Upas tieut** напълно в **твоя фиксиран, технически и буквален стил**, без
никакъв курсив, без интерпретация, само с болд върху името на лекарството,
подравнено и структурирано.

Upas tieut

Упас тют **Upas-tieut**

Upas-tree — *Strychnos tiente*.

Предизвиква тонични спазми, тетанус и асфиксия.

Глава.

Нежелание за умствена работа. Раздразнителност. Тъпо главоболие — дълбоко в мозъка.

Очи.

Болка в очите и орбитите — с конюнктивит. Тъпи, хлътнали очи. Ечемици.

Уста.

Херпес по устните. Парене на езика. Болка в устата — сякаш от треска (като от треска/трън).

Мъжки.

Желанието — увеличено, но със загуба на сила. Тъпа болка в кръста — като след прекомерен коитус.

Гръден кош.

Пробождаща болка през десния бял дроб към черния дроб — спира дишането. Силна палпитация. Усещане за тежест в стомаха.

Кожа.

Изтръпване на ръце и крака. Възпалени кожички около ноктите. Сърбеж и зачервяване в основата на ноктите.

Връзки.

Upas antiaris — смолист ексудат от *Antiarus toxicaria*:

- силно мускулно отровно действие,
- спира волевата мускулатура и сърцето без конвулсии,
- използван като стрелна отрова в Ява,
- предизвиква клонични спазми, силно повръщане, диария, голямо изтощение.

Сравни: **Oxal-ac. Upas** — когато **Bryonia** не действа (тифоидни състояния).

Антидот: **Curare**.

Доза.

3С до 6С.

Uranium nitricum

Ураниум нитрикум **Uranium-nitricum**

Nitrate of Uranium.

Причинява глюкозурия и увеличено количество урина. Известно е, че предизвиква нефрит, диабет, дегенерация на черния дроб, високо кръвно налягане и воднянка. Терапевтичен ключ: силно отслабване, изтощение, склонност към асцит и обща воднянка. Болки в гърба и закъсняващи мензиси. Сухи лигавици и кожа.

Глава.

Лошо настроение; тъпа, тежка болка. Ноздрите — болезнени, с гноен, разяждащ секрет. Психическа депресия.

Очи.

Възпалени и слепващи клепачи. Ечемици.

Стомах.

Силна жажда; гадене; повръщане. Вълчи апетит; храненето води до флатуленция. Пронизваща болка в пилорната област. Гастрални и дуоденални язви. Пареща болка. Коремът — подут. Газове — втори по сила след Лусор.

Урина.

Обилно уриниране. Диуреза. Инконтиненция. Диабет. Отслабване и тимпанит. Парене в уретрата — с много кисела урина. Не може да задържи урината без болка. Енуреза.

Мъжки.

Пълна импотентност — с нощни емисии. Органите — студени, отпуснати, потни.

Връзки.

Сравни: **Syzygium, Phos-ac, Lact-ac, Arg-nit, Kali-bich, Ars, Phloridzin** (глюкозиден принцип от кората на корените на ябълкови и други овощни дървета; причинява глюкозурия и мастна дегенерация на черния дроб; интермитентна треска; не повишава кръвната захар; принуждава бъбречния епител да разгради серумния албумин до захар).

Доза.

Втора тритурация.

Vaccinium

Ваксининум **Vaccinium**

Nosode — от ваксинален материал.

Ваксиналният токсин може да предизвика хронично, упорито патологично състояние, описано от Burnett като *Vaccinosis* — със симптоми, подобни на сикоза. Невралгии. Упорити кожни обриви. Студенина. Лошо храносмилане с голямо газообразуване. Коклюш.

Ум.

Раздразнителен. Нетерпелив. Лошо настроение. Нервен.

Глава.

Фронтално главоболие. Чело и очи — усещане сякаш се разцепват. Клепачите — зачервени и възпалени.

Кожа.

Гореща и суха. Пъпки и петна. Обрив, подобен на вариола.

Връзки.

Сравни: анти-вакцинални средства; **Variolin, Malandrinum, Thuja** — мощни адюванти при лечение на злокачествени заболявания.

Доза.

6C до 200C.

Valeriana officinalis

Валериана официналис **Valeriana-officinalis**

Valerian.

Хистерия, свръхчувствителност, нервни състояния, когато добре подбрани лекарства не действат. Хистерични спазми и хистерични прояви като цяло. Хистерична флатуленция.

Ум.

Променливо настроение. Усеща се лек, сякаш плава във въздуха. Свръхчувствителност. Нощни халюцинации. Раздразнителен. Треперлив.

Глава.

Усещане за голяма студенина. Натиск във фронталната област. Усещане за опиянение.

Уши.

Болка в ушите от течение и студ. Нервни шумове. Хиперестезия.

Гърло.

Усещане сякаш конец виси в гърлото. Гадене, усещано в гърлото. Фаринксът — стегнат.

Стомах.

Глад — с гадене. Оригвания — зловонни. Киселини — с връщане на гранясала течност. Гадене — с примаяване. Детето повръща пресечено мляко на големи бучки след кърмене.

Корем.

Подут. Хистерични крампи. Тънка, водниста диария — с бучки пресечено мляко и силен писък при деца. Зеленикави, кашави, кървави изпражнения. Чревни спазми след храна и нощем в леглото.

Дихателни органи.

Задушаване при заспиване. Спазматична астма; конвулсивни движения на диафрагмата.

Женски.

Мензис — закъсняващ и оскъден.

Крайници.

Ревматични болки в крайниците. Постоянни подскоци. Тежест. Ишиас — болката по-лоша при стоене и опиране на пода; по-добре при ходене. Болка в петите при седене.

Сън.

Безсъние — с нощен сърбеж и мускулни спазми. По-лошо при събуждане.

Треска.

Продължителна топлина — често с пот по лицето. Топлината доминира. Усещане за ледена студенина.

Връзки.

Сравни: **Asaf, Ign, Croc, Castor, Amm-valer** — при невралгия, стомашни разстройства и силна нервна възбуда. Безсъние — особено при бременност и менопауза. Слаби, хистерични, нервни пациенти.

Доза.

Тинктура.

Vanadium metallicum

Ванадийум металикум **Vanadium-metallicum**

The Metal.

Действа като кислородоносител и катализатор — затова се използва при изтощителни заболявания. Увеличава количеството хемоглобин; свързва кислорода с токсините и намалява тяхната вирулентност. Увеличава и стимулира фагоцитите. Средство при дегенеративни състояния на черния дроб и артериите. Анорексия и симптоми на гастро-интестинално дразнене; албумин, цилиндри и кръв в урината. Тремор; световъртеж; хистерия и меланхолия; невроретинит и слепота. Анемия, отслабване. Кашлица — суха, дразнеща, пристъпна, понякога с хеморагии. Дразнене на нос, очи и гърло. Туберкулоза, хроничен ревматизъм, диабет. Тонизира храносмилателната функция; полезно в ранна туберкулоза. Артериосклероза; усещане сякаш сърцето е притиснато; сякаш кръвта няма място в аортата. Тревожно налягане в целия гръден кош. Масно сърце. Дегенеративни състояния; омекване на мозъка. Атерома на мозъчните и чернодробните артерии.

Сравни: **Ars, Phos. Ammon-vanad** — мастна дегенерация на черния дроб.

Доза.

6C–12C. Най-добрата форма: **Vanadate of Soda**, 2 mg дневно, per os.

Variolinum

Вариолинум **Variolinum**

Lymph from Small-pox Pustule.

Използва се за „вътрешна ваксинация“. Изглежда ефективно за предпазване, модифициране и подпомагане лечението на едра шарка.

Глава.

Болезнен страх от едра шарка. Глухота. Болка в тилната област. Възпалени клепачи.

Дихателни органи.

Затруднено дишане. Гърлото — усеща се затворено. Кашлица — с гъста, вискозна, кървава слуз. Усещане за бучка в дясната страна на гърлото.

Общи болки.

Мъчителна болка в гърба. Болки в краката. Обща умора — с неспокойствие. Болки в китките. Болките се местят от гърба към корема.

Треска.

Гореща треска — с интензивна, излъчваща топлина. Обилна, лошо миришеща пот.

Кожа.

Гореща, суха. Пустулозен обрив. Херпес зостер.

Връзки.

Сравни: **Vaccin** (същото действие). **Malandrinum** — продукт от „grease“ на коня; профилактика на едра шарка; средство при лоши ефекти от ваксинация; хронична екзема след ваксинация.

Доза.

6C до 30C.

Veratrum album

Вератрум албум **Veratrum-album**

White Hellebore.

Перфектна картина на колапс — с крайна студенина, посиняване и слабост.

Следоперативен шок — студена пот на челото, бледо лице, бърз, слаб пулс. Студена пот на челото — при почти всички оплаквания. Повръщане, прочистване и крампи в крайниците. Силно, непрекъснато повръщане — най-характерният симптом.

Хирургичен шок. Крайна сухота на всички лигавици. „Копрофагия“. Виолентна мания, редуваща се с мълчание и отказ да говори.

Ум.

Меланхолия — със ступор и мания. Седи вцепенен; не забелязва нищо; мрачно безразличие. Пристъпи на ярост; крещи, ругае. Пуерпериална мания. Безцелно скитане. Илюзии за предстоящи нещастия. Мания — с желание да реже и къса предмети. Пристъпи на болка — с делириум, водещ до лудост. Ругае и вие цяла нощ.

Глава.

Събрани, напрегнати черти. Студена пот на челото. Усещане за буца лед на темето. Главоболие — с гадене, повръщане, диария, бледо лице. Вратът — твърде слаб, за да държи главата.

Очи.

Тъмни кръгове. Втречени, обърнати нагоре, без блясък. Сълзене и зачервяване. Клепачите — сухи, тежки.

Лице.

Хлътнали черти. Ледена студенина на върха на носа и лицето. Носът — заострен. Теглещи болки в бузите, слепоочията и очите. Лицето — много бледо, синкаво, колабирало, студено.

Уста.

Език — блед, студен; усещане за хлад като от ментол. Сух в центъра — не се облекчава от вода. Солена слюнка. Зъбобол — зъбите тежат като оловни.

Стомах.

Вълчи апетит. Жажда за студена вода — повръща я веднага. Отвращение към топла храна. Хълцане. Обилно повръщане и гадене — по-лошо от пиене и най-малко движение. Желание за плодове, сочни и студени неща, лед, сол. Тревога в епигастриума. Голяма слабост след повръщане. Гастрална раздразнимост — с хронично повръщане на храна.

Корем.

Усещане за пропадане и празнота. Студено усещане в стомаха и корема. Болка преди изхождане. Крампи — свиват корема и краката. Усещане сякаш херния ще излезе. Коремът — чувствителен, подут, с ужасни колики.

Ректум.

Констипация — от инертност на ректума, с топлина и главоболие. Констипация при бебета и при много студено време. Изпражнения — големи, със силно напъване до изтощение, със студена пот. Диария — много болезнена, водниста, обилна, изхвърляна със сила, последвана от колапс. Типични изхождания при cholera morbus и истинска холера — когато повръщането съпътства прочистването.

Дихателни органи.

Глас — дрезгав, слаб. Хрипове в гърдите. Много слюз в бронхите — не може да се откашля. Груби хрипове. Хроничен бронхит при възрастни. Силна, лаеща, стомашна кашлица — последвана от оригване; по-лошо в топла стая. Кухо звучаща кашлица — с гъдел ниско долу, със синьо лице. Кашлица от пиене, особено студена вода; изпускане на урина при кашляне. Кашлица при влизане в топла стая от студен въздух.

Сърце.

Палпитации — с тревога и бързо, шумно дишане. Пулс — неправилен, слаб. „Тютюнево сърце“ от дъвчане на тютюн. Интермитентно действие на сърцето при слаби хора с чернодробна конгестия. Едно от най-добрите сърдечни стимуланти в хомеопатични дози.

Женски.

Мензис — твърде ранен, обилен, изтощителен. Дисменорея — със студенина, прочистване, студена пот. Припада от най-малко усилие. Сексуална мания преди мензис.

Крайници.

Болезненост и чувствителност на ставите. Ишиас — болки като електрически удари. Крампи в прасците. Невралгия в брахиалния плексус; ръцете — подути, студени, паралитични.

Кожа.

Синя, студена, влажна, нееластична — студена като смърт. Студена пот. Сбръчкване на кожата на ръцете и краката.

Треска.

Втрисане — с крайна студенина и жажда.

Модалности.

По-лошо: нощем; влажно, студено време. По-добре: ходене; топлина.

Връзки.

Veratrinum — електрически болки, мускулни шокове, фибрилерни потрепвания.
Cholos terrepina — крампи в прасците. **Camph, Cupr, Ars, Cupr-ars** — интермитентна, студена, лепкава пот. **Narcissus poeticus** — гастроентерит с коликообразни болки, припадък, треперене, студени крайници. **Trychosanthes** — диария, болка в черния дроб, световъртеж след всяко изхождане. **Agaric emetic** — световъртеж; желание за ледена вода; парене в стомаха. **Agaric phalloides** — холера, крампи, студени крайници, задържане на урина. **Veratrine** — повишено съдово напрежение; стимулира елиминацията на токсини.

Доза.

1С до 30С. При диария — не под 6С.

Veratrum viride

Вератрум вириде **Veratrum-viride**

White American Hellebore.

Пароксизми на предсърдно мъждене. Предизвиква спад на систоличното и диастоличното налягане. Конгестии — особено към белите дробове и основата на мозъка — с гадене и повръщане. Потрепвания и конвулсии. Подходящо за пълнокръвни, плеторични пациенти. Голяма прострация. Ревматизъм на сърцето. Подуто, ливидно лице. Бясно делириум. Ефекти от слънчев удар. Езофагит. Повишава опсоничния индекс срещу *diplococcus pneumoniae* (70–109%). Конгестивен стадий и ранни прояви на хепатизация при пневмония. Зигзагообразна температура. Клинично — симптоматика, подобна на Tiegel's contracture, Thompson's disease, athetosis, pseudo-hypertrophic muscular paralysis.

Ум.

Кавгаджийски. Делириозен.

Глава.

Интензивна конгестия — почти апоплектична. Гореща глава, кръвясали очи. Подуто, ливидно лице. Хипократическо лице. Главата — отметната назад; зениците — разширени; двойно виждане. Менингит. Болка от тила; не може да държи главата. Слънчев удар — глава пълна, пулсиращи артерии. Лицето — зачервено. Конвулсивно потрепване на лицевите мускули. Вертиго с гадене.

Език.

Бял или жълт — с червена линия по средата. Усеща се опарен. Повишено слюноотделяне.

Стомах.

Жажда. Гадене и повръщане. И най-малкото количество храна или течност се връща веднага. Стягаща болка — по-лошо от топли напитки. Хълцане — прекомерно, болезнено, със спазми на хранопровода. Парене в стомаха и хранопровода.

Корем.

Болка над таза — с болезненост.

Дихателни органи.

Конгестия на белите дробове. Затруднено дишане. Усещане за тежък товар върху гърдите. Пневмония — с прималвяване в стомаха и силна конгестия. Круп. Менструална колика преди появата на мензиса — със странгурия.

Урина.

Оскъдна — с мътен седимент.

Женски.

Ригиден ос. Пуерпериална треска. Супресия на мензиса — с конгестия към главата. Менструална колика преди появата на мензиса — със странгурия.

Сърце.

Пулс — бавен, мек, слаб, неправилен, интермитентен. Бърз пулс — с ниско напрежение. Постоянна тъпа, пареща болка в областта на сърцето. Клапни заболявания. Пулсации по цялото тяло — особено в дясното бедро.

Крайници.

Болка в тила и раменете. Силни болки в стави и мускули. Виолентни електрически шокове в крайниците. Конвулсивни потрепвания. Остър ревматизъм. Треска.

Кожа.

Еризипел — с мозъчни симптоми. Еритема. Сърбеж на различни места. Горещо изпотяване.

Треска.

Хипертермия вечер; хипотермия сутрин. Гнойни трески — с големи температурни вариации.

Връзки.

Сравни: **Gels, Bapt, Bell, Acon, Ferr-phos.** Антидот: **Strychnin** — fluid extract, 20–40 капки.

Доза.

1C до 6C.

Verbascum thapsus

Вербаскум тапсус **Verbascum-thapsus**

Mullein.

Изразено действие върху долночелюстния клон на V-ти черепномозъчен нерв; върху ухото; дихателните пътища и пикочния мехур. Катари и настинки — с периодична прозопалгия. Успокоява нервно, бронхиално и уринарно дразнене и кашлица.

Лице.

Невралгия — засягаща зигомата, темпоромандибуларната става и ухото, особено вляво — със сълзене, кориза и усещане сякаш частите са смачкани с щипци. Говорене, кихане, промяна на температурата — влошават болките. Също и стискане на зъбите. Болките идват на „флашове“, провокирани от най-малко движение, и се появяват периодично — по едно и също време сутрин и следобед.

Уши.

Оталгия — с усещане за запушване. Глухота. Сух, лющещ се външен слухов проход (локално приложение).

Корем.

Болката се разпространява надолу — причинява контракция на сфинктер ани.

Ректум.

Многократни изхождания дневно — с усукване около пъпа. Хемороиди — с затруднено, втвърдено изхождане. Възпалени и болезнени хемороиди.

Дихателни органи.

Дрезгав глас; дълбок, груб — „като тромпет“, basso profundo. Кашлица — по-лошо нощем. Астма. Болезненост в фаринкса; кашлица по време на сън.

Урина.

Постоянно капене. Енуреза. Парене при уриниране. Увеличено уриниране — с натиск в мехура.

Крайници.

Крамповидна болка в стъпалата, дясното ходило и коляното. Долните крайници — тежки. Палецът — изтръпнал. Невралгична болка в левия глезен. Скованост и болезненост в ставите на долните крайници.

Модалности.

По-лошо: промяна на температурата; говорене; кихане; силно захващане (долен дентален нерв); от 9:00 до 16:00.

Връзки.

Сравни: **Rhus-arom**, **Caust**, **Platin**, **Sphingurus** (болка в зигомата).

Доза.

Mullein oil — локално при оталгия и сух, лющещ се слухов проход; също при дразнеща кашлица нощем или в легнало положение. Вътрешно — тинктура и ниски потенции. При енуреза — пет капки сутрин и вечер.

Vespa crabro

Веспа крабро **Vespa-crabro**

Live Wasp.

Изразени кожни и женски симптоми. Усещане за индурация. Вазомоторни симптоми на кожа и лигавици.

Замайване — по-добре в легнало положение по гръб. Припадък. Изтръпване и слепота. Гадене и повръщане — последвани от пълзящи студени тръпки, започващи от ходилата нагоре. Крампи в червата. Подпухнали аксиларни жлези — с болезненост в горните крайници. Потене на страната, върху която лежи — със сърбеж.

Лице.

Болезнено и подуто. Еризипелозно възпаление на клепачите. Хемоза на конюнктивата. Подуване на устата и гърлото — с виолентни парещи болки.

Урина.

Парене при уриниране. Сърбеж при уриниране.

Женски.

Мензис — предшестван от депресия, болка, натиск и констипация. Левият яйчник — силно засегнат: често парене, често уриниране; сакрални болки, излъчващи нагоре по гърба. Ерозия около външния ос.

Кожа.

Еритема; силен сърбеж; парене. Фурункули — с ужилваща болка и болезненост; облекчават се от измиване с оцет. Копривна треска, макули и отоци — с парене, ужилване и болезненост. Erythema multiforme — облекчава се от измиване с оцет.

Връзки.

Сравни: **Scorpio** (саливация; страбизъм; тетанус); **Apis**.

Антидот: **Sempervivum tectorum** — локално.

Доза.

3C до 30C.

Viburnum opulus

Вибурум опулус **Viburnum-opulus**

High Cranberry.

Общо средство за крампи. Коликообразни болки в тазовите органи.

Свърхсъзнателност за вътрешните полови органи. Женските симптоми — най-важни. Често предотвратява аборт. Фалшиви родилни болки. Спазматични и конгестивни състояния с яйчников или маточен произход.

Глава.

Раздразнителност. Вертиго — усеща се сякаш пада напред. Силна болка в темпоралната област. Болезненост в очните ябълки.

Стомах.

Постоянно гадене — облекчава се от хранене. Липса на апетит.

Корем.

Внезапни крампи и коликообразни болки. Чувствителност към натиск около пъпа.

Женски.

Мензис — закъсняващ, оскъден, трае само няколко часа, зловонен, с крампи; крампитите слизат по бедрата. Преди мензиса — силни „bearing-down“ болки. Яйчниковата област — тежка, конгестирана. Болки в сакрума и пубиса — с болка в предните бедрени мускули. Спазматична и мембранозна дисменорея. Левкореея — разяждаща. Парене и сърбеж на гениталиите. Прималява при опит да седне. Чести и много ранни аборти — създава привидна стерилност. Болки от гърба към кръста и матката — по-лошо рано сутрин.

Урина.

Чести позиви. Обилна, бледа, светла урина. Не може да задържи урината при кашляне или ходене.

Ректум.

Изпражнения — големи и твърди, с режеща болка в ректума и болезнен анус.

Крайници.

Скованост и болезненост в тила. Усещане сякаш гърбът ще се пречупи. Сакрална болка. Долните крайници — слаби и тежки.

Модалности.

По-лошо: лежане на засегнатата страна; топла стая; вечер и нощ. По-добре: на открит въздух; покой.

Връзки.

Сравни: **Viburnum prunifolium** — навик за аборти; следродилни болки; упорито хълцане; маточен тоник; сутрешно гадене; менструални нарушения при стерилни жени с маточни дислокации. **Cimicif, Cauloph, Sep, Xanthox.**

Доза.

Тинктура и ниски потенции.

Vinca minor

Винка минор **Vinca-minor**

Lesser Periwinkle.

Средство за кожни заболявания, екзема и особено *plica polonica*; също при хеморагии и дифтерия.

Глава.

Теглеща болка на върха на главата. Шумене и свирене в ушите. Въртоглавие — с премигване пред очите. Петна по скалпа — отделящи влага, слепващи косата. Разяждащ сърбеж на скалпа. Огнени петна без коса. *Plica polonica*. Неудържимо желание за чесане.

Нос.

Върхът на носа лесно се зачервява. Влажен обрив на септума. Запушване на едната ноздра. Рани в носа. Себорея на горната устна и основата на носа.

Гърло.

Трудно преглъщане. Язви. Често прочистване на гърлото. Дифтерия.

Женски.

Прекомерна менструация — с голяма слабост. Пасивни маточни хеморагии. Менорагия — непрекъснато течение, особено в климактериума. Хеморагии от фиброиди.

Кожа.

Разяждащ сърбеж. Голяма чувствителност на кожата — зачервяване и болезненост от леко триене. Екзема на глава и лице — пустули, сърбеж, парене, зловонна миризма. Косата — слепена.

Връзки.

Сравни: **Oleand, Staph.**

Доза.

1С до 3С.

Viola odorata

Виола одората **Viola-odorata**

Violet.

Специфично действие върху ухото. Засяга особено тъмнокоси пациенти; супраорбиталната и орбиталната област; ревматизъм в горната част на тялото — особено вдясно. Глистни състояния при деца. Локално — при болка от маточни фиброиди. Също при ухапвания от змии и ужилвания от пчели. Напрежението се разпространява към горната половина на лицето и ушите.

Глава.

Парене на челото. Вертиго — всичко в главата се върти. Тежест в главата — със слабост в мускулите на тила. Скалпът — напрегнат; трябва да свива веждите. Склонност към болка точно над веждите. Пулсации под окото и слепоочието. Главоболие през челото. Действа върху фронталните синуси. Хистерични пристъпи при туберкулозни пациенти.

Очи.

Тежест на клепачите. Очната ябълка — усеща се притисната. Пламъци пред очите. Миопия. Хориоидит. Зрителни илюзии — огнени, змиевидни кръгове.

Уши.

Стрелкащи болки. Отвращение към музика. Бучене и гъделичкане. Дълбоки пробождания под ушите. Глухота; оторея. Ушни заболявания — с болка в очните ябълки.

Дихателни органи.

Торпор на върха на носа — сякаш от удар. Суха, кратка, спазматична кашлица и диспнея — по-лошо през деня. Определена тежест в гърдите. Коклюш — с дрезгавост. Диспнея по време на бременност. Затруднено дишане, тревога и палпитации — с хистерия.

Крайници.

Ревматизъм на делтоидния мускул. Треперене на крайниците. Притискаща болка в дясната карпална и метакарпална става. (Сравни Ulmus.)

Урина.

Млечна урина — със силна миризма. Енуреза при нервни деца.

Модалности.

По-лошо: студен въздух.

Връзки.

Сравни: **Ulmus** — мравучкане в ходилата; изтръпване; пълзяща болка в краката; ревматични болки над китките; изтръпване и болезненост в областта на ахилеса.

Chenopodium — уши; серозен или кървав излив в лабиринта; хроничен отит; прогресивна глухота за глас, но чувствителност към външни шумове; липсваща костна проводимост; по-добър слух за високи тонове. **Aur, Puls, Sep, Ign, Cina, Cauloph** — при ревматизъм на малките стави.

Доза.

1C до 6C.

Viola tricolor

Виола триколор **Viola-tricolor**

Pansy.

Основни приложения: екзема в детска възраст и нощни емисии, придружени от много ярки сънища.

Глава.

Тежка, притискаща навън болка. Екзема на скалпа — с подути жлези. Лицето — горещо и изпотено след хранене.

Гърло.

Много храчки — принуждават към прочистване; по-лошо на въздух. Трудно преглъщане.

Урина.

Обилна. Неприятна, „катешка“ миризма.

Мъжки.

Подуване на препуциума. Парене в гланса. Сърбеж. Неволни семенни емисии при изхождане.

Кожа.

Импетиго. Нетърпим сърбеж. Обриви — особено по лицето и главата — с парене и сърбеж; по-лошо нощем. Дебели крусти — напукват се и отделят лепкав, жълт секрет. *Eczema impetiginoides* на лицето. Сикоза.

Модалности.

По-лошо: зимата; 11:00. Сравни: **Lycor**.

Връзки.

Сравни: **Rhus, Calc, Sepia**.

Доза.

Ниски потенции.

Vipera berus

Випера берус **Vipera-berus**

The German Viper.

Отравянето с отрова от усойница причинява временно усилване на рефлексите, последвано от пареза; развива се параплегия на долните крайници, изкачваща се нагоре — подобно на остра възходяща парализа на Landry. Специално действие върху бъбреците — предизвиква хематурия. Сърдечна воднянка.

Показано при възпаление на вените — с голямо подуване и усещане за „пръсване“. Уголемен черен дроб. Оплаквания в менопаузата. Оток на глотиса. Поли-неврит, полиомиелит.

Лице.

Силно подуто. Устни и език — подути, ливидни, изпъкнали. Език — сух, кафяв, черен. Говорът — затруднен.

Черен дроб.

Силна болка в уголемения черен дроб — с жълтеница и треска; излъчва към рамото и хълбока.

Крайници.

Пациентът е принуден да държи крайниците повдигнати. Когато бъдат спуснати надолу — усещане сякаш ще се пръснат; болката е непоносима. Варикозни вени и

остра флебит. Вените — подути, чувствителни; болка като от разкъсване. Силни крампи в долните крайници.

Кожа.

Ливидна. Кожата се лющи на големи пластове. Лимфангиом. Фурункули, карбункули — с усещане за пръсване; облекчават се при повдигане на засегнатата част.

Връзки.

Pelivus berus — Adder: прострация, припадък, слаб пулс, жълта кожа, болка около пъпа; подуване на ръката, езика, дясното око; световъртеж, нервност, слабост, притискане в гърдите, невъзможност за дълбоко дишане; болки и скованост в крайниците; колапс; силна жажда. **Eel serum** — сърдечни и бъбречни заболявания; декомпенсация и предстояща асистолия.

Доза.

12C.

Viscum album

Вискум албум **Viscum-album**

Mistletoe.

Понижава кръвното налягане. Разширява кръвоносните съдове, но не действа върху центрове в продълговатия мозък. Пулсът е бавен — поради централно дразнене на вагуса.

Симптомите насочват към ревматични и подагрозни оплаквания; невралгия, особено ишиас. Епилепсия, хорея, метророгия. Ревматична глухота. Астма. Спинални болки — с маточен произход. Ревматизъм с теглещи болки. Хипертензивна албуминурия. Клапни заболявания — с нарушения в сексуалната сфера. Симптоми като епилептична аура и *petit mal*.

Глава.

Усещане сякаш целият свод на черепа се повдига. Син пръстен около очите. Двойно виждане. Бучене и усещане за запушване в ухото. Глухота от настинка. Лицевите мускули — в постоянна агитация. Упорито вертиго.

Дихателни органи.

Диспнея; усещане за задушаване при лежане на лявата страна. Спазматична кашлица. Астма — когато е свързана с подагра или ревматизъм. Шумно, стенторозно дишане.

Женски.

Хеморагия — с болка; кръвта частично съсиреци, яркочервена. Климактерични оплаквания. Болка от сакрума към таза — с теглещи, стрелкащи болки отгоре надолу. Задържана плацента. Хроничен ендометрит. Метророгия. Оварна болка — особено вляво.

Сърце.

Хипертрофия — с клапна недостатъчност; пулс малък и слаб; не може да лежи по гръб. Палпитации по време на коитус. Ниско напрежение. Декомпенсация; диспнея — по-лошо при лежане на лявата страна. Тежест и притискане в сърцето — сякаш ръка го стиска. Гъделичкащо усещане около сърцето.

Крайници.

Болките се редуват между коляно и глезен, рамо и лакът. Ишиас. Теглещи, стрелкащи болки в бедрата и горните крайници. Топлинна вълна — издига се от краката към главата; усеща се „в огън“. Периодични болки от сакрума към таза — по-лошо в леглото — с болки към бедрата и горните крайници. Общ тремор — сякаш всички мускули са във фибрилерна контракция. Отоци на крайниците. Усещане за паяк, пълзящ по ръката или ходилото. Сърбеж по цялото тяло. Притискаща болка в ходилата.

Модалности.

По-лошо: зима; студено, бурно време; в леглото; движение; лежане на лявата страна.

Връзки.

Сравни: **Secale, Convallaria, Bryonia, Pulsatilla, Rhododendron, Guiprasine** — активен принцип, усилва хипотензивните свойства на *Viscum*. **Hedera helix** — вътречерепно налягане.

Доза.

Тинктура и ниски потенции.

Wyethia helenoides

Уйетия хеленоидес **Wyethia-helenoides**

Poison-weed.

Изразено действие върху гърлото. Отлично средство при фарингит — особено фоликуларен. Дразними гърла на певци и оратори. Полезно и при хемороиди. Симптоми на сenna хрема; сърбеж в задните хоани.

Глава.

Нервен, неспокоен, депресивен. Замайване. Прилив на кръв към главата. Остра болка във фронталната област.

Уста.

Усещане сякаш е опарена. Усещане за топлина надолу по хранопровода. Сърбеж на небцето.

Гърло.

Постоянно прочистване и покашляне. Сухи задни хоани; без облекчение от прочистване. Гърлото — усеща се подуто. Епиглотисът — сух, парещ. Трудно преглъщане. Постоянно желание да преглъща слюнката. Увулата — усеща се удължена.

Стомах.

Усещане за тежест. Оригване на въздух, редуващо се с хълцане. Гадене и повръщане.

Корем.

Болка под ребрата вдясно.

Изпражнения.

Редки, тъмни, нощем. Сърбеж на ануса. Констипация — с хемороиди; без кръвене.

Дихателни органи.

Суха, дразнеща кашлица — от гъдел в епиглотиса. Парене в бронхиалните тръби. Склонност към пресипване при говорене или пеење; гърлото — горещо, сухо. Суха астма.

Женски.

Болка в левия яйчник — стрелка надолу към коляното. Болка в матката; може да очертае контура ѝ.

Крайници.

Болка в гърба — излъчва към края на гръбначния стълб. Болка в дясната ръка; скованост на китката и дланта. Теглещи болки по цялото тяло.

Треска.

Втрисане в 11:00. Жажда за ледена вода по време на втрисането. Без жажда при топлина. Обилно изпотяване цяла нощ. Ужасно главоболие по време на изпотяването.

Връзки.

Сравни: **Arum, Sang, Lach.**

Доза.

1C до 6C.

X-Ray

Екс-рей X-Ray

Vial containing alcohol exposed to X-Ray.

Повтарящото се излагане на рентгенови лъчи причинява кожни лезии, често последвани от карцином. Мъчителни болки. Половите жлези — особено засегнати: атрофия на яйчници и тестиси. Стерилитет. Промени в кръвта, лимфната система и костния мозък. Анемия и левкемия. Отговаря на упорити, „като изгаряне“ лезии, които отказват да заздравеят. Псориазис.

Има свойството да стимулира клетъчния метаболизъм. Събужда реактивната виталност — психическа и физическа. Изкарва на повърхността потиснати симптоми — особено сикотични и от смесени инфекции. Действието е центробежно — към периферията.

Глава.

Пронизващи болки в различни части на главата и лицето. Тъпа болка в дясната горна челюст. Скован врат. Внезапни „заклещвания“ във врата; болките по-силни зад ушите. Болка в мускулите на врата при повдигане на главата от възглавницата. Пълнота в ушите; звън в главата.

Уста.

Език — сух, грапав, болезнен. Гърлото — болезнено при преглъщане. Гадене.

Мъжки.

Развратни сънища. Половото желание — изгубено. Възстановява потиснатата гонорея.

Крайници.

Ревматични болки. Общо чувство на умора и болестност. Длани — груби, лющещи се.

Кожа.

Суха, сърбяща екзема. Еритема около корените на ноктите. Кожата — суха, набръчкана. Болезнени цепнатини. Брадавични израстъци. Ноктите — удебелени. Псориазис.

Модалности.

По-лошо: в леглото; следобед; вечер и нощ; на открито.

Доза.

12С и по-високи.

Връзки.

Electricitas — захарно мляко, наситено с електрически ток: тревожност, нервни тремори, неспокойствие, палпитации, главоболия; страх от гръмотевични бури; тежест в крайниците. **Magnetis Poli Ambo** — магнит, цялата маса: парещи ланциниращи болки; усещане за счупване в ставите; стрелкащи и подскачащи болки; главоболие „сякаш пирон е забит“; склонност старите рани да кървят отново. **Magnetis Polus Arcticus** — северен полюс: нарушен сън, сомнамбулизъм, пукане в шийни прешлени, усещане за студ; зъбобол. **Magnetis Polus Australis** — южен полюс: силна болка във вътрешната страна на нокътя на палеца на крака; вратнал нокът; лесно изкълчване на ставите на ходилото; болка при спускане на краката надолу.

Xanthoxylum fraxineum

Ксантофилум фраксинеум **Xanthoxylum-fraxineum**

Prickly Ash.

Специфично действие върху нервната система и лигавиците. Парализа — особено хемиплегия. Болезнени хеморагии, следродилни болки, невралгична дисменорея, ревматични състояния — особено при слаби, нервни, деликатни пациенти. Лошо храносмилане от преяждане или прекомерни течности. Бавна капилярна циркулация. Неврастения, лоша асимилация, безсъние, тилно главоболие. Увеличава мукозната секреция в устата и стимулира всички жлези, чиито канали се отварят в устната кухина.

Ум.

Нервен, изплашен. Психична депресия.

Глава.

Усеща се пълна. Тежест и болка на върха на главата. Болка над очите; пулсиращ натиск над носа; натиск във фронталната област. Главата — сякаш разделена. Шум в ушите. Тилно главоболие. „Сик“ главоболие — с вертиго и газове.

Лице.

Невралгия на долната челюст. Сухота в устата и фаринкса. Фарингит.

Корем.

Грипиране и диария. Дизентерия — с тимпанизъм, тенезми; безмирисни изхождания.

Женски.

Мензис — твърде ранен и болезнен. Оварна невралгия — с болка в кръста и долната част на корема; по-лошо вляво; излъчва по бедрото по генито-круралните нерви. Невралгична дисменорея — с невралгични главоболия; болка в гърба и надолу по краката. Мензис — гъст, почти черен. Следродилни болки. Левкорей по време на мензиса. Неврастенични, слаби, изтощени пациенти — с лоша асимилация, безсъние и тилно главоболие.

Дихателни органи.

Афония. Постоянно желание да поеме дълбоко въздух; тежест в гърдите. Суха кашлица — ден и нощ.

Крайници.

Парализа на лявата страна — след спинални нарушения. Изтръпване на лявата страна; нарушени двигателни нерви. Хемиплегия. Болка в тила — излъчва надолу по гърба. Ишиас — по-лошо в горещо време. Предна крурална невралгия. Лявата ръка — изтръпнала. Невралгични стрелкащи болки — като от електричество — по целия крайник.

Сън.

Труден, неосвежаващ. Сънища за летене. Безсъние при неврастеници.

Връзки.

Сравни: **Gnaph, Cimicif, Staph, Mezer. Piscidia** — нервен седатив; безсъние от тревога, нервна възбуда, спазматична кашлица; болки при нередовна менструация; регулира

менструалния поток; невралгични и спазматични състояния; използва се тинктура в материални дози.

Доза.

1C до 6C.

Xerophyllum

Ксерофилум **Xerophyllum**

Tamalpais Lily, Basket Grass Flower.

Трябва да бъде лечебно при екзематозни състояния, *poison-oak*, ранни тифозни състояния и др.

Ум.

Отпаднал, не може да се концентрира за учене. Забравя имена. Пише последните букви на думите първи. Греша в правописа на обикновени думи.

Глава.

Усеща се пълна, запушена. Болка през челото и над очите. Силен натиск в корена на носа. Обърканост. Загуба на съзнание. Пулсиращо главоболие.

Очи.

Болезнени — сякаш със ситен пясък; парене. Трудно фокусиране при близка работа. Очите — болезнени, парещи.

Нос.

Запушен. Стягане в основата на носа. Остър назален катар.

Лице.

Подуто сутрин. Торбички под очите.

Гърло.

Пронизваща болка при преглъщане.

Стомах.

Усеща се пълен и тежък. Кисели, неприятни оригвания — един час след обяд и вечеря. Повръщане в 14:00.

Корем.

Чревни газове. Сутрин — къркорене в червата с желание за изхождане.

Ректум.

Констипация — изпражнения твърди, на малки топчета. Трудни, меки изпражнения — с много напъване. Много газове. Теглеща болка в ректума.

Урина.

Трудно задържане; капене при ходене. Често уриниране нощем.

Женски.

Теглещо усещане надолу. Вулвата — възпалена, с яростен сърбеж. Повишено сексуално желание — с овариални и маточни болки и левкорей.

Дихателни органи.

Задни хоани — сурови; гъст, жълт секрет. Кихане. Трахеята — болезнена; усещане за стегнати „буци“.

Гръб.

Усеща се горещ от сакрума до лопатките. Болка в гръба — излъчва надолу по краката. Болка над бъбреците. Дълбока топлина в гръбначния стълб.

Крайници.

Мускулна скованост, треперене. Болка в коленете. Крайниците — сковани.

Кожа.

Еритема — с мехури и силен сърбеж, ужилване и парене. Мехури, малки възелчета. Кожата — груба, напукана; усеща се като кожа. Дерматит — особено около коленете. Възпаление, наподобяващо *poison-oak*. Подуване на ингвиналните жлези и зад коляното.

Модалности.

По-лошо: студена вода; следобед и вечер. По-добре: гореща вода; сутрин; движение на засегнатата част.

Връзки.

Сравни: **Rhus, Anacard, Grindelia.**

Доза.

6C или по-високи.

Yohimbinum

Йохимбинум **Yohimbinum**

Coryanthe Yohimbe.

Възбужда половите органи и действа върху централната нервна система и дихателния център. Афродизиак в физиологични дози, но противопоказан при всички остри и хронични възпаления на коремните органи. Хомеопатично — полезен при конгестивни състояния на половите органи. Причинява хиперемия на млечните жлези и стимулира лактацията. Менорагия.

Глава.

Агитация — с „лелящи“ вълни топлина по лицето. Неприятен, металически вкус. Обилна саливация. Гадене и оригване.

Полови органи.

Силни и продължителни ерекции. Неврастенична импотентност. Кървящи хемороиди. Чревна хеморагия. Уретрит.

Треска.

Втрисане; интензивна топлина; вълни от топлина и студенина; склонност към изпотяване.

Сън.

Безсъние. Мисли за събития от целия минал живот го държат буден.

Доза.

Като сексуален стимулант — 10 капки от 1% разтвор или хиподермални таблетки 0.005 g. Хомеопатична доза — 3C.

Yucca filamentosa

Юка филаментоза **Yucca-filamentosa**

Bear-grass.

Т.нар. „билиозни“ симптоми — с главоболие. Унило настроение и раздразнителност.

Глава.

Боли сякаш върхът на главата ще „отлети“. Артериите на челото пулсират. Носът — зачервен.

Лице.

Жълто. Език — жълт, обложен, отпечатва зъбите.

Уста.

Вкус на развалени яйца.

Гърло.

Усещане сякаш нещо виси от задните хоани; не може нито да го изкашля, нито да го преглътне.

Корем.

Дълбока болка вдясно над черния дроб — излъчва през гърба. Изпражнения — жълтеникаво-кафяви, с жлъчка.

Мъжки.

Парене и подуване на препуциума — с зачервяване на меатуса. Гонорея.

Кожа.

Еритематозно зачервяване.

Доза.

Тинктура до 3С.

Zincum metallicum

Цинк металикум **Zincum-metallicum**

Zinc.

Патогенезата показва **церебрална депресия**. Думата „**fag**“ обхваща голяма част от действието на цинка. Тъканите се износват по-бързо, отколкото се възстановяват.

Отравяне от **потиснати обриви или секрети**. Нервните симптоми — най-важни. Ниска виталност. Предстояща мозъчна парализа. Период на депресия в хода на болестите. Спинални заболявания. Потрепвания. Болки „сякаш между кожата и месото“. Голямо облекчение след появата на секрети. Хорея — от уплаха или потиснат обрив. Конвулсии — с бледо лице и без топлина. Изразена анемия с дълбока прострация. Намалява броя и разрушава еритроцитите. Реперкусирани екзантеми. При хронични заболявания с мозъчни и спинални симптоми — треперене, конвулсивни потрепвания и **неспокойни крака** са водещи симптоми.

Ум.

Слаба памет. Много чувствителен към шум. Отвращение към работа, към говорене. Детето повтаря всичко, което му се казва. Страх от арест за въображаемо престъпление. Меланхолия. Летаргичен, глупав. Пареза.

Глава.

Усеща, че ще падне наляво. Главоболие от най-малкото количество вино. Хидроцефал. Търкаля глава отстрани. Забива глава във възглавницата. Тилна болка — с тежест на върха. Автоматични движения на глава и ръце. „Brain-fag“; главоболия на претоварени ученици. Чело — студено; основата на мозъка — гореща. Бучене в главата. Подскача от уплаха.

Очи.

Птериgium; парене, сълзене, сърбеж. Натиск — сякаш очите се притискат навътре. Сърбеж и болезненост на клепачите и вътрешните ъгли. Птоза. Търкаляне на очите. Замъгляване на половината зрение — по-лошо от стимуланти. Кривогледство. Амавроза — със силно главоболие. Конюнктивата — зачервена, възпалена; по-лошо във вътрешния кантус.

Уши.

Теглещи болки, пробождания, външно подуване. Зловонен гноен секрет.

Нос.

Болезненост високо вътре; натиск в корена.

Лице.

Бледи устни; напукани ъгли на устата. Зачервяване и сърбящ обрив по брадичката. Теглещи болки в лицевите кости.

Уста.

Разклатени зъби. Кървящи венци. Скърцане със зъби. Кървав вкус. Мехури по езика. Трудно никнене на зъби — детето е слабо, със студени и неспокойни крака.

Гърло.

Сухо; постоянно желание да изкашля лепкава слуз. Суровост и сухота в гърлото и ларинкса. Болка в мускулите на гърлото при преглъщане.

Стомах.

Хълцане, гадене, повръщане на горчива слуз. Парене в стомаха; киселини от сладки неща. Не понася и най-малкото количество вино. Вълчи глад около 11:00. Голяма лакомия — не може да яде достатъчно бързо. Атонична диспепсия — усещане сякаш стомахът е „свил се“.

Корем.

Болка след лека храна — с тимпанизъм. Болка под пъпа. Къркорене и грипиране; подут. Газова колика — с ретракция на корема. Уголемен, индуратиран, болезнен черен дроб. Рефлексни симптоми от „плаващ“ бъбрек. Грипиране след хранене.

Урина.

Може да уринира само седнал и облегнат назад. Хистерична ретенция. Неволно уриниране при ходене, кашляне или кихане.

Ректум.

Твърди, малки, запечени изпражнения. Cholera infantum — с тенезми; зелени, мукозни изхождания. Внезапно спиране на диарията — последвано от мозъчни симптоми.

Мъжки.

Тестисите — подути, издърпани нагоре. Силни ерекции. Емисии — с хипохондрия. Окапване на космите (пубис). Издърпване на тестисите към семенната връв.

Женски.

Оварна болка — особено вляво; не може да стои спокойно. Нимфомания при родилки. Мензис — закъсняващ, потиснат; лохиите — потиснати. Гърдите — болезнени. Зърната — болезнени. Мензис — по-силен нощем. Всички женски симптоми — с неспокойство, депресия, студенина, спинална болезненост и **неспокойни крака**. Суха кашлица преди и по време на мензиса.

Дихателни органи.

Парещ натиск под стернума. Стягане и режещи болки в гърдите. Дрезгавост. Отслабваща, спазматична кашлица — по-лошо от сладко. Детето хваща гениталиите при кашлица. Астматичен бронхит — със стягане. Диспнея — по-добре веднага щом се появи експекторация.

Гръб.

Болка в кръста. Не понася да го докосват. Напрежение и ужилване между лопатките. Спинална иритация. Тъпа болка около последния гръден или първия лумбален прешлен — по-лошо седнал. Парене по гръбнака. Тилът — уморен от писане или усилие. Теглещи болки в лопатките.

Крайници.

Куцост, слабост, треперене и потрепвания на различни мускули. Измръзвания. Краката — в непрекъснато движение; не може да ги задържи. Големи варикозни вени на краката. Потливи. Конвулсии — с бледо лице. Трансверзални болки — особено в горните крайници. Ходилата — чувствителни. Стъпва с цялата подметка.

Сън.

Вика по време на сън; тялото подскача; буди се уплашен, втрещен. Нервно движение на краката по време на сън. Силни нощни викове — без да знае. Сомнамбулизъм.

Кожа.

Варикозни вени — особено на долните крайници. Мравучкане на краката — сякаш буболечки пълзят; пречи на съня. Екзема — особено при анемични и невротични. Сърбеж на бедрата и подколнените ямки. Ретроцесия на обриви.

Треска.

Чести фебрилни тръпки по гърба. Студени крайници. Нощно изпотяване. Обилна пот по краката.

Модалности.

По-лошо: по време на мензиса; от допир; 17:00–19:00; след вечеря; от вино. По-добре: докато яде; от секрети; при появата на обриви.

Връзки.

Сравни: **Agaric, Ign, Plumb, Argent, Puls, Helleb, Tuberc**. Несъвместими: **Nux, Cham**. Сравни при облекчение от секрети: **Lach, Stan, Mosch**.

Разширени форми: **Zincum aceticum** — нощно бдение; еритипел; мозъкът — болезнен; разтвор на Радемахер. **Zincum bromatum** — дентиция, хорея, хидроцефал. **Zincum**

oxydatum — гадене, кисел вкус; внезапно повръщане при деца; воднисти изпражнения; слабост след грип. **Zincum sulph** — високи потенции; помага при помътняване на роговицата. **Zincum cyanatum** — менингит, цереброспинален менингит, паркинсон, хорея, хистерия. **Zincum ars** — хорея, анемия, изтощение при малко усилие; депресия; слабост на долните крайници. **Zincum carb** — пост-гонорейни гърлени оплаквания; сини петна по тонзилите. **Zincum phos** — херпес зостер; невралгии; светкавични болки при табес; нервност; сексуална възбуда; безсъние. **Zincum muriat** — склонност да дърпа завивките; изкривено обоняние и вкус; синьо-зелен оттенък на кожата; студена, потна. **Zincum picricum** — лицева парализа; brain-fag; главоболие при Брайт; емисии; загуба на памет и енергия.

Доза.

2C до 6C.

Zincum valerianicum

Цинк валерианикум **Zincum-valerianicum**

Valerinate of Zinc.

Средство за **невралгии, истерия, angina pectoris** и други болезнени състояния, особено при **овариални оплаквания**. Епилепсия **без аура**. Хистерична сърдечна болка. Фациална невралгия — силна, в лявото слепоочие и долната челюст. Безсъние при деца. Упорито хълцане.

Глава.

Силни, невралгични, интермитентни главоболия. Болката е толкова силна, че пациентът „почти полудява“ — пронизваща, пробощаща. Неконтролируемо безсъние — от болка в главата, с меланхолия.

Женски.

Оварна болка; стрелка надолу по крайниците — чак до ходилото.

Крайници.

Силна болка във врата и гръбначния стълб. Не може да стои спокоен; трябва да държи краката в непрекъснато движение. Ишиасна невралгия.

Доза.

1-ва и 2-ра тритурация. Трябва да се приема продължително при невралгии.

Zingiber officinale

Зингибер официнале **Zingiber-officinale**

Ginger.

Показан при състояния на **слабост в храносмилателния тракт**, половата система и дихателните органи. Пълно прекратяване на бъбречната функция.

Глава.

Хемикрания. Внезапно премигване пред очите. Усеща се объркан, празен. Болка над веждите.

Нос.

Усеща се запушен и сух. Нетърпим сърбеж. Червени пъпки.

Стомах.

Вкусът на храната остава дълго — особено на хляб и препечена филия. Усеща се тежък — „като камък“. Оплаквания от ядене на пъпеши и пиене на нечиста вода.

Киселинност. Тежест в стомаха при събуждане — с газове, къркорене, силна жажда и празнота. Болка от епигастриума към подстерналната област — по-лошо от хранене.

Корем.

Колики, диария, много разхлабени изпражнения. Диария от лоша вода — с много газове, режеща болка, отпускане на сфинктера. Горещ, болезнен анус по време на бременност. Хроничен чревен катар. Анус — червен, възпален. Хемороиди — горещи, болезнени, чувствителни.

Урина.

Чести позиви. Парене и ужилване в отвора. Жълт секрет от уретрата. Урината — гъста, мътна, с остра миризма; потисната. Пълно потискане след тиф. След уриниране — продължава да капе.

Мъжки.

Сърбеж на препуциума. Повишено сексуално желание; болезнени ерекции. Емисии.

Дихателни органи.

Дрезгавост. Парене под ларинкса; затруднено дишане. Астма — без тревожност; по-лошо към сутринта. Дращение в гърлото; пробождания в гърдите. Кашлица — суха, дразнеща; обилни сутрешни храчки.

Крайници.

Много слабост във всички стави. Гърбът — схванат. Крампи в стъпалата и дланите.

Връзки.

Сравни: **Calad**. Антидот: **Nux**.

Доза.

1С до 6С.

Zizia aurea

Зизия ауреа **Zizia-aurea**

Meadow Parsnip.

Хистерия, епилепсия, хорея, хипохондрия — в обхвата на това средство.

Ум.

Суицидни мисли. Депресия. Припадъци на смях и плач — редуват се.

Глава.

Натиск на върха на главата и в дясното слепоочие — свързан с болка в гърба.

Мъжки.

Голяма отпадналост след коитус. Повишена сексуална сила.

Женски.

Интермитентна невралгия на левия яйчник. Разяждаща, обилна левкорейя — с забавен мензис.

Дихателни органи.

Суха кашлица — със пробождания в гърдите. Диспнея.

Крайници.

Необичайно чувство на умора. Хорея — особено по време на сън. Неспкойни крака. Куцост в ръцете и спазматични потрепвания.

Модалности.

По-лошо: по време на сън.

Връзки.

Сравни: **Agar, Stram, Tarant, Cicuta, Aethusa.**

Доза.

Тинктура до 3С.